

1938 — 1939 NEUNUNDZWANZIGSTER JAHRGANG

O D E N W Ä L D E R PFLANZENKULTUREN hrdolf 67;4lle. frymanigen.

KAYSER & SEIBERT

INHABER: HANS KAYSER UND HEINRICH SEIBERT

ROSSDORF BEI DARMSTADT

Telegr.-Adr.: Kayser Seibert, Roßdorf-Darmstadt Fernsprecher: Ober-Ramstadt 368 · Postscheck-Konto: Frankfurt a. M. Nr. 6147 · Bank-Konten: Deutsche Bank und Disconto-Ges., Fil. Darmstadt, Bezirkssparkasse Groß-Bieberau, Zweigst. Roßdorf

Großkulturen und Versand aller winterharten Gartenpflanzen

Blumenstauden und Zierpflanzen sind kein unnötiger Luxus, denn der Umgang mit ihnen bringt jedem Schaffenden die so notwendige Entspannung von anstrengender Tagesarbeit

Inhalts-Übersicht:

	Seite
Wissenswertes	4
Stauden-Zusammenstellungen (Sortimente)	5-8
Neuheiten und Seltenheiten	9-16
Niedrig bleibende Stauden für Felsanlagen und Steingärten .	17-47
Opuntien (Winterharte Kakteen)	34
Mittelhohe und hohe Stauden für Rabatten u. Blumenschnitt	48-73
Ausdauernde Küchen- und Heilkräuter	73
Bambusen und Ziergräser	74-75
Sumpf- und Wasserstauden	75-76
Seerosen (Nymphaea)	76
Garten-Blumenzwiebeln und Mignon-Dahlien	77-78
Freilandfarne	78-79
Heidekräuter	79-80
Immergrüne und Moorbeetpflanzen	80-82
Felsensträucher (Zwerggehölze)	82-87
Zwergkoniferen	87
Schönblühende und dekorative Ziergehölze	89-91
Koniferen (Nadelhölzer)	92
Allee- und Zierbäume	92
Hängebäume	92
Heckengehölze	92
Schlingpflanzen	93
Rosen, auch Edel-Wildrosen und Schlingrosen	94
Obstbäume und Beerensträucher	95
Staudensamen	96-98
Pflanzen-Zusammenstellungen für verschiedene Zwecke	99
Was passt zusammen?	100
Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen	101-102
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	103-104
Versandbedingungen	lagseite

Zeichenerklärungen

In dem Bestreben, unseren Katalog durch gewissenhafte Ausarbeitung immer mehr zu einem willkommenen Nachschlagewerk sowohl für den Fachmann als auch für den Pflanzenfreund auszugestalten, haben wir die Zeichen, die bei jeder Pflanzenart angeben, für welche Zwecke sie sich besonders eignet und welchen Standort sie verlangt, vermehrt und strenger angewendet. Nachstehend die Erklärungen zu den einzelnen Zeichen.

- = für sonnigen Standort
- = Große Trockenheit ertragend, natürlich auch in normalem Gartenboden gedeihend
- Halbschatten liebend oder vertragend
- Schatten liebend oder vertragend
- △ = für Steingärten oder Alpinums besonders geeignet
- || = für Felsspalten und Mauerfugen
- Polsterpflanze, Rasenersatzstaude
- : = für Einfassungen geeignet
- = Rabattenstaude
- x = für Blumenschnitt geeignet
- ⊥ = Solitärstaude (für Einzelstellung)
- ≅ = für feuchten Standort
- \(= \text{Winterschutz verlangend} \)
- = durch Herbstlaubfärbung zierend
- # = Immergrün

Die Blütezeit ist in römischen Zahlen angegeben: III = März, IV = April, V = Mai usw. und die Durchschnitts-Höhe der Pflanzen (in blühendem Zustand) in cm.

Zum Schlusse des Kataloges finden Sie noch Pflanzenzusammenstellungen für die verschiedensten Zwecke der Gartengestaltung, die Ihnen die Auswahl ebenfalls wesentlich erleichtern werden. Außerdem haben wir ein Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen aufgenommen, welches es Ihnen ermöglicht, zu einer Pflanze von der Sie nur den deutschen Namen kennen, den botanischen Namen festzustellen. Es ist dabei zu beachten, daß manche Pflanze unter verschiedenen deutschen Namen geht. Und nicht zuletzt die sicher willkommene Auswahl: Was paßt zusammen.

Die reichere und bessere Bebilderung wird ebenfalls manche neue Anregung geben und unserer Pflanzenwelt immer wieder neue Freunde zuführen.

Wissenswertes

Was sind Blütenstauden?

Blütenstauden sind viele Jahre ausdauernde, krautartige Gewächse, deren Wurzelstock den Winter überdauert. Bei den meisten Arten sterben die oberirdischen Teile im Spätherbst bis auf die Erde ab, um im Frühjahr wieder freudig auszutreiben. Stauden waren schon früher die Lieblinge des deutschen Volkes. Aus alten Kloster-, Pfarr- und Bauerngärten wurden sie wieder hervorgeholt und durch unermüdlichen Züchterfleiß zur heutigen vollendeten Schönheit und Leistungsfähigkeit empor gezüchtet. Sammler und Forscher haben ferner aus allen, unserem Klima verwandten Zonen der ganzen Welt, neue Staudenschätze herbeigetragen.

Versand und Empfang.

Alle Pflanzen werden durch geschultes Personal so sorgfältig verpackt, daß sie auch den weitesten Transport tadellos überstehen. Bei Frostgefahr werden die Pflanzen frostsicher verpackt. — Können die Pflanzen nicht gleich gepflanzt werden, so schlage man sie sorgfältig ein, wobei der Wurzelhals jeder Pflanze von Erde umgeben sein soll. Der Einschlag ist bei heißem Wetter zeitweise zu überbrausen. Bei Frostwetter nimmt man den Einschlag in einem hellen, frostfreien Raum vor. Sendungen die bei Frostwetter ankommen, lasse man erst unausgepackt in einem nicht warmen, aber frostfreiem Raum oder im Keller auftauen; sie werden dann bestimmt keinen Schaden erleiden.

Pflanzzeit:

Im Frühjahr: nach Eintritt offenen Wetters bis Ende Mai. Im Herbst: von Anfang September bis zum Eintritt des Winters, d. h. also, solange der Boden offen ist. Einen großen Teil Stauden, hauptsächlich Alpine, halten wir in Töpfen vorrätig, so daß sie das ganze Jahr über verschickt werden können. Diese sind auch sehr für Geschenkzwecke geeignet.

Pflanzung.

Stauden gedeihen in jedem Gartenboden. Vor der Pflanzung ist der Boden gut umzugraben. Vorzüglich ist die Beigabe von gut durchfeuchtetem Torfmull oder Komposterde. Man beachte, daß die Wurzelkrone nur wenig unter die Erdoberfläche zu stehen kommt. Nach erfolgter Pflanzung gieße man kräftig an.

Gießen.

Solange die Pflanzen nicht angewachsen sind, sei man mit dem Gießen recht vorsichtig, da es sehr oft vorkommt, daß die Stauden totgegossen werden, d. h. durch zu vieles gießen faulen die Pflanzen. Nur bei größerer Hitze ist öfteres gießen notwendig. Sind die Stauden einmal angewachsen, so bedarf es nur noch bei großer Trockenheit des gießens. Dann tue man es aber gründlich, damit das Wasser auch tief genug in die Erde eindringt. Wird nach erfolgtem Regen die Erde gelockert, so ist für lange Zeit das gießen erspart.

Spätere Düngung.

Für ein Belegen der Stauden mit kurzem Stall- oder Torfmist sind die Pflanzen sehr dankbar. Ein solcher Belag düngt auch noch den Boden und hält die Pflanzfläche unkrautfrei. Sind die Stauden angewachsen, so kann man sie mit verdünnter Jauche oder einem der bekannten künstlichen Dünger (nach Vorschrift in Wasser aufgelöst) gießen. Ab Juli sollte man keine Pflanzen mehr düngen.

Weitere Pflege.

Die Anlage ist unkrautfrei zu halten. Abgeblühte Blumen entferne man, da das Samentragen die Pflanzen schwächt. Im Herbst schneide man alles Abgestorbene ab. Altere Pflanzen, die an Blühwilligkeit nachlassen, teile man (jedoch Papaver und Paeonien nicht) und dünge den ausgesogenen Boden.

Winterschutz.

Winterschutz verlangen nur einige wenige, empfindliche Arten die durch das Zeichen / kenntlich gemacht sind. Am besten gebe man ihnen eine Laubdecke. Der Staudenfreund wird die geringe Mühe nicht scheuen, denn gerade diese Stauden sind sehr dankbare Blüher. Im 1. Winter nach der Pflanzung decke man alle Stauden gut mit Tannenreis ab.

Beurteilung der Stauden.

Wer zum erstenmal Stauden pflanzt, beurteile sie nicht abschließend nach ihrem Eindruck im ersten Jahr. Wie Bäume und Sträucher, so entfalten sich auch die Stauden nicht gleich im ersten Jahr in ihrer vollen Schönheit.

Wie schützen Sie sich beim Pflanzenkauf vor Enttäuschungen.

Wie bei anderen Waren, so in besonderem Maß bei Stauden, darf nicht das billigste Angebot als das günstigste betrachtet werden, sondern die Güte und das Vertrauen zu einer Firma muß den Ausschlag geben. Die Pflanzennamen in den Katalogen bieten Ihnen keinen Anhalt über die Stärke der Pflanzen. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine starke, blühbare Staude verstecken. Nur mit dieser Tatsache sind die häufig großen Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. Ferner ist bei den billigen Angeboten nicht immer Gewähr für Sortenechtheit geboten. Wir liefern gesunde, starke, blühbare Pflanzen, die auf mittelschwerem Boden zu widerstandsfähigen Pflanzen heranwuchsen. Diese bieten auch die beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen in allen Gegenden, selbst unter ungünstigsten Bedingungen. — Unsere Preise sind äußerst kalkuliert, so daß Sie unbedingt die Gewähr dafür haben, für Ihr Geld auch den vollen Gegenwert zu bekommen.

Besuch unserer Kulturen

ist jederzeit lohnend und gerne gestattet. Unsere 20 Hektar große Gärtnerei ist von Darmstadt in 20 Minuten Fahrzeit zu erreichen, durch Omnibus (Haltestelle Schillerplatz) und Reichsbahn (Strecke Darmstadt — Gr. Zimmern). Schattiger Fußweg ab Darmstadt Ost eine Stunde. — Gute Autostraße.

Sortenauswahl.

Für jede Jahreszeit, für jeden Verwendungszweck und jede Lage gibt es eine Riesenauswahl feiner und geeigneter Sorten. Falls Sie sich in der zur Verfügung stehenden Auswahl nicht zurechtfinden, unterbreiten wir Ihnen gerne Vorschläge. Bepflanzungspläne können wir erst nach erfolgter Auftragserteilung ausarbeiten und zwar geschieht dies kostenlos. Auf Wunsch senden wir den Bepflanzungsplan vor Lieferung zur Genehmigung ein.

Um Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Sorten behilflich zu sein,

haben wir auch auf den folgenden Seiten für verschiedene Zwecke **Sortimente unserer Wahl** zusammengestellt, die die besten und erprobtesten Sorten enthalten und keine alten, längst überholten, wie sie manchmal von anderer Seite zu billigen Preisen angeboten werden. Zahlreiche Anerkennungsschreiben sprechen sich immer wieder besonders lobend über die vorzügliche Sortenauswahl in unseren Sortimenten aus.



100 Rasenersatz-u. Plattenweg-Stauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 5 od. mehr Sorten mit Namen zu 24 Mark.

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für 1 qm Rasenersatz werden ca. 10-15 Stauden, für 1 qm Plattenweg ca. 5-10 Stauden benötigt.

Bei Bestellung bitte Verwendungszweck angeben.

Für Sonne: (bei jeder Sorte ist die Laubfarbe angegeben) Acaena (blaugrün, hellgrau, braungrün), Antennaria (silbergrau), Armeria (grasgrün), Cerastium tomentosum (silberweiß), Epilobium Hectori (braun), Helianthemum oelandicum (grün), Herniaria glabra (grasgrün), Matricaria caucasica (grün), Paronychia serpyllifolia (graugrün), Phlox subulata (hellgrün), Sedum (grün, braunrot), Thymus (graugrün), Trifolium atropurpureum (schwarzrot), Veronica repens (hellgrün).

Für Halbschaften: Ajuga (braunrot), Asperula nitida (dunkelgrün), Azorella trifurcata (grün), Cotula squalida (braun), Cotula scariosa (hellgrün), Hutchinsia alpina (dunkelgrün), Lysimachia nummularia (hellgrün), Mentha Requienii (grün), Sagina subulata (hellgrün), Sedum spurium (grün), Selaginella (grün), Veronica filiformis (hellgrün), Vinca minor (dunkelgrün).


100 feinste Felsenstauden für alpine Anlagen zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu 30 Mark.



Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet.

Für Sonne: Achillea (weiß, gelb), Alyssum (gelb), Androsace (rosa), Arabis (rosa, weiß), Asteralpinus (weiß, blau, rot), Aubrietien (blau, rot, lila), Campanula (blau, lila, violett, weiß), Coreopsis rosea nana (rosa), Dianthus (weiß, rosa, rot), Draba (gelb, weiß), Globularia (blau), Gypsophila (rosa, weiß), Helianthemum (rot, gelb, weiß, rosa), Leontopodium (weiß), Oenothera missouriensis (gelb), Pentastemon (blau, lila), Phlox subulata (rot, rosa, weiß, lila), Saxifraga, rosettenbildende (weiß), Silene (weiß, rot), Sisyrinchium (blau), Veronica (blau, weiß, rosa).

Für Halbschaften: Ajuga (blau), Alchemilla alpina (gelb), Asperula (weiß, rosa), Azorella trifurcata (weiß), Campanula pusilla (blau, weiß), Cerafostigma plumbaginoides (blau), Corydalis (gelb, weiß), Dicentra eximia (rot), Epimedium (gelb, weiß, rot), Hepatica (blau, weiß, rosa), Horminum pyrenaicum (blau), Hutchinsia (weiß), Hypericum (gelb), Iberis (weiß), Linaria (blau), Megasea (rosa), Omphalodes (blau, weiß), Primula (gelb, weiß, rot, blau), Satureia alpina (blau), Saxifraga moosartige (weiß, rosa, rot), Sedum (rosa, gelb, rot), Selaginella (rasenbildend), Tiarella cordifolia (weiß), Viola (blau, gelb, weiß).



100 feinste Trockenmauerstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu **28** Mark.

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für 1 qm Mauersläche werden ca. 6-8 Stauden benötigt.

Überhängend (auf den Kopf der Mauer): Alyssum (gelb), Arabis (rosa, weiß), Aubrietia (blau, rot, lila), Cerastium (weiß), Dianthus (rosa, rot, weiß), Eriophyllum caespitosum (gelb), Gypsophila (rosa, weiß), Helianthemum (rosa, rot, gelb), Iberis (weiß), Oenothera missouriensis (gelb), Phlox subulata (rot, rosa, weiß), Saponaria (rosa), Sedum (gelb, weiß, rosa), Veronica (blau).

Für Fugenbepflanzung: Achillea (weiß, gelb), Androsace (weiß, rosa), Antennaria (weiß, rosa), Armeria (rosa, rot, weiß), Campanula (blau, lila, violett, weiß), Draba (gelb, weiß), Erinus (rot, weiß), Globularia (blau), Hieracium (rot, gelb), Horminum (blau, weiß), Paronychia (weiß), Saxifraga, rosettenbildende (weiß), Sedum (rot, rosa, gelb, weiß), Sempervivum (rosa, rot), Silene (weiß, rot), Thymus (weiß, rosa, rot), Tunica (weiß, rosa), Veronica (blau).

100 feinste alpine Zwerg-Gehölze zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu 90 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet.

Flachwachsende: Cotoneaster adpressa, C. Dammeri (humifusa), C. horizontalis, C. microphylla var. thymifolia, C. praecox Nan Shan, Cytisus decumbens, C. Ardoinii, Dryas octopetala, D. Sündermannii, Evonymus radicans minima, E. radicans Carrierii, E. japonica acuta, Genista sagittalis, G. pilosa, G. tinctoria plena, Hedera conglomerata, Juniperus prostrata (repens) Mühlenbeckia axillaris, Polygala chamaebuxus, Potentilla Farreri prostrata.

Aufrechtwachsende: Berberis actinacantha, B. stenophylla, B. Thunbergi atropurpurea, B. verruculosa, B. Wilsonae, B. Veitchi, Chaenomeles Sargentii, Cytisus alba dura, C. praecox, C. purpureus incarnatus, Ephedra Gerardiana, E. sikkimensis, Hypericum Moserianum, Hypericum patulum var. Henryi, H. lysimachioides, Lonicera Alberti, L. yunnanensis, L. nitida, L. pileata, Potentilla (in Sort.), Pyracantha coccinea (Lalandii), Spiraea bum. crispa.



100 schönblühende und dekorative Schattenstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu 30 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für 1 qm werden ca. 5-8 Stauden benötigt.

Für Halbschatten:


Niedere: Ajuga (blau), Azorella trifurcata (weiß), Campanula (blau, weiß), Cyclamen (rosa), Dicentra (rosa), Houstonia (blau), Iberis (weiß), Mertensia (blau), Megasea (rosa), Omphalodes (blau, weiß), Primula (bunt), Soldanella (violett), Saxifraga moosartige (rosa, rot, weiß), Tiarella cordifolia (weiß).

Halbhohe: Aconitum (blau, gelb), Aquilegia (blau, weiß, gelb), Anemone jap. (weiß, rosa, rot), Aruncus silvester (weiß), Astrantia (rosa), Astilben (weiß, rosa, rot), Campanula (blau, weiß), Dicentra spectabilis (rosa), Digitalis (gelb, rosa, rot), Geranium (blau, rosa), Helleborus (rosa, weiß), Hosta (blau weiß), Trollius (gelb, orange).

Für Schatten:

Anemone nemorosa (weiß), Asarum europaeum (weiß), Arum italicum, Asperula odorata (weiß), Convallaria majalis (weiß), Corydalis (weiß, gelb), Epimedium (weiß, gelb, rot), Hepatica (blau, weiß, rosa), Hypericum (gelb), Lamium (gelb, rosa), Oxalis acetosella (weiß), Pachysandra (weiß), Pulmonaria (rot, blau), Symphytum grandiflorum (weiß), Vinca (blau, weiß, rot), Waldsteinia (gelb).





100 feinste Schnittstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu 32 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für 1 qm werden ca. 5-6 Stauden benötigt

Niedere: Arabis (weiß), Anemone (weiß, rosa, rot), Aster, Frühlings- (blau, weiß, rot), Caltha (gelb), Dianthus (weiß, rosa, rot), Heuchera (rosa, rot), Iberis (weiß), Helleborus (weiß, rosa), Lychnis (rot), Polemonium (blau), Primula (bunt), Viola cornuta (weiß, gelb, blau), Viola odorata (blau).

Halbhohe: Aquilegia (bunt), Aster amellus (blau, rosa, violett), Anemone jap. (bunt), Centaurea (bunt), Chrysanthemum ind. (bunt), Chrysanthemum leucanthemum und Chr. maximum (weiß), Coreopsis (gelb), Campanula (blau, weiß), Doronicum (gelb), Erigeron (blau, lila), Eryngium (blau), Gaillardia (bunt), Gypsophila (weiß), Helenium (gelb, braun), Heliopsis (gelb), Iris germanica (bunt), Kniphofia (rot, orange, gelb), Liatris (purpur), Phlox paniculata (bunt), Pyrethrum (bunt), Scabiosa (blau, weiß), Trollius (gelb, orange).

Hohe: Achillea fil. Parkers var. (gelb), Aconitum (blau), Aster, Herbst- (bunt), Aruncus silvester (weiß), Chrysanthemum uliginosum (weiß), Delphinium (blau, weiß), Echinops (blau, weiß), Helianthus (gelb), Heliopsis (gelb), Helenium (gelb, braun, braunrot), Rudbeckia (gelb), Solidago (gelb), Thalictrum (blau, gelb).



100 feinste Rabatten-Stauden für sonnige Lage, zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu 32 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für 1 qm werden ca. 4–6 Stauden benötigt.

Niedere: Alyssum (gelb), Achillea (gelb), Aster, Frühlings-(blau, weiß), Dianthus (weiß, rosa, rot), Geum (rot, orange, gelb), Heuchera (weiß, rosa, rot), Iris pumila (bunt), Veronica (blau, rosa), Viola corn. (blau, weiß gelb).

Halbhohe: Aster amellus (blau, violett, rot), Campanula (blau, weiß), Chrysanthemum ind. (bunt), Chrysanthemum leucanthemum und Chr. maximum (weiß), Coreopsis (gelb), Dicentra spectabilis (rosa), Doronicum (gelb), Euphorbia epithymoides (gelb), Helenium (gelb, braun, rotbraun), Hemerocallis (gelb, orange), Iris germanica (bunt), Iris interregna (bunt), Lychnis (rot), Oenothera (gelb), Papaver orient. (rot, rosa), Phlox paniculata (bunt), Platycodon (blau, weiß), Rudbeckia speciosa (gelb), Sedum fabaria (rot, rosa), Solidago (gelb).

Hohe: Aconitum (blau, weiß), Anchusa (blau), Althaea, Malven (rosa, rot, gelb, weiß), Astern, Herbst-(bunt), Chrysanthemum uliginosum (weiß), Delphinium (weiß, hellblau, dunkelblau), Echinops (weiß, blau), Heliopsis (gelb), Helenium (gelb, braun, rot), Monarda (rosa, rot, violett), Rudbeckia (gelb), Solidago (gelb), Thalictrum (blau, gelb), Verbascum (kupfer, gelb).



100 Einfass - Stauden zu sammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in Sorten mit Namen zu **24** Mark.

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für das laufende Meter Einfassung werden 5 Stauden benötigt.

Bei Bestellung bitte angeben, ob wenig Sorten gewünscht werden, oder ob die Einfassung recht bunt werden soll.

Niedere Sorten für schmale Einfassung: Arabis (weiß, rosa), Achillea (gelb), Ajuga (blau), Alyssum saxatile (gelb), Armeria (weiß, rot, rosa), Aster alpinus (blau, weiß, rot), Aubrietia (blau, rot, lila), Brunella (blau, rosa), Campanula (blau, weiß), Cerastium (weiß), Dianthus (rosa, rot, weiß), Iberis (weiß), Iris pumila (bunt), Phlox subulata (weiß, rosa, rot, blau), Primula (gelb, weiß, rot), Saxifraga (rosa, rot, weiß), Sedum (gelb, weiß, rot, rosa), Teucrium chamaedrys (Buxersatz), Vinca minor (blau), Viola cornuta (blau, weiß, gelb), Viola odorata (blau).

Höhere Sorten für breitere Einfassungen: Aster subcoeruleus (blau), Dianthus plum. (weiß, rosa. rot), Geum (gelb, orange, rot), Heuchera (rosa, rot), Hosta (weiß, blau), Iris interregna (bunt), Iris germanica (bunt), Megasea (rosa), Nepeta (blau), Santoline (grün- und graublättrig), Sedum fabaria (rosa, rot), Stachys lanata (graufilzig), Veronica (blau, rosa), Waldsteinia (gelb).

Winterhart ausdauernde Blütenstauden das idealste Pflanzenmaterial

zur farbenfrohen Ausgestaltung von Gärten, Parks und öffentlichen Anlagen.

Einmalige Anschaffung! Jahrzehntelanges Blühen! Geringster Aufwand für Pflege!

Bewährten Neuzüchtungen und Neueinführungen des In- und Auslandes widmen wir immer unsere besondere Aufmerksamkeit und scheuen vor keinen Kosten und Mühen zurück, diese auch unserer Kundschaft zugänglich zu machen. Wir halten so unser Sortiment immer auf der Höhe und können ohne Ueberhebung behaupten, eine der größten existierenden Sammlungen zu besitzen.

Wir machen besonders aufmerksam auf die am Kopf der Seiten sich wiederholenden Zeichenerklärungen.

Die Blütezeit ist in römischen Zahlen angegeben.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 %, bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20 % (100 Stückpreis).

Neuheiten und Seltenheiten

Stauden - Kakteen - Ziergräser - Ericaceen - Gehölze

	Stauden-Neuheiten Fortsetzung	Astilbe koraeensis. Dichte, reinweiße, etwas überge- 1St.
Anton		bogene Blütenrispen. Seltene Art aus Korea.
Aster	amellus Moerheim Gem. Eine Verbesserung der	40 cm VII-VIII 0.80
	guten, alten Sorte "Rudolf Goethe" mit tiefdunkel-	- Taquettii superba. Schöne Spielart von A. Taquetti
	violetten Blumen. 40–50 cm VIII-X 2.— Regina. Wuchs und Blumengröße ähnelt der Sorte	mit stärker verzweigten u. breiteren, kräftigpurpur-
	Imperator. Die großen, edlen Blumen sind jedoch	lila Blütenrispen ähnlich "Gloria" u. "Hyacinth".
	von schöner reinrosa Farbe. 60 cm VIII-IX 1.—	80 cm VIII-IX 0.70
	Schönste von Eisenach. Sehr große, edle, dunkel-	Aubrietia, Blaukissen, Cruciferae ○ △ : 11 □
	rosa Blüten, welche in breiten Sträußen stehen.	- deltoidea Vesuv. Schöne, kräftig wachsende Polster,
	50-60 cm VIII-IX 1.20	die im Frühjahr unter einer Fülle karminroter Blu-
	Silberstern. Die erste reinweiß blühende Aster	men verschwinden. 10–15 cm IV-V 0.70
	amellus. In dichten Sträußen sehr reichblühend.	- Prinzessin Wunderhold. Sehr schöne, silbrig-
	Kompakter Wuchs. 50-60 cm VIII-IX 1.50	weißbunte Belaubung und leuchtend dunkellila
- du	mosus Hybriden O A 🗆 : Eine neue Herbstastern-	Blüten, 10-15 cm IV-V 0.80
	art, die nur 20-30 cm hohe kugelige Büsche bildet.	- Godstone. Großblumig, tiefviolettkarmin.
	Infolge ihrer guten Eigenschaften ist sie sowohl	10-15 cm IV-V 1
	zur Bepflanzung von Steingärten, als auch von	— — Magnificent. Frischgrüne Belaub. u. große, tiefrote
	Staudenrabatten sehr gut geeignet. Bei der Aus-	Blumen mit braunem Auge. 10-15 cm. IV-V 0.80
	schmückung der englischen Kriegergräber in Nord-	- Russel Vincent. Große, reintiefrote Blumen.
	frankreich spielen sie eine große Rolle. VIII-X	10-15 cm IV-V 1.—
	- Countess of Dudley. Reinrosa 0.50	Campanula, Glockenblume, Campanulaceae O- 1 A:
	Diana. Große halbgefüllte, blaßrosa Blumen. 1.—	— carpathica Chewton Joy. Großblumig, hellblau.
	— Dwarf Ronald. Leuchtend rosa 0.50 — Dwarf Nancy. Hellilarosa 0.60	20-25 cm VII-VIII 0.80
	- Dwarf Victor, Reinhellavendelblau 0.50	- Elegant. Zartblau. 10-15 cm VII-VIII 0.80
	- Lady Henry Meddocks. Reinzartrosa 0.50	Liliput. Eine Zwergform von C. carp. turbinata
	— Lilac Time. Großblumig, zartlila 0.80	mit dunkelblauen Blüten. 5-10 cm . VI-VII 1.20
	- Marjory. Lebhaftrosa	— maxima. Sehr große, lichtblane Schalenblüten.
	- Niobe. Reinweiß mit gelber Mitte 0.80	20-25 cm VI-VII 0.60
	- Peter Pan. Leuchtend rosa 0.80	— Moonlight. Zartsilbriglila. 20–25 cm VII-VIII 0.80
	- Snowsprite. Reinweiß 0.70	— Queen of Somerville Die flachen, offenen Blüten-
- lin	ariifolius O D & Kleine, dichtgestellte lineal-lanzett-	schalen sind von zartporzellanblauer Farbe.
	liche Blätter und lilaweiße Blütenbüschel. Seltene	20-25 cm VII-VIII 0.80 — Riverslea Giant. Zartsilbrigblau.
	nordamerikanische Art. 30-40 cm . IX-X 1	20-25 cm VII-VIII 0.80
_ no	vi belgii Amethyst, Herbstaster O 🗆 🗴 Fast voll-	— garganica Mrs. H. H. Payne. Dunkellila Blumen mit
	kommen gefülltblühend, tiefpurpurblau.	auffallender, weißer Mitte. Sehr dankbarer Blüher.
	80-100 cm IX-X	5-10 cm VII-VIII 0.70
-	- Blue Eyes. Große, leuchtend blaue Blumen mit	- hybr. Abundance, Hybride mit hellilafarbenen, halb-
	kleiner, gelber Mitte. 100-120 cm . IX-X 0.60	aufrechten mittelgroßen Blütenglocken. Der reiche
_	— Col. F. R. Durham, Gut gefüllte, violettblaue	Flor und die späte Blütezeit machen die Sorte be-
	Blumen, außerordentlich reichblühend.	sonders wertvoll, 20-25 cm VII-VIII 0.80
	- Little Pink Lady. Leuchtend rosa. Sehr reich-	— Hendersonii ○ □ ¾ Hybride zwischen C. carpa-
	blühend. 40-50 cm	thica u. C. pyramidalis. Die pyramidal verzweigten
	- Mount Everest. Hohe, edelgeformte Pyra-	Büsche sind überschüttet mit leuchtend lilafarbenen
	miden, besetzt mit großen, weißen Blüten.	Blütenglocken. 40-50 cm VI-VII 1.20 R. B. Loder. Reizende, kriechende Staude mit
	120-150 cm IX-X 0.60	halbgefüllten lila Blumen. 5-10 cm VI-VII 1.20
-	- Pink Nymph. Große, lebhaftrosa Blumen.	- Poscharskyana. Sehr schöne, an C. Mayi erinnernde
	120-150 cm IX-X 0.80	Art mit großen sternförmigen lila Blüten in großer
	- Red Rover. Die erste Varietät dieser Astern-	Masse. 20-25 cm VII-VIII 0.60
	klasse, die man als wirklich rot bezeichnen kann.	- pulla alba. Unterscheidet sich von der Stammform
D.	80-100 cm IX-X 0.70	durch ihre blendend weißen Blütenglocken. Ver-
- K	obinsonii. Ähnlich Aster Frikarti, jedoch robuster und daher windfester. Große, prachtvoll himmel-	langt kalkfreien Boden, 10-15 cm VI-VII 1.20
	blaue Blumen. 60–70 cm VIII-X 1.50	- rhomboidalis alba. Reinweiße Art dieser schönen,
		reichblühenden Alpenglockenblume.
	oe, Prachtspiere, Saxifragaceae O 🕦 🗆 🛎	20-30 cm VI-VII 1.—
— hy	/br. crispa elata) A Im Wuchs gleicht die Sorte	— persicifolia Ackermannii O = X Schöne weißgefüllte
	den A. crispa, jedoch sind die rosafarbigen Blüten-	Campanula. Sie ist viel großblumiger, dabei aber
	rispen schlanker und höher wie bei den übrigen.	eleganter als die bekannte Sorte Moerheimii.
	15-25 cm VII-VIII 1.—	60-80 cm VI-VIII 1.—
- SI	mplicifolia hybr. atrorosea. Außerordentlich reichblühende Varietät von intensiv rosaroter Farbe, die	Centaurea, Kornblume, Compositae O 🗆 🐰
	es bis jetzt noch nicht gab. 30–40 cm. VIII-X 0.70	— dealbata Steenbergii. Fiederlappige, unterseits weiß-
	- praecox. Eine frühblühende Varietät, die sich	behaarte Belaubung. Große, purpurrote Blumen mit
	auch für die Treiberei eignet. Die Farbe der Blüten-	weißer Mitte. 40-50 cm VII-VIII 1.—
	rispen ist ein schönes Rosa. 30-40 cm. VIII-X 0.80	Chrysaboltonia pulcherrima O = % Herrlicher, 70 cm
^		hoher Bastard von Boltonia latisquama u. Chrysan-
- A	rendsii Fanal. Die 60-70 cm hohen, schlanken, fedrigen dichten Rispen sind glühend dunkelgranatrot. In	themum Zawadskii. Streng aufrechtwachsende,
	ihrer leuchtenden, dunklen Farbe übertrifft die Sorte	windfeste, viele Wochen blühende Herbststaude
	alle im Handel befindlichen Astilben. Sie ist sehr	mit großen, rosaroten Margaretenblumen. Schnitt-
	reichblühend u. eignet sich gut zur späten Treiberei 0.80	und Schmuckstaude ersten Ranges VIII-X 0.70

Stauden-Neuheiten Fortsetzung 1St.	1St.
Chrysanthemum, Compositae ○□ ¾	Rispen mit warmhellblauen Blumen 2.
- koreanum hybr., Korea Margerite. Eine neue Rasse	— Nachthorn. Eine frühblühende, großblumige Sorte
prachtvoller einfach- u. gefülltblühender Gartenchry-	mit tiefdunkelblauen, rotgetuschten Blumen 3
santhemen, die in keinem Garten fehlen sollten u. die bestimmt überall bald beliebt werden. Sie sind	- Purpurritter, halbgefüllt, enzianblau mit tiefpurpur-
außerordentlich reichblühend und eignen sich auch	violett, großes, weißes Auge
zur Topfkultur vorzüglich. 40-50 cm X-XI	- Tropennacht. Eine wunderbare, harmonische Ver-
Aphrodite. Zartrosa 2.50	bindung der Farben Nachtblau, Enzianblau und Rot
— — Apollo. Warmbraunrot mit lachsrot überlegt,	mit großem, weißen Auge
Mitte altgoldfarbig	— - Überwinder, hellrosa, in hellblau übergehende, weiß geaugte Blumen an kräft., groß. Rispen m. reichem
übergehend	Nebenrispenflor. Enorm wüchsig und fester Bau. 2.—
Innocence. Blendendweiß, später zartrosa . 2.50	Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae ○ △ : :
— — Mercury. Tief bronzerot mit kupferfarben 2.50	- caesius lilacinus. Auf graublauer Belaubung erscheinen
Saturn. Orangebronzefarben. Die kleine Mitte ziert ein zartorangefarbener Ring 2.50	die großen, lilarosa Blüten, die den Flor der Stamm-
— — Venus. Tiefrosalila. 3 - 4 Reihen Blumenblätter 2.50	sorte D. caesius verlängern. 15-20 cm. VI-VII . 0.80
maximum fl. pl. Esther Read. Marguerite	— robusta splendens. Eine besonders starkwüchsige und großblumige Form von D. caesius. Die Blüten
Die dichtgefüllten, schneeweißen Blumen ähneln einem Riesen-Pyrethrum. Durchaus straffstielig	sind leuchtend purpurrosa. 15-20 cm V-VI 0.80
und windfest. 40-50 cm VI-IX 1.50	Erigeron, Berufskraut, Compositae ○ □ ¾
— — Non plus ultra. Die riesigen, schneeweißen Blüten	- hybr. Hundsstern. Die späteste, dunkelste und
haben einen doppelten, massigen, gespreizt ange-	niedrigste Erigeronsorte. Außerordentlich reich-
ordneten Blütenblätterkranz. 60-70 cm VI-VII 0.70	blühend. 30 cm VI-VII 1.— — Merstham Glory. Die hübsch., halbgefüllt. Blumen
Cimicifuga, Silberkerze, Ranunculaceae ○ - ① ¾ □ — acerina compacta. Die schönen Blütenrispen sind	sind v. hellavendelbl. Farbe. 50-60 cm. VI-VII 0.80
reiner weiß als die der Sorte acerina, auch er-	- Mrs.E.M.Beale. Auf 40 cm hohen, reichverzweigten
scheinen sie ca. 14 Tage später. Der Wuchs der	Stielen stehen die feinstrahligen, 5 cm im Durch-
Pflanze ist gedrungener. 70-80 cm VIII-IX 0.80	messer großen, lilafarbigen Blüten . VI-VII 0.80 — Sommerneuschnee. Im Wuchs der E. Quakereß
— simplex Armleuchter. Die hohen kräftigen reichverzweigten Blütenstiele erscheinen in fast doppelt so	ähnlich. Blumen im Aufblühen reinweiß, später
großer Zahl als bei der Stammform. Die Blütenrispen	zartrosa überhaucht. 50–60 cm VII-VIII 0.60
sind v. schneeweißer Farbe. 120-150 cm. VIII-IX 1.—	- mucronatus Moerheimii. Eine unermüdlich blühende
Commelina, Tagblume, Commelinaceae O A A	Staude mit kleinen Blättchen und tiefrosa Blüten in großen Sträußen. 30–40 cm VII-IX 0.80
— dianthifolia. Herrliche Alpine aus den Gebirgen Arizonas, die man für eine niedrig bleibende Form der	- speciosus roseus. Die reinrosafarbenen Blüten er-
Dreimasterblume, Tradescantia virginica, halten	scheinen in großer Fülle. Der straffe Wuchs und
könnte. Ihre azurblauen Blumen erscheinen in reicher	die große Haltbarkeit der Blumen machen sie zur Schnittblume erst. Ranges. 40–50 cm. VI-VII 0.70
Fülle den ganz. Sommer über. 20-30 cm. VI-X 1.—	- Ronsdorf. Die im Durchmesser 5 cm großen, edlen
Coreopsis, Mädchenauge, Compositae ○ □ — verticillata grandiflora. Bedeutende Verbesserung der	halbgefüllten Blumen sind von dunkellila Farbe.
Stammart mit viel größeren, dunkelgelben Blüten	50 cm VI-VII 0.60
in großer Fülle. 50-70 cm VII-IX 0.80	— Wuppertal. Halbgefüllte Blumen von schöner, lila Farbe. 60 cm VI-VII 0.70
Crucianella, Riesenwaldmeister, Rubiaceae O-D	Eryngium, Edeldistel, Umbelliferae O OO D X
— stylosa rubra. Auf frischgrüner grob waldmeister- artiger Belaubung sitzen statt der frischrosa Blüten-	- yuccaefolium. Auffallende Staude mit grauschimmern-
dolden, purpurrote. 15-20 cm V-VII 0.80	der yuccaähnlicher Belaubung. Die runden, weißen
Delphinium cultorum, Rittersp., Ranunculaceae ○□¾⊥	Blütenköpfe sitzen auf kräftigen Stengeln.
Sämtliche hier aufgeführten Neuheiten zeichnen sich	60-80 cm VII-IX 1.—
durch riesengr. Blumen an besond lang. Rispen aus.	Frankenia, Seeheide, Frankeniaceae ○ ♣ △ — laevis. Fast halbstrauchige, lockerrasige Staude mit
Sie sind völlig windfest und meltaufrei. 150-180 cm VI-VIII	linealen Blättchen und hellrosa Blüten. VI-VIII 0.80
- Berghimmel. Die reinhellblauen Blumen sind von	- thymifolia. Thymianähnliche Belaubung und leuchtend
guter Fernwirkung	rosa Blüten , VI-VIII 0.80
— Dein blaues Wunder, mit tiefazurblauen Blumen 4.— — Enzianturm, leuchtend tiefenzianblau, turmartige	Gaillardia, Kokardenblume, Compositae O A
Rispen in großer Zahl	— aristata The Prince. Die außerordentlich großen Blu- men sind goldgelb mit einem breiten, karminroten
- Fliederspeer, meerwasserblau m. dunkl. Syringen-	Rande in der Mitte. Straffstielig und windfest.
farbe, gefüllt	40-50 cm VI-X 1.—
— Fön. Diese prächtige Sorte hat sehr große Blüten- rispen. Die Blumen sind nachtblau, warmrot ge-	Geranium, Storchschnabel, Geraniaceae ○— □ □ △
getönt und schwarz geaugt	— grandiflorum fl. pl. Belaubung tief-fünflappig und
— Gletscherwasser, leuchtend helleisblau, schön ge-	stark behaart. Blumen tiefviolettblau und stark gefüllt. 20-30 cm V-VII 0.80
baute Büsche	- hybr. Russel Prichard. Gut belaubter, im Herbst pracht-
Havelland, halbgefüllt, kornblumenblau, Füllung	voll sich färbender Steingartendauerblüher mit leuch-
perlmutterrosa	tend karminroten Blumen. 20–30 cm. VI-IX 0.80
Kirchenfenster, tiefdunkelblau mit rotvioletter	Geum, Nelkenwurz, Rosaceae O A
Füllung und schwarzem Auge	— hybr. Gladys Perry. Prächtige Zwergform mit großen, warmorangeroten Blüten. Sehr reichblühend.
blauen Blumen mit schwarzgrüner Mitte 2,—	15 cm V-VI 1.20

Stauden-Neuheiten Fortsetzung 1 St.	Iris, Schwertlilie, Iridaceae O 🗆 🗶
Gypsophila, Schleierkraut, Caryophyllaceae ○□¾ ⊥	— pumila hybr. Darmstadt A: : Außerordentl. reichblüh.
— paniculata praecox rosea. Einf., leucht. rosa Blüten.	u. weithin leuchtend, Dom lila, Hängeblätter samtig-
Lieferbar Herbst 1937. 40-50 cm VI-VIII 2.—	violett mit hellerer Berand. 20-30 cm. IV-V 0.60
— — rosea plena. Ein frühblühendes stark gefülltes	- chrysographes Margot Holmes. Grasartige Belau-
Schleierkraut v. rosa Farbe. Lieferbar Herbst 1937.	bung, verzweigte Stengel, Blumen samtigpurpur- violett mit goldener Zeichnung. Ein selten schönes
40-50 cm VI-VIII 3.— — hybr. fl. pl. Rosenschleier ○ △ × Eine wertvolle	Farbenspiel. 40-50 cm VI-VIII 1
Neuheit mit großen, lockeren Rispen schön gefüllter	— japonica Ledgers var. Acorus-ähnliche Belaubung und
rosafarbiger Blüten. Der Wuchs ist kräftig und	kleine, flache, weiße, hellblau schattierte Blumen
gesund. 20-30 cm VI-VIII 0.70	mit orangefarbig. Flecken. 40-50 cm. VI-VII 1
Helenium, Sonnenbraut, Compositae O 🗆 🗴	— germanica Député Nomblot. Dom kupferfarbig
- aut. praec. Hessei. Straff aufrechtwachsend u. wind-	bronze mit lila Schein, Hängeblätter weinfarbig
fest. Große reingelbe Blumen in großen Massen.	karmoisin mit brauner Aderung. Sehr großblumig. 80-100 cm · · · · · · · · · · · · V-VI 3.—
100-120 cm VII-IX 0.80	— Grace Sturtevant. Dom braunpurpur. Hängeblätter
— Bigelovii superbum. Die großen edlen Blumen zeigen einen warmen Goldton mit schwarzer Mitte. Der	glänzend schwarz-karmoisin. Sehr große Blumen auf
straffe, windfeste Wuchs macht die Sorte besonders	starken Stielen. 80-100 cm V-VI 2
wertvoll. 40-50 cm VII-VIII 0.70	— Nadia. Dom hellrosa-amarant, Hängeblätter röt-
hybr. Braungold. Die mittelgroßen Blumen haben einen	lich-granatfarbig. 80-100 cm V-VI 1
schwarzbraunen Knopf und leuchtendbraune Innen-	— Sirius. Domblätter ageratumblau, Hängeblätter leuchtend blau. 80–100 cm V-VI 1.50
zone, die in einen goldgelben Rand ausläuft.	- White Knight. Sehr großblumig, alabasterweiß.
Chipperfield Orange S. L. Cill in Chiperfield Orange S. L. Cill in Chiperfield Orange S. Cill in	Ungeheuer reichblühend. 40-50 cm. V-VI 0.80
Chipperfield Orange. Sehr großblumig, orange- farben, Unterseite der Blumenblätter rot, Mitte	Kirengeshoma, Wachsglocke, Saxifragaceae O- 1 X =
rötlichbraun. 120–150 cm VIII-IX 0.70	
- Moerheim Beauty. Blumen von leuchtend roter	— palmata. Seltene japanische Staude mit graugrünen Stengeln und handförmig geteiltem Laub. Am Ende
Farbe auf straffen Stielen. Verbesserung der Sorte	besetzt mit zahlreichen goldgelben wachsartigen
Crimson Beauty. 60-80 cm VIII-IX 0.70	Blumen. 60-70 cm VIII-IX 1.20
- Peregrina. Die großen Einzelblüten sind dunkel-	Kniphofia, Japan. Fackellilie, Liliaceae ○□ ¾ ⊥ ∧
kastanienbraun mit schmalem, gelblichem Rand.	
Das dunkelste bis heute erreichte Heleniumbraun.	— gracilis Goldelse. Grasartige Belaubung und graziöse zitronengelbe Blütenkolben, die sich sehr gut für
120-150 cm VIII-IX 0.80	feine Binderei eignen. 40-50 cm VII-IX 0.70
Helianthemum, Sonnenröschen, Cistaceae O O A ::	- hybr. Luna. Große, primelgelbe, volle, schöne Blüten-
— hybr. Ben More. Graugrüne Belaubung und einfache, dunkelorangerote Blüten. 10-20 cm. V-VII 0.80	ähre. 50-70 cm VII-IX 1.—
— Ben Nevis. Großbl, strohgelb. 20 cm. V-VII 0.80	Lavandula, Lavendel, Labiatae 🔾 🛇 🗆 : :
— Ben Venue. Mit groß., einfach. rötlichorangefarb.	— vera alba. Silbergraue Belaubung und weiße Blüten.
Blumen, mit dunkl. Mitte. 10-20 cm. V-VII 0.80	Selten, 30-40 cm VII-IX 1.20
- Blutströpfchen. Außerordentlich wüchsig und	Linum, Lein, Linaceae ○ ∞ □
reichblühend, große, blutrote einfache Blumen.	— narbonnense Six Hills var. Grob nadelförmige frisch-
20-25 cm V-VII 0.50	grüne Belaubung und große leuchtend himmelblaue
— Goldlachs. Graugrün belaubte, wüchsige Sorte mit großen, einfachen, lachsorangeroten Blüten, zu	Blumen auf festen Stielen. Sehr reichblühend.
denen die goldgelben Staubfäden herrlich kon-	40-50 cm V-VIII 1.50
trastieren. 10-20 cm V-VII 0.80	Lupinus, Lupine, Leguminosae ○ - () □ V-VII
Watergate Orange. Silbergraue Belaubung und	— polyphyllus hybr. Ada. Maisgelb, goldgelb schattiert.
orangegelbe, einfache Blumen, die eine rotbraune	Niedrig. 40-50 cm
Mitte ziert. 20-30 cm V-VII 0.60	— — Black Knight. Indigoblau, fast schwarz 1.50
Helleborus, Christrose, Ranunculaceae O-0 % -	Chocolade Soldier. Ganz auffallende Er- scheinung. Die oben gelben, unten violettbraunen
- hybr. praecox. Schöne, besonders große reinweiße	Blüten steh. in langen Risp. 60-80 cm 1.50
Blüten in großer Fülle schon von Oktober ab bis	Countess of March. Die unt. Rispe ist zartlila-
in den Winter hinein. 20–30 cm 1.20	blau, die ob. weiß. Sehr fein. 60-80 cm 2.50
Hemerocallis, Taglilie, Liliaceae ○ □ X	— — Downers Delight. Dunkelrosa, sehr große Risp. 1.50
hybr. Margaret Perry. Leuchtend scharlachorange mit	— — Downers Pink Pearls. Tief lachsrosa 1.20
auffallend gelbem Mittelnerv in jedem Blumenblatt. 40-50 cm V-VII 1.20	— — Elisabeth Arden. Prachtvoll orangefarbig 1.50 — — Flamingo. Rötlkastanienbraun. Flügelkarmin 1.50
- Viscountess Byng. Die großen, hellgelben Blumen	- Goldcrest. Goldorange, sehr aparte Farbe 1.50
sind tiefbraun geadert. 40-50 cm . V-VII 1.50	Goodwood. Prächtigrosa, hellbraun schattiert 1.50
Hypericum, Hartheu, Guttiferae ○- • △	Magnificense. Violettpurpur mit weißer
— polyphyllum grandiflorum. Blauschimmernde, nadel-	Schattierung. 60-80 cm
förmige Belaubung und außerordentlich große	— — Nelly. Zweifarbig, elfenbeinweiß, ins bläuliche
gelbe Blumen mit auffallend großen Staubfäden und	schimmernd. 60-80 cm
kupferfarbigen Knospen. 10-15 cm. V-VII 0.70	— — Roy Prichard. Zartgelb. Die Farbe geht beim Verblüh. in blaßlila u. braunviolett über. Sehr apart 0.80
Hypsella longiflora O A & Kriechendes Pflänzchen mit	— — Ruby King. Reinpurpurne Farbe 0.80
kleinen Blättchen und weißen, trompetenartigen,	Lysimachia, Felberich, Primulaceae $\bigcirc - \bigcirc \triangle \cong$
karminrot gestreiften Blumen. 5 cm. VII-VIII 0.80	- phyllocephala. Hodinteressante Pflanze mit großen,
Incarvillea, Freiland-Gloxinie, Bignoniaceae O 🗆 🛆	tiefgelben, achselständigen Blumen. Die blätterlosen
- hybr. Bees Pink. Große, zartrosa trompetenförmige	Stengel enden in einem Blätter- und Blumenkranz.
Pluman and lowick Stinlan 30 A0 am W WI 1	25-30 cm VII-VIII 1 00

Course Nouhoitan Control (Ct	
Stauden-Neuheiten Fortsetzung 1 St.	Pentastemon hybr. Andenken an Purpus. Aus einer 1 St.
Macleaya, Federmonn, Papaveraceae O O I	Anzahl Sämlingen v. P. Andenken an Hahn, die im
— cordata Kelway's Coral Plume. Über den großen, blau-	freien Lande Kältegrade bis zu 10 ° ohne Deckung
grünen, gelappten Blättern stehen hohe, rosig ge-	überstanden, wählten wir diese Sorte aus. Höhe,
färbte Blütenrisp., die sich herrlich von dem tropen-	Wuchs u. Blühwilligkeit wie die Stammsorte, jedoch
haft üppig. Laub abheben. 150-200 cm. VIII-IX 1.—	mit lachsrosaroten Blüten. 30–40 cm VII-X 0.80
Mimulus, Gauklerblume, Scrophulariaceae $\bigcirc \triangle \cong$	Phlox, Flammenblume, Polemoniaceae O
hybr. Netzfalter. Die großen Blumen sind goldgelb,	— adsurgens \(\triangle \) Tiefgrüne, ovalrunde Belaubung und
benetzt m. braunen Punkten. 15–20 cm. VI-IX 0.70	leuchtend rosa Blüten, deren einzelne Blumen-
- Postillon. Großblumig gelb mit großen braunen und	blätter mit einem roten Strich gezeichnet sind.
roten unregelmäßig. Tupfen. 15-20 cm. VI-IX 0.70	— hybrida Cecil Davis △ º Eine starkwüchsige Sorte
- Schmetterling. Die außerordentlich großen Gauk-	mit rundlichen Blättchen an langen Ranken.
lerblumen zeigen ein solch großartiges Farbenspiel	Die rosalila Blüten stehen in lockeren Sträußen.
von rot, gelb und braun, wie man es nur bei Orchi- deen findet. Von der Ferne gleichen die Blumen	15-20 cm VI-VIII 0.80
Schmetterlingen. 15–20 cm VI-IX 0.70	— subulata Rotkäppchen △ ⊕ Ein Gegenstück zu der
Monarda, Etagenblume, Labiatae O	Sorte Schneewittchen, mit kleinen, roten Sternblüt-
hybr. Mrs. Perry. Eine Verbesserung der leuchtend	chen in großer Fülle. 5–10 cm V-VII 0.80
roten Sorte Cambridge Scarlet, mit mehr orange in	
der Farbe und bedeutend reichblühender und härter.	— paniculata. □ ¾ VII-IX — Biedermeier. Riesenbl., weiß m. dunkl. Auge. 60 cm 0.80
120-150 cm VII-VIII 0.70	— Daily Sketch. Sehr große, lachsrosa Blumen mit
Myosotis, Vergißmeinnicht, Borraginaceae ○-① ¾ ≅	karmesinrotem Auge. 80-100 cm 0.80
palustris Thüringen. In allen Teilen fast doppelt so	- Erntefeuer. Große Dolden leuchtend lachsorange-
groß als alle anderen Varietäten. Leuchtend rein-	roter Blumen. 80 cm 0.80
blaue Blumen. 25–30 cm V-IX 0.70	- Feuerreiter. Große, erdbeerrote Blütendold. 80 cm 0.80
Nepeta, Blauminze, Labiatae ○ ∞ □ : : △	— — Mandelduff. Gr. hortensrosalila Blumen. 60 cm 0.80
hybr. Six Hills Giant. Außerord. wertvolle Hybride	— Nelkendom. Zartnelkenrosa Blütendolden. 50 cm 0.70
der bekannten und beliebten N. Mussinii. Die reich-	— Opal. Große, warmros. Blumen m. rot. Auge. 80 cm 0.70
verzweigten Büsche bringen ununterbroch. während	— Septemberschnee. Großblumig weiß, sehr spät-
des ganzen Sommers kräftige Rispen leuchtend lila-	blühend. 80 cm
farbener Lippenblüten. 25-30 cm. VII-X 0.60	— Sir William Lawrence. Große, frischklarrote
- nervosa. Immerblühende Steingarten- und Rabatten-	Blumen mit klein., weiß. Auge. 70-80 cm 0.80
staude mit prächt., fingerlangen, ultramarinblauen	Phyllitis, Hirschzungenfarn, Polypodiaceae 🕦 – 🌑
Ahrenblüten mit weißer Unterlippe, welche gut über	— scolopendrium var. Hookeri. Außerordentlich lang-
der Belaubung erscheinen. 20–30 cm. VI-IX 0.60	und breitblättrig, am oberen Blattende merkwürdig
Oenothera, Nachtkerze, Oenotheraceae ○ △ □	geteilt. Erinnert stark an Platycerium, den Geweihfarn des Glashauses. 30–40 cm
linearis. Diese Nachtkerzenart bildet reichverzweigte, halbhohe Büsche mit schmallanzettlichen Blättern	
und einer Fülle von hellgelben, mittelgroßen Blu-	Physostegia, Etagenerika, Labiatae O = X
men. 20—30 cm VII-VIII 0.70	— virginiana Vivid. Lanzettliche, gekerbte, quirlständige Belaubung und auffallend weinrote Lippenblüten
Paeonia, Pfingstrose, Ranunculaceae O 🗆 X	an langen, aufrechten, dichtbesetzten Ähren. Sollte
— sinensis Königin Wilhelmine. Sehr große, gut gefüllte	in keinem Garten fehlen. 60-80 cm. VII-VIII 0.80
Blumen von vollendeter Schönheit. Herrlich silber-	Polystichum, Punktfarn, Polypodiaceae 🕽 – 🔵
rosa, nach der Mitte zu in lachs übergehend. Eine	
rosa, nach der Mitte zu in lachs übergehend. Eine wirklich vornehme Farbe. 60–70 cm. V-VII 2.—	- angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immer-
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2	— angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immer- grüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne We-
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae O = X orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark	— angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immer- grüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne We- del an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.—
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae O = & orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm. V-VI 1.—	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3. Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae O = X orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende	— angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immer- grüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne We- del an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.—
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae O = X orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe.	 — angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ — cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae O = X orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.—	 — angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ — cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durch-
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae O = X orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blu-	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern,
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ ★ orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— - May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— - Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ ★ orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.—	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt.
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ ★ orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.— Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100-120 cm VII-VIII 3.—
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ X orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.— Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100-120 cm VII-VIII 3.— Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ X orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.— Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend.	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nür als subtropisch bekannt. 100-120 cm VII-VIII 3.— Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △ — chrysocraspeda aurantiaca. Die dichten Polster
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ X orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.— Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend. 30-40 cm V-VI 1.—	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100-120 cm VII-VIII 3.— Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △ — chrysocraspeda aurantiaca. Die dichten Polster sind übersät mit warmorangegelben Blüten.
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ X orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.— Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend. 30-40 cm V-VI 1.— Thora Perry. Eine reinweiß blühende Zwergsorte.	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100-120 cm VII-VIII 3.— Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △ chrysocraspeda aurantiaca. Die dichten Polster sind übersät mit warmorangegelben Blüten. 5-10 cm
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ X — orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— — May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— — Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.— — Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend. 30-40 cm V-VI 1.— — Thora Perry. Eine reinweiß blühende Zwergsorte. 30-40 cm	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100-120 cm VII-VIII 3.— Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △ chrysocraspeda aurantiaca. Die dichten Polster sind übersät mit warmorangegelben Blüten. 5-10 cm V-VI insignis. Silberweiße, erdbeerartige Belaubung, zu der
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ X orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.— Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend. 30-40 cm V-VI 1.— Thora Perry. Eine reinweiß blühende Zwergsorte. 30-40 cm V-VI 1.— Pelargonium, Geranium, Geraniaceae ○ △ △	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100-120 cm VII-VIII 3.— Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △ chrysocraspeda aurantiaca. Die dichten Polster sind übersät mit warmorangegelben Blüten. 5-10 cm
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ X — orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— — May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— — Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.— — Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend. 30-40 cm V-VI 1.— — Thora Perry. Eine reinweiß blühende Zwergsorte. 30-40 cm V-VI 1.— Pelargonium, Geranium, Geraniaceae ○ △ △ — Endlicherianum. Seltene Art mit fleischigem Wurzel-	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100-120 cm
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ X orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.— Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend. 30-40 cm V-VI 1.— Thora Perry. Eine reinweiß blühende Zwergsorte. 30-40 cm V-VI 1.— Pelargonium, Geranium, Geraniaceae ○ △ △ Endlicherianum. Seltene Art mit fleischigem Wurzelstock und rundlich-herzförmigen Blättern. Die eigen-	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100-120 cm
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ X — orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— — May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— — Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.— — Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend. 30-40 cm V-VI 1.— — Thora Perry. Eine reinweiß blühende Zwergsorte. 30-40 cm V-VI 1.— Pelargonium, Geranium, Geraniaceae ○ △ △ — Endlicherianum. Seltene Art mit fleischigem Wurzelstock und rundlich-herzförmigen Blättern. Die eigenartig geformten Blüten sind frischrosa und karmin	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nür als subtropisch bekannt. 100-120 cm VII-VIII 3.— Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △ chrysocraspeda aurantiaca. Die dichten Polster sind übersät mit warmorangegelben Blüten. 5-10 cm
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ X — orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— — May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— — Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.— — Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend. 30-40 cm V-VI 1.— — Thora Perry. Eine reinweiß blühende Zwergsorte. 30-40 cm V-VI 1.— Pelargonium, Geranium, Geraniaceae ○ △ △ — Endlicherianum. Seltene Art mit fleischigem Wurzelstock und rundlich-herzförmigen Blättern. Die eigenartig geformten Blüten sind frischrosa und karmin geadert. 20-25 cm VII-VIII 1.50	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100-120 cm VII-VIII 3.— Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △ chrysocraspeda aurantiaca. Die dichten Polster sind übersät mit warmorangegelben Blüten. 5-10 cm
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ X — orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— — May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— — Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.— — Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend. 30-40 cm V-VI 1.— — Thora Perry. Eine reinweiß blühende Zwergsorte. 30-40 cm V-VI 1.— Pelargonium, Geranium, Geraniaceae ○ △ △ — Endlicherianum. Seltene Art mit fleischigem Wurzel- stock und rundlich-herzförmigen Blättern. Die eigen- artig geformten Blüten sind frischrosa und karmin geadert. 20-25 cm VII-VIII 1.50 Pentastemon, Bartfaden, Scrophulariaceae ○ □	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100-120 cm VII-VIII 3.— Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △ chrysocraspeda aurantiaca. Die dichten Polster sind übersät mit warmorangegelben Blüten. 5-10 cm
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ X orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.— Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend. 30-40 cm V-VI 1.— Thora Perry. Eine reinweiß blühende Zwergsorte. 30-40 cm V-VI 1.— Pelargonium, Geranium, Geraniaceae ○ △ △ Endlicherianum. Seltene Art mit fleischigem Wurzel- stock und rundlich-herzförmigen Blättern. Die eigen- artig geformten Blüten sind frischrosa und karmin geadert. 20-25 cm VII-VIII 1.50 Pentastemon, Bartfaden, Scrophulariaceae ○ □ Hallii △ Seltene Alpine m. spatelförm. Belaub. u. leucht.	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100-120 cm VII-VIII 3.— Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △ chrysocraspeda aurantiaca. Die dichten Polster sind übersät mit warmorangegelben Blüten. 5-10 cm V-VI 0.70 insignis. Silberweiße, erdbeerartige Belaubung, zu der die in großen Mengen erscheinenden, mennigroten Blüten herrlich kontrastieren. 20-30 cm VI-VIII 1.— Pyrethrum, Bunte Marguerite, Compositae ○ □ × ros. Donatis. Die gelbe Mitte mit weißer Krause ist von einem prächtigen, karminrosa Strahlenkranz umgeben. Die langgestielten Blumen messen bis zu 12 cm im Durchmesser. 50-60 cm . V-VI 0.80
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ X — orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— — May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— — Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.— — Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend. 30-40 cm V-VI 1.— — Thora Perry. Eine reinweiß blühende Zwergsorte. 30-40 cm V-VI 1.— Pelargonium, Geranium, Geraniaceae ○ △ △ — Endlicherianum. Seltene Art mit fleischigem Wurzelstock und rundlich-herzförmigen Blättern. Die eigenartig geformten Blüten sind frischrosa und karmin geadert. 20-25 cm VII-VIII 1.50 Pentastemon, Bartfaden, Scrophulariaceae ○ □ — Hallii △ Seltene Alpine m. spatelförm. Belaub. u. leucht. blauen Blütenrispen. 10-20 cm VII-VIII 1.—	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100-120 cm VII-VIII 3.— Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △ chrysocraspeda aurantiaca. Die dichten Polster sind übersät mit warmorangegelben Blüten. 5-10 cm V-VI insignis. Silberweiße, erdbeerartige Belaubung, zu der die in großen Mengen erscheinenden, mennigroten Blüten herrlich kontrastieren. 20-30 cm VI-VIII 1.— Pyrethrum, Bunte Marguerite, Compositae ○ □ ¾ ros. Donatis. Die gelbe Mitte mit weißer Krause ist von einem prächtigen, karminrosa Strahlenkranz umgeben. Die langgestielten Blumen messen bis zu 12 cm im Durchmesser. 50-60 cm . V-VI 0.80 Mrs. James Leake. Die Blumen haben einen
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.— Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ X — orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.— — May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm V-VI 1.— — Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blumen stehen auf straffen, festen Stielen und sind stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.— — Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend. 30-40 cm V-VI 1.— — Thora Perry. Eine reinweiß blühende Zwergsorte. 30-40 cm V-VI 1.— Pelargonium, Geranium, Geraniaceae ○ △ △ — Endlicherianum. Seltene Art mit fleischigem Wurzelstock und rundlich-herzförmigen Blättern. Die eigen- artig geformten Blüten sind frischrosa und karmin geadert. 20-25 cm VII-VIII 1.50 Pentastemon, Bartfaden, Scrophulariaceae ○ □ — Hallii △ Seltene Alpine m. spatelförm. Belaub. u. leucht.	 angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immergrüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.— Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅ cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100-120 cm VII-VIII 3.— Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △ chrysocraspeda aurantiaca. Die dichten Polster sind übersät mit warmorangegelben Blüten. 5-10 cm V-VI 0.70 insignis. Silberweiße, erdbeerartige Belaubung, zu der die in großen Mengen erscheinenden, mennigroten Blüten herrlich kontrastieren. 20-30 cm VI-VIII 1.— Pyrethrum, Bunte Marguerite, Compositae ○ □ × ros. Donatis. Die gelbe Mitte mit weißer Krause ist von einem prächtigen, karminrosa Strahlenkranz umgeben. Die langgestielten Blumen messen bis zu 12 cm im Durchmesser. 50-60 cm . V-VI 0.80

Stauden-Neuheiten Fortsetzung	Sempervivum metallicum giganteum. Durch Kreu- 1St.
Pyrethrum ros. Rubens. Große, leuchtend karminrosa	zung der größten und schönsten Sempervivum ist HM
Blumen. Sehr frühblühend, daher für Schnittzwecke	es gelungen, eine riesenrosettige Art in den herr- lichen Metallfarben der Echeverien zu erzielen.
besonders wertvoll. 60-70 cm V-VI 0.80 - Tucan. Leucht. karminrot, einfach m. krauser gelber	5-10 cm VII-VIII 1.20
Mitte. Früh- u. reichblüh. 50-60 cm V-VI 0.80	Senecio, Kreuzkraut, Compositae ○-① ≅ □ ⊥
Primula, Primulaceae	- hybr. Hessei. Sehr dekorative Staude, die durch Kreuz- befruchtung von S. Clivorum, Wilsonianus und
— Juliae Gloria. Saftiggrüne Belaubung u. magentarote Blumen mit goldgelbem Auge. 5-10 cm IV-V 0.70	Veitdianus entstanden ist. Belaubung dreiedig,
— pruhoniciana E. R. Janes. Herrliche, gut belaubte	Blütenstiele langgestreckt, ähnlich S. Wilsonianus,
Kissenprimel mit besonders großen, leuchtend rosa-	jedoch erinnern die Einzelblumen an S. Clivorum. Farbe leucht. orangegelb. 150-180 cm. VII-VIII 1.50
roten Blumen in der Farbe wie Pr. rosea grdfl. Ungemein reichblühend. 10–15 cm IV-V 0.80	- palmatilobus. Schöne Dekorationsstaude mit stark
Purple Splendour. Große, purpurfarbige Blumen	zerteilten Blättern u. lebhaftgelben Blütenständen.
mit orangegelbem Auge. Die einzelnen Blumen- blätter sind geschlitzt und der Rand etwas gewellt.	Ihre frühe Blütezeit macht sie im Senecio-Sortiment besonders wertvoll. 120–150 cm VI-VII 2.50
10-15 cm IV-V 0.80	Solidago, Goldraute, Compositae O A
Rubin. Sehr große, samtigkarminrote Blumen.	— brachystachya robusta. Eine robuste Form von S. brachystachya. Die stark verzweigten Büschel
10-15 cm IV-V 0.60	bringen im zeitigen Herbst eine Fülle leuchtend
Ranunculus, Hahnenfuß, Ranunculaceae ○ △ — Arendsii. Interessante Hybride von R. amplexicaule x	gelber Blumen. 30-35 cm IX-X 1
R. gramineus mit schwefelgelben Blüten.	Stylophorum, Schöllkrautmohn, Papaveraceae (1) — (1) — diphyllum. Buschige Staude mit hellgrüner, fieder-
$20-30~\mathrm{cm}$ V-VI 1.— Roscoea, Zingiberaceae \bigcirc \triangle	teiliger Belaubung und gelben, mohnähnlichen
— cautleoides August Beauty. Orchideen ähnliche Staude	Blumen. 30-40 cm V-VI 1.—
mit dicken Stengeln und fingerlangen, lanzettlichen	Thymus, Thymian, Labiatae O O A O D I O D D D D D D D D D D D D D D D D
Blättern. Die leuchtend gelben Blüten mit helm- artiger Oberlippe sitzen direkt am Stengel.	großen, weißen Blüten. 10-15 cm VI-VII 0.80
20-30 cm VIII-IX 2.—	— rotundifolia Purpurteppich. Ähnlich Th. serpyllum mit größer., rundlich. Laubwerk u. weithin leuchtenden
Sagittaria, Pfeilkraut, Alismataceae ○ ≅	weinpurpurroten Blüten. 5-10 cm VII-VIII 0.60
- sagittifolia fl. pl. Stark weiß gefülltblühend. Pfeilartige Blätter und große levkojenähnliche Blüten.	Tunica, Felsennelke, Caryophyllaceae ○ ∞ △ II
Eine der schönsten und seltensten Sumpf- und	— saxifraga alba plena. Das nadeltörmige Laub ist den ganzen Sommer überdeckt mit gypsophilaähnlichen,
Wasserstauden. 40-50 cm VII-VIII 1.50 Saxifraga, Steinbrech, Saxifragaceae	weiß gefüllt. Blüten. Selten. 15-20 cm VII-IX 0.80
— caespitosa hybr. Astrild. Kräftigwachsende Blatt-	— — superba plena. Die Blumen dieser neuen Form sind in der Farbe dunkler als die der Sorte "robusta pl."
polster, karmoisinrote große Blumen. Sehr apart.	15-20 cm VII-IX 0.80
10-15 cm V-VI 0.80 - — Bees Pink. Moosartige Belaubung und große,	Verbascum, Königskerze, Scrophulariaceae O D
leuchtend rosa Blüten, die in der Sonne nicht ver-	— hybr. C. R. Adams. Schmuckvolle Staude mit grund- ständiger Blattrosette und prachtvollen, goldgelben
blassen. 10-15 cm V-VI 0.80 Scabiosa, Skabiose, Dipsacaceae ○ □ ※	großen Einzelblüten an langen, verzweigten Rispen.
— caucasica Amethyst. In Wuchs und Blütenform der	$100-120~\mathrm{cm}$ V-VIII 1.— Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae $\bigcirc \bigcirc \triangle$
S. Schöne von Eisenach ähnlich, jedoch mit dunkelblauen Blumen. 40-50 cm VI-X 1.—	- Armstrongii A Neuseeländer Veronica. Durch die
blauen Blumen. 40-50 cm VI-X 1.— — Frieda. Starkwüchsige Sorte m. zartblauen, großen,	dicklichen Zweige von auffallend leuchtender gold-
edlen Blumen. 40-50 cm VI-X 0.80	bronzener Farbe erinnert die Pflanze an eine Konifere. Sehr selten. 20–30 cm
— Mrs. Willmott. Mit großen, weißen Blumen aus mehreren Blumenblätterkränzen bestehend.	— hybr. Blaukerze. Herrlicher Bastard von V. Hender-
40-50 cm VI-X 0.80	soni und V. latifolia. Stramm aufrechtwachsend, tiefblaue Blütenrispen. 30–40 cm VII-IX 1.—
— Prachtkerl. Eine außerordentlich robuste Form mit	- filifolia. Fädig zerteilte, hellgrüne Belaubung und
großen, leuchtend blauen Blumen auf drahtartigen Stielen, wie sie bei keiner anderen Sorte zu finden	hellila Blütentrauben. 10–15 cm VI-VII 0.70
sind. 50-60 cm VI-X 1.20	— incana rosea. Silbergraue Belaubung und leuchtend rosarote Blütenrispen. Sehr reichblühend und stark
Sedum, Fetthenne, Crassulaceae O O A	auffallend. 15-20 cm VI-VII 1
— spurium album superbum. Auf üppigen Polstern er- scheinen die großen, reinweißen Blüten in großer	— spicata Blauer Zwerg. Fällt durch die Fülle kleiner dunkelblauer kandelaberartiger Rispen im Stein-
Fülle. 5-10 cm VII-VIII 0.50	garten unbedingt auf. 10-20 cm VI-VIII 1.—
— splendidissimum. Sehr großblumig und reich- blühend. Leuchtend dunkelkarminrote Blumen.	rubra. Mit leuchtend roten Blütenrispen.
5—10 cm VII-VIII 0.50	20-30 cm VI-VIII 0.80 — teucrium prostrata Loddon Blue. Herrliche Zwerg-
— telephium Munstead Dark Red. Schwarzrote, flei-	form mit kleiner rundlicher Belaubung u. leuchtend
schige Stengel und Blätter. 30–40 cm. VIII-IX 1.—	blauen Blütenähren. 5–10 cm V-VI 0.80
Sempervivum, Dachwurz, Crassulaceae ○ ∞ △ — Borisii. Mittelgroße, hellgrüne Blattrosetten, die weiß	— rupestris rosea. Rosablühende Form von Veronica rupestris, die ebensoreich blüht.5-10cm. V-VI 0.80
bewimpert sind. Hellgelbe Blüten. Sehr schön.	— — alba. Die dunkelgrüne Belaubung verschwindet im
3-5 cm VII-VIII 0.80 - hybr. Rauhreif. Herrliche, purpurrote Hauswurz,	Frühjahr unter einer schneeweißen Blütendecke. 5-10 cm V-VI 0.80
die in der Jugend mit einem dicken Spinnenge-	Vinca, Immergrün, Apocynaceae ○-• △
webe überzogen ist. Die Rosetten werden bis 10 cm	— major acutiloba. Großblättriges Immergrün mit groß.
im Durchmesser und bringen karminrosa Blumen. 3-5 cm VII-VIII 0.60	weißen Blüten, die von Frühjahr bis zum Herbst fast ununterbrochen erscheinen. 20–30 cm 0.80

Stauden-Neuheiten Fortsetzung 1 St.	Chrysopogon, Indianer-Goldfeder, Gramineae 1St.
Vinca minor Bowles var. Besonders schönes Singrün mit	— nutans. Schmale, bläulichgrüne Belaubung und leuch-
leuchtend blauen Blüten. 5-10 cm. IV-V 0.70	tend braungelbe Blütenrispen. 100 cm. Selten 0.80
Viola, Veilchen, Violaceae ○ △ : 🖟 🗴	Pennisetum, Lampenputzergras, Gramineae O L 🗆
- cornuta Spaßvogel. Das alte, wunderbar schöne	- compressum. Sehr dekoratives, schmalblättriges
V. c. Jackanapes hatte den großen Nachteil, daß es	Ziergras mit 20 cm langen, walzenförmigen, rot-
nicht sehr winterhart war und außerdem beim Ver-	braunen Blütenähren auf kräftigen langen Stengeln. Eine besonders edle Erscheinung unter den Gräsern.
pflanzen immer Verluste brachte. Nach jahrelanger	60-80 cm VIII-IX 1.—
Bemühung ist es uns gelungen einen Sämling heraus- zuzüchten, der in Wuchs, Farbe und Blühwilligkeit	
dem alten "Jackanapes" gleicht, aber dessen Fehler	Heidekräuter-Neuheiten
abgelegt hat. Die oberen Blumenblätter sind braun,	Calluna, Heidekraut, Ericaceae ○ △ : ::
die unteren goldgelb. 10-15 cm IV-IX 0.80	— vulgaris alba plena. Rahmweiß, gefülltblühend.
grac. Alabaster. Sehr wüchsiges, hartes Hornveilchen	20-30 cm VIII-IX 1.50
in der Tracht wie Viola grac. Hansa, jedoch mit	- Camla Variety. Niedrig bleibende Form mit
alabasterweißen Blüten. 10-15 cm . IV-IX 0.60	leuchtend rosa Blütenrispen. Gefülltblühend.
- Strolch. Ein Sämling von Viola grac. Lord Nelson,	20-30 cm VIII-IX 1.—
welcher hübsche, runde Büsche bildet u. ungeheuer reich blüht. Blütenfarbe leuchtend veilchenblau, wie	— Foxii. Ganz niedere, runde Kissen bildende Pflanze mit purpurroten Blüten. 3–5 cm VIII-IX 1.—
sie bis heute bei keiner anderen Sorte zu finden ist.	mit purpurroten Blüten. 3–5 cm VIII-IX 1.— — H. G. Beale. Die dichtgefüllten, großen Blüten
10-15 cm IV-IX 0.80	sitzen an langen Rispen. Eine sehr prächtige,
— odorata Triumph) X Wohlriech. Veilchen. Kräftige,	empfehlenswerte Sorte, die weiteste Verbreitung
dunkelgrün belaubte Büsche. Die großen Einzel-	verdient. 20-30 cm VIII-IX 1
blüten stehen straff auf langen, bequem pflück-	— — Johnson var. Die rosalila Blütenrispen erscheinen
baren Stielen. 15-20 cm III-IV 0.80	erst, wenn alle anderen Sorten verblüht sind.
Viscaria, Pechnelke, Caryophyllaceae O 🗆 🛆	Selbst frühzeitiger Frost kann ihnen nichts anhaben.
viscosa lilacina. Schöne fliederfarbene Pechnelke, deren immergrüne Blattrosetten sich im Herbst pur-	20–30 cm X-XI 1.— — Mullion. Stark verzweigte, tiefrosa Blütenrispen.
purrot färben. 20–30 cm V-VI 0.80	20-30 cm VIII-IX 0.80
Yucca, Palmlilie, Liliaceae ○ △ ⊥	prostrata. Kriechendes, sich sest dem Erdboden
- agavaefolia. Interessante Pflanze mit agavenartiger	anschmiegendes Heidekraut mit lila Blütenrispen.
Belaubung und cremeweißen Blüten an starken	Eine ganz neue Erscheinung unter den Ericaceen.
Schäften. 30-40 cm VII-VIII 2.	3-5 cm VIII-IX 0.80
Zauschneria, Kolibriblume, Oenotheraceae ○ △	— — atrorosea. Leuchtend rosa Blüten VIII-IX 0.80
- arizonica. Bedeutend härter, widerstandsfäh. u. stark-	— — flagelliformis. Peitschenförmige Zweige und lilarosa Blüten VIII-IX 0.80
wüchsiger als Z. californica. Die leucht. rot. Rispen	lilarosa Blüten VIII-IX 0.80 — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne
erscheinen in großer Masse. 20-30 cm. VIII-X 0.80	Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.—
	Delaubung und rosa Diuten viii-izi i.
Winterharte Kakteen-Seltenheiten	— tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend.
Winterharte Kakteen-Seltenheiten	
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII	tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend.
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende,	— tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20−30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkel-
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten	— tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ : : carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ : : carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tief-	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1 Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm II-IV 1 Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend.
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.—	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ ::: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 — gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1 — Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm II-IV 1 — Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10-15 cm II-IV 0.80
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1 Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm II-IV 1 Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10-15 cm II-IV 0.80 ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grun-	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1 Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm II-IV 1 Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10-15 cm II-IV 0.80 ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken.
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— — grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1 Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm II-IV 1 Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10-15 cm II-IV 0.80 ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken. 20-30 cm VIII-IX 0.80
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— — grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Raßnesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50—Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 — gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1.— — Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm II-IV 1.— — Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10-15 cm II-IV 0.80 — ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken. 20-30 cm VIII-IX 0.80 — hybr. Dawn ∧ Hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständigen
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— — grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Raßnesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 — Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 — gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1.— — Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm II-IV 1.— — Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10-15 cm II-IV 0.80 — ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken. 20-30 cm VIII-IX 0.80 — hybr. Dawn ∧ Hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständigen Trauben. 15-25 cm VIII-IX 0.80
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ○ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— — grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Raßnesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 — Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 — gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1.— — Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm II-IV 1.— — Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10-15 cm II-IV 0.80 — ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken. 20-30 cm VIII-IX 0.80 — hybr. Dawn ∧ Hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständigen Trauben. 15-25 cm VIII-IX 0.80 — vagans F. D. Maxwell ∧ Auffallende Schönheit mit
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— — grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Raßnesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 — Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 - gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1 - Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm II-IV 1 - Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10-15 cm II-IV 0.80 - ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken. 20-30 cm VIII-IX 0.80 - hybr. Dawn ∧ Hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständigen Trauben. 15-25 cm VIII-IX 0.80 - vagans F. D. Maxwell ∧ Auffallende Schönheit mit eigenartig leuchtend lachskarminfarbenen Blumen
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ○ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Raßnesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 — Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— — utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reich-	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 — gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1.— — Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm II-IV 1.— — Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10-15 cm II-IV 0.80 — ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken. 20-30 cm VIII-IX 0.80 — hybr. Dawn ∧ Hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständigen Trauben. 15-25 cm VIII-IX 0.80 — vagans F. D. Maxwell ∧ Auffallende Schönheit mit eigenartig leuchtend lachskarminfarbenen Blumen in reicher Fülle. 20-30 cm VIII-X 0.80
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ○ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— — grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 — Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— — utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.—	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 — gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1.— — Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm II-IV 1.— — Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10-15 cm II-IV 0.80 — ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken. 20-30 cm VIII-IX 0.80 — hybr. Dawn ∧ Hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständigen Trauben. 15-25 cm VIII-IX 0.80 — vagans F. D. Maxwell ∧ Auffallende Schönheit mit eigenartig leuchtend lachskarminfarbenen Blumen in reicher Fülle. 20-30 cm VIII-X 0.80 — Lyonesse ∧ Wüchsige, großblumige Abart mit
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ○ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— — grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 — Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— — utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— ×anthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 - gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1 - Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm II-IV 1 - Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10-15 cm II-IV 0.80 - ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken. 20-30 cm VIII-IX 0.80 - hybr. Dawn ∧ Hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständigen Trauben. 15-25 cm VIII-IX 0.80 - vagans F. D. Maxwell ∧ Auffallende Schönheit mit eigenartig leuchtend lachskarminfarbenen Blumen in reicher Fülle. 20-30 cm VIII-X 0.80
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ○ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— — grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 — Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— — utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— ×anthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1.— Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm II-IV 1.— Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10-15 cm II-IV 0.80 ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken. 20-30 cm VIII-IX 0.80 hybr. Dawn ∧ Hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständigen Trauben. 15-25 cm VIII-IX 0.80 vagans F. D. Maxwell ∧ Auffallende Schönheit mit eigenartig leuchtend lachskarminfarbenen Blumen in reicher Fülle. 20-30 cm VIII-X 0.80 Lyonesse ∧ Wüchsige, großblumige Abart mit weißen Blüten. 20-30 cm VIII-IX 0.80 St. Keverne ∧ Neue Sorte, die sich durch ihre prächtige, bei den Heidekräutern völlig neue, lachs-
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ○ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— — grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 — Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— — utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— ×anthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 — gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1.— — Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm II-IV 1.— — Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10-15 cm II-IV 0.80 — ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken. 20-30 cm VIII-IX 0.80 — hybr. Dawn ∧ Hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständigen Trauben. 15-25 cm VIII-IX 0.80 — vagans F. D. Maxwell ∧ Auffallende Schönheit mit eigenartig leuchtend lachskarminfarbenen Blumen in reicher Fülle. 20-30 cm VIII-X 0.80 — Lyonesse ∧ Wüchsige, großblumige Abart mit weißen Blüten. 20-30 cm VIII-IX 0.80 — St. Keverne ∧ Neue Sorte, die sich durch ihre
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 — Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— — utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— ×anthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.—	- tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 - gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1 - Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ○ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Raßnesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 — Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— — utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— ×anthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.— Ziergräser-Neuheiten	 tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1.— Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm II-IV 1.— Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10-15 cm II-IV 0.80 ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken. 20-30 cm VIII-IX 0.80 hybr. Dawn ∧ Hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständigen Trauben. 15-25 cm VIII-IX 0.80 vagans F. D. Maxwell ∧ Auffallende Schönheit mit eigenartig leuchtend lachskarminfarbenen Blumen in reicher Fülle. 20-30 cm VIII-X 0.80 Lyonesse ∧ Wüchsige, großblumige Abart mit weißen Blüten. 20-30 cm VIII-IX 0.80 St. Keverne ∧ Neue Sorte, die sich durch ihre prächtige, bei den Heidekräutern völlig neue, lachs-
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— ×anthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.— Ziergräser-Neuheiten Carex, Segge, Cyperaceae ○ ● △ △ △	- tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 - gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1 - Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ○ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Raßnesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 — Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— — utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— ×anthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.— Ziergräser-Neuheiten	- tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ ♯: - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm II-IV 0.80 - gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10—15 cm II-IV 1.— - Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10—15 cm II-IV 1.— - Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10—15 cm II-IV 0.80 - ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken. 20—30 cm VIII-IX 0.80 - hybr. Dawn ∧ Hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständigen Trauben. 15—25 cm VIII-IX 0.80 - vagans F. D. Maxwell ∧ Auffallende Schönheit mit eigenartig leuchtend lachskarminfarbenen Blumen in reicher Fülle. 20—30 cm VIII-X 0.80 - Lyonesse ∧ Wüchsige, großblumige Abart mit weißen Blüten. 20—30 cm VIII-IX 0.80 - St. Keverne ∧ Neue Sorte, die sich durch ihre prächtige, bei den Heidekräutern völlig neue, lachsrosa Färbung auszeichnet. 20—30 cm. VIII-X 0.80 Neue Moorbeetpflanzen
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Raßnesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 — Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— — utahensis J. Ä. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— ×anthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.— Ziergräser-Neuheiten Carex, Segge, Cyperaceae O—	- tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm II-IV 0.80 - gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10-15 cm II-IV 1 - Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10-15 cm
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. Ä. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— xanthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.— Ziergräser-Neuheiten Carex, Segge, Cyperaceae ○ — ① △ ⊥ Buchananii. Rehfellsegge. Sehr dekoratives, äußerst feinblättriges Gras von durchaus hellrebbrauner Färbung, wie es solche unter den Schmuckgräsern nicht mehr gibt. 60–70 cm	- tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rasinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblüchendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— xanthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.— Ziergräser-Neuheiten Carex, Segge, Cyperaceae ○ ● △ △ △ Buchananii. Rehfellsegge. Sehr dekoratives, äußerst feinblättriges Gras von durchaus hellrehbrauner Färbung, wie es solche unter den Schmuckgräsern nicht mehr gibt. 60–70 cm	- tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm
Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. Ä. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— xanthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.— Ziergräser-Neuheiten Carex, Segge, Cyperaceae ○ — ① △ ⊥ Buchananii. Rehfellsegge. Sehr dekoratives, äußerst feinblättriges Gras von durchaus hellrebbrauner Färbung, wie es solche unter den Schmuckgräsern nicht mehr gibt. 60–70 cm	- tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm

	11 1
Neue Moorbeetpflanzen Fortsetzung	Hydrangea, Hortensie, Saxifragaceae O L D 1 St. — macrophylla Domotoji, Fine bezaubernde Schönheit RM
Rhododendron hippophaeoides hybr. Kräftig	Eine bezaubernde bulbinett,
wachs. interessante Hybride mit großen, rosalila	der man die Hortensie nur an Wuchs u. Belaubung
Blumen	ansieht. Große, gefüllte Blütendolden hübsch rosa.
— praecox splendens. Kreuzung zwischen Rh. praecox	30-40 cm. Sommer
und Rh. dahuricum, die sich von der Stammsorte	— communis compressa. Miniaturwacholder. Bildet
durch einen strafferen, aufrechteren Wuchs und et-	ganz kleine, blaugrüne Säulchen u. ist gegenwärtig
was kleinere Belaubung unterscheidet. Die Blüten sind leuchtend rötlichlila III-IV 4.—	die zierlichste Konifere überhaupt. 15-20 cm 4
- racemosum hybr. delicatum. Eigenartige schöne Hy-	— squamata Mayeri, Geweihwacholder. Wundervoll.,
briden zwischen Rh. racemosum und Rh. praecox.	graublau bezweigte Art von sparrigem, aufrechtem,
Kräftige, lanzettliche Belaubung. Mittelgroße, zart-	aber langsamem Wuchs
rosa Blüten III-IV 4.—	Kolkwitzia, Scheinweigelie, Caprifoliaceae ()
— — roseum. Ähnlich voriger, jedoch mit frischrosa	- amabilis. Eine Neueinführung aus China mit glockig-
Blüten III-IV 4.—	röhrigen Blumen, die in der Form an Weigelien
Phyllodoce, Glockenheide, Ericaceae ○ △	erinnern. Sie sind von schöner, hellrosa Farbe und
- empetriformis splendens. Große Blütenglocken von	erscheinen in groß. Mengen. 120-150 cm. Sommer 2.—
dunkelkarminrosa Färbung. 10-15 cm V-VI 1.50	Ligustrum, Liguster, Oleaceae O- A L — ionandrum. Prächtiger, immergrüner, aufrechtwach-
Neue und seltene Gehölze	sender Zwergstrauch mit kleiner myrthenähnlicher
Buddleia, Sommerflieder, Loganiaceae ○ ¾ ⊥	Belaubung und weißen Blütensträußen. Im Herbst
— alternifolia. Die schlanken, leicht überhängenden	blauschwarze Beeren. 40-50 cm 1.50
Zweige tragen schmale, weidenartige Blätter, blatt-	Lonicera, Geißblatt, Caprifoliaceae O-
winkelständige Blütenbüschel von schöner rosalila	- Heckrottii. Starkwachsender Schlinger mit ziemlich
Farbe in großer Menge. 80-100 cm. Sommer 1.50	großer, ovaler tiefgrüner Belaubung. Die in lockeren
Chamaecyparis, Scheinzypresse, Pinaceae ○ △ ⊥	Sträußen stehenden Blüten erscheinen den ganzen
- Fletscheri. Schmale Säulen bildende Zwergkonifere in	Sommer hindurch. Die Knospe ist lebh. rosakarmin,
der Tracht eines Säulen-Juniperus mit silbergrauer	die geöffnete Korolle fleischfarbig, später goldgelb 2
Benadelung. Ein Edelstein unt. d. Zwergnadelhölz. 4.—	- Tellmanniana. Schlinger mit dunkelgrüner Belaubung
Convolvulus, Winde, Convolvulaceae O O A	u. langröhrigen, goldgelben Blüten in reicher Fülle;
- cneorum. Halbstrauchig, seidenhaarige silbergraue	ähnlich einer Azalea pontica. Sommer 2.—
Blättchen. Große weiße, rosa angehauchte Winden-	Parthenocissus (Ampelopsis) Efeu-Wein, Vitaceae
blüten. Sehr schön. 20–30 cm VIII-IX 1.50 Cotoneaster, Zwergmispel, Rosaceae ○ △	— tricuspidata var. Lowii. Herrlicher, stark auffallender, durchaus winterharter Selbstklimmer mit kleinem,
— amoena. Aufrechtwachsender, dichtverzweigter Zwerg-	gekräuseltem Laubwerk von rosaroter Herbstfär-
strauch mit graugrüner Belaubung u. roten Beeren	bung. Sehr eigenartige japanische Einführung 2.
in großen Mengen. 50-60 cm 2.50	Perowskia, Blauraute, Labiatae $\bigcirc \bigcirc \triangle \bot$
— Dammeri radicans (humifusa) ← Eine großblättrige	— abrotanifolia. Artemisiablättriger, silbergrau. Zwerg-
und in allen Teilen robustere Form von C. Dammeri.	strauch mit leuchtend blauen Blütenrispen.
Auch die Beeren erreichen die doppelte Größe.	40-50 cm VII-X 2,—
Außerordeutlich stark fruchtend 2.— horizontalis fol. var. Weißbuntblättrige Felsenmispel,	Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △
von der sich die roten Beeren prächtig abheben . 2.—	fruticosa Beesii. Sibergrau belaubt., niedriger Strauch,
- microphylla cochleata. Eine vornehme Erscheinung	dessen große, goldgelbe Blumen zu dem schönen
unt. d. Zwergmispeln. Im Wuchs ähnlich C. glacialis,	Laub herrlich kontrastieren. Blüht den ganzen
sich jedoch noch mehr an den Boden anschmiegend.	Sommer. 40-50 cm VII-IX 1.50 — Purdomii. Ein herrlicher, fein gefiederter Zwerg-
Belaubung rundlich, glänzend dunkelgrün. Beeren	strauch mit unzähligen hellgelben Blumen während
klein zinnoberrot 2.50	des ganzen Sommers. 40-50 cm VII-IX 1.—
— prostrata fructu sanguinea. Sich flach auf dem Erd-	Pyracantha, Feuerdorn, Rosaceae ○ - → △ ⊥
boden ausbreitende Felsenmispel mit roten Beeren 2.—	- coccinea praecox. Stacheliger, wintergrüner Strauch
Cytisus, Edelginster, Leguminosae ○ ∞ △ ♣ decumbens. Ganz flache Rasen bildende Ginsterart	mit weißen Blütenbüscheln. Er unterscheidet sich von
mit goldgelben Blüten in großen Massen. Sommer 1.50	der Stammform dadurch, daß der prachtvolle, rote
Escallonia, Saxifragaceae O _	Beerenschmuck 2-3 Wochen früher erscheint. Auch
- virgata. Herrlicher immergrüner vollst. harter Zwerg-	fruchtet die Pflanze bedeutend reicher V 2.—
strauch mit kleinen Blättchen und großen roten	— crenulata Rogersiana, Orangefeuerdorn. Groß-
Bouvardienähnlich. Blütenbüsch. 80-100 cm. Sommer 1.50	blättriger und großfrüchtiger als vorige Art mit noch lebhafteren, orangefarbenen Beeren 2.50
Evonymus, Pfaffenhütchen, Celastraceae O- A	Ribes, Zierjohannisbeere, Saxifragaceae O – 1 \triangle
- japonica acuta. Ein an Vinca major erinnerndes, immer-	- Gayana Äußerst seltener Zwergstrauch m. fast immer-
grünes Gehölz mit flach auf dem Boden liegenden, bis 1 m langen Ranken und prächtiger Färbung im	grüner Belaubung und gelben Blüten. 40-60 cm . 4.—
Herbstu, Wint. Gute Bodenbedeckungspfl. 20-30 cm 1.—	Salix, Zwergweide, Salicaceae ○ - • △
- obovata. Im Wuchs ähnlich E. nana Koopmannii,	- Bockii. Reizender, kleiner chinesischer Zwergstrauch
jedoch mit großen, rundlichen Blättern besetzt,	mit stumpfovalen, unterseits blauweiß behaarten
die sich im Herbst rosarot färben. Selten.	Blättchen und kleinen weißen Kätzchen während
20-30 cm	des Sommers. 40-60 cm
Fuchsia, winterharte Fuchsie, Oenotheraceae O-1 \(\text{\text{\$\sigma}} \)	- simulatrix. Kriechende Zwergweide, deren Zweige mit
grac. Tom Thumb. Eine durchaus winterharte Zwerg-	silberweißen Kätzchen besetzt sind. GuterWachser, jedoch nicht wuchernd. 30 em 2.—
fudsie, die den ganzen Sommer bis in den Herbst hinein überaus reich blüht. Die Kelchhülle ist rot,	
die inneren Kronblätter blau. Eignet sich ebenso	Senecio, Kreuzkrautstrauch, Compositae ○ ⊥ — Greyi. Immergrüner, silbergraublättriger, 1 m hoher
hervorragend als Topf- wie als Steingartenpflanze.	Zierstrauch mit großen gelben Kreuzkrautblüten in
Spielt in England eine gr. Rolle. 15-20 cm. Sommer 1.—	großen Büscheln, Sommer

Niedrig bleibende, winterhart-ausdauernde Stauden

für Steingärten, Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz Felsengehölze siehe Seite 82 Mittelhohe und hohe Stauden ab Seite 48

Es gibt wohl kaum eine Pflanzengruppe, die sich in den letzten Jahren solcher Beliebtheit erfreute, als die reizenden Kinder der Alpenflora, kurz Alpinen genannt. Wenn man unter dem Namen Alpinen ursprünglich nur Pflanzen unserer Alpenländer verstand, so bezieht man heute auch alle die herrlichen Kleinstauden mit ein, die unermüdliche Forscher und Sammler aus allen, unserem Klima verwandten Erdteilen, hauptsächlich den Gebirgen, zusammengetragen haben. Durch Züchterfleiß sind weiterhin eine ganze Anzahl Verbesserungen entstanden, so daß wir heute unter dem Sammelbegriff "Alpinen" über eine Riesenauswahl, im Charakter zusammenpassender Stauden verfügen, die sich durch ihren Formenreichtum, ihre Farbenpracht, ihre Reichblütigkeit und nicht zuletzt durch ihre Anspruchslosigkeit die Herzen aller Gartenfreunde erobert haben. Unser Umsatz beweist dies. Wir haben deshalb auch gerade dieser Pflanzengruppe unsere besondere Aufmerksamkeit gewidmet und alles schöne, was für unser Klima von Wert ist, in Kultur genommen (keine Pflanzen von nur botanischem Wert). Wir können Ihnen daher mit einer Auswahl dienen, die nur von ganz wenigen Firmen erreicht wird. Wenn Ihnen das Auswählen Schwierigkeiten macht, dann wenden Sie sich bitte an uns, wir machen Ihnen gerne Vorschläge. Auch verweisen wir nochmals auf unsere Sortimentszusammenstellungen auf Seite 5—8, die die besten und erprobtesten Sorten enthalten.

Eine große Anzahl alpiner Stauden und Zwerggehölze halten wir stets in Töpfen vorrätig, so daß sie ohne jegliche Gefahr das ganze Jahr über verschickt und gepflanzt werden können. Diese sind auch sehr für Geschenkzwecke geeignet.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 %, bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20 % (100 Stückpreis).

Sämtliche Pflanzen werden mit Namenschildern geliefert.

Wir machen besonders aufmerksam auf die sich wiederholenden Zeichenerklärungen.

THE INCIDENCE OF THE PROPERTY
Acaena, Stachelnüßchen, Rosaceae O O A A 1 St. Rasenbildende Stauden mit miniaturrosenblättriger Belaubung und kugelförmigen, stacheligen Früchten
im Sommer. Die Blüten sind weniger schön, die Fruchtstände um so interessanter. — Buchananii. Schön blaugrün belaubt, Blüten weiß 0.40
fissistipula var. violacea. Sehr hübsche Varietät, die besonders wertvoll ist, weil ihre Blätter im Winter eine prächtige, violette Färbung annehmen 0.40
glaucophylla. Starkwüchsige graublättrige Art 0.40 inermis. Mit silbrigbraungrüner Belaubung 0.40
microphylla. Feine, bräunliche Belaubung, purpurne Samenköpfchen
Früchten. Laub bräunlich
rotundifolia. Rundblättrige, starkwüchsige Form 0.40 sanguisorba. Rosenlaub. hellgrüne Art, Blüten weiß 0.40
Acantholimon, Igelpolster, Plumbaginaceae ○ ○ Ⅱ △ — androsaceum. Blaugrüne Polst., rosa Blüt. VII-VIII 1.50 — armenum. Silbergraue, nadelförmige Rosetten und
große, rosarote, nelkenähnliche Blütensträuße. 20 cm VII-VIII 1.50 — glumaceum. Stachelige, dichte, dunkelgrüne Polster
mit zahlreichen ährenähnlichen, leuchtend karmin- rosa Blumen. 10 cm VII-VIII 0.70
venustum. Graugrün belaubt, rosa Blütenähren. 10 cm 2.— Acanthus, Bärenklau, Acanthaceae ○ - □ △ Perringii. Tiefgezahnte, 15 cm lange Blätter bilden
wurzelständige Rosetten. Die großen Lippenblüten sind von prächtig rosa Farbe, 20 cm. VI-VII 0.50
Aceranthus diphyllus. Siehe Epimedium. Achillea, Alpenschafgarbe, Compositae ○ ∞ △
Niedrige, dichtrasige Pflanzen mit aromatischem, silbergrauem oder grünem Laubwerk. V-VII
ageratifolia. Weißblühende Art mit Ageratumblättern 0.40 aizoon. Silberweißblättrig, weiße Blumen. 20 cm 0.40 ambigua. Schöne, weiße Blüten. 15 cm 0.40
argentea. Reinweiße Blumen u. weißfilzige Belaubung 0.40 aurea. Feinzerteilte graue Belaub., goldgelbe Blüten 0.40 brachyphylla. Silbergraue Belaub., goldgelbe Blüten 0.40
- chrysantha. Längl.grünl Blätter, Blüten hellgelb. 20 cm 0.60 - Clavenae. Silbergraue Belaub., weiße Blüten. 15 cm 0.40 - conjuncta. Siehe Neuheiten 0.80
Formaneckii. Schöne lange Silberbl., weiße Blum. 20 cm 0.50 Fraasii canescens. Weißgraue Blätt., weiße Blum. 20 cm 0.50

Achillea (Fortsetzung)
- Fronmülleri. Schöne, grüne Rasen bildend, Blumen
- Hollindien. Schone, grune Rasen blidend, blumen
weiß
- Huteri. Graugrüne Belaubung, weiße Blüten. 15 cm 0.40
— Jaborneggi. Aschgraue Belaub., weiße Blüten. 20 cm 0.40
- Kellereri. Blätter schmal u. lang, silbergrau, weißbl. 0.50
- Kolbiana. Silbergraues Blattwerk, weiße Blüt. 15 cm 0.40
- Lewisii (King Eduard). Graue Belaubung, zartgelbe
Blumen. 20 cm
- lingulata. Blätter zungenförm., rosettenbild., weiße Blüt. 0.50
— macedonica. Aschgraue Belaub., weiße Blüt. 30 cm 0.40
- Portae. Graugrüne, stark gesiederte Blätter, weißbl. 0.40
- pseudopectinata. Silbergrau mit gelb. Blüten. 30 cm 0.40
- rupestris. Grün belaubt, Blüten weiß. 15 cm 0.40
- serbica. Große, schneeweiße Blumen, silbergraue Be-
laubung. 20 cm 0.40
- spinulifolia. Im Wuchs an Santoline chamaecyparissus
erinnernd. Blüten gelblich. 20 cm 0.40
— tomentosa. Graugrüne Belaub., goldgelbe Blütendold. 0.40
citring Siche Nouheiten
— — citrina. Siehe Neuheiten
- umbellata. Margueritenart. Blüten, silbergr. Belaub. 0.40
Wilczeckii. Ahnlich A. lingulata, große, weiße Blüten 0.40
Aconitum. Siehe unter mittelhohe Stauden.
Adenophora, Becherglocke, Campanulaceae ○ △
— palustris. Schmaleiförmige, grob gezähnte Blätter und
tiefblaue, röhrigglockige Blumen. 30 cm VII-VIII 0.60
Adonis, Adonisröschen, Ranunculaceae O- A
- amurensis. Goldgelbe, große, schalenförmige Blumen
— fl. pl. Dichtgefüllt, später blüh. 30 cm IV-V 1.50
- Nadorkakii. Goldgelb. Selten. 20 cm IV-V 1.50
- pyrenaica. Ähnlich vernalis, stärker wachsend.
30 cm IV-V 1.—
overable D. 1: DO: 1 'C' C' L. I.
- vernalis. Buschige Pflänzchen mit feinzerteiltem Laub,
große, goldgelbe Blüten, 15 cm IV-V 0.70
Aethionema, Steintäschel, Cruciferae O OO A A V-VI
- armenum. Aufrechte kleine Büsche, rosenrote Blüten.
30 cm 0.60
— cordifolium. Kleinherzblätterig, schön rosarot. 30 cm 0.60
COMMINIUM Blandarablattame school reservet 311 cm (101)
Cordifordin. Riemmerzolatterig, salon rosarot. 50 cm c.oc
— grandiflorum. Leuchtend rosa Blumen. 30 cm 0.60
— grandiflorum. Leuchtend rosa Blumen. 30 cm 0.60
— grandiflorum. Leuchtend rosa Blumen. 30 cm 0.60 — pulchellum. Nadelförmige, blaugrüne Belaubung mit
— grandiflorum. Leuchtend rosa Blumen. 30 cm 0.60 — pulchellum. Nadelförmige, blaugrüne Belaubung mit rosa Blütenträubchen. 15 cm 0.40
— grandiflorum. Leuchtend rosa Blumen. 30 cm 0.60 — pulchellum. Nadelförmige, blaugrüne Belaubung mit rosa Blütenträubchen. 15 cm 0.40 — Warley rose. Polster mit leuchtend rosa Blüt. 15 cm 0.60
 grandiflorum. Leuchtend rosa Blumen. 30 cm 0.60 pulchellum. Nadelförmige, blaugrüne Belaubung mit rosa Blütenträubchen. 15 cm 0.40 Warley rose. Polster mit leuchtend rosa Blüt. 15 cm 0.60 Agrostis. Siehe unter Ziergräser.
 grandiflorum. Leuchtend rosa Blumen. 30 cm 0.60 pulchellum. Nadelförmige, blaugrüne Belaubung mit rosa Blütenträubchen. 15 cm 0.40 Warley rose. Polster mit leuchtend rosa Blüt. 15 cm 0.60 Agrostis. Siehe unter Ziergräser.
— grandiflorum. Leuchtend rosa Blumen. 30 cm 0.60 — pulchellum. Nadelförmige, blaugrüne Belaubung mit rosa Blütenträubchen. 15 cm 0.40 — Warley rose. Polster mit leuchtend rosa Blüt. 15 cm 0.60 Agrostis. Siehe unter Ziergräser. Ajuga, Günsel, Labiatae ○ ● ≅ △
 grandiflorum. Leuchtend rosa Blumen. 30 cm 0.60 pulchellum. Nadelförmige, blaugrüne Belaubung mit rosa Blütenträubchen. 15 cm 0.40 Warley rose. Polster mit leuchtend rosa Blüt. 15 cm 0.60 Agrostis. Siehe unter Ziergräser.



Leontopodium alpinum



Saxifraga sancta



Primula denticulata



Anemone pulsatilla



Adonis vernalis



Iris pumila hybrida

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Alexandra cavatile (F. / /)
Ajuga (Fortsetzung)	Alyssum saxafile (Fortsetzung) — sulphureum. Silbergraue Belaubung mit hell-
genevensis Brockbankii. Aufrechtwachs., dunkel-	goldgelben Blütensträußen. 30 cm 0.40
blaue Blüten. 10 cm 0.40	- serpyllifolium. Kleinblättr., kriech., Blüten gelb. 10 cm 0.40
— — Tottenhamii. Aufrechtwachsend, purpurrote Blüten 0.50	- spinosum. Silbergraublättriges Sträuchlein, vollbesetzt
metallica purpurea. Rot metallisch glänzende Blätter,	mit weißen Blütchen. 25 cm. Selten 0.75
blaue Blüten. 10 cm 0.30	— roseum. Mit rosa Blütchen. 25 cm. Sehr Selten . 1.50
- crispa. Glänzend grüne, gekrauste Belaubung, eine	Anacyclus, Zwergmarguerite, Compositae ○ △ — depressus. Die Pflanze bildet aschgraue Rasen mit
ganz interessante Erscheinung. Selten. 10 cm 0.50 reptans fol. var. Mit schönen weißbunten Blättern u.	fein gesiederten Blättchen und bedeckt sich mit rot-
blauen Lippenblütchen. 10 cm 0.40	violetten Knospen bezw. mit großen, weißen
- foliis multicoloris. Die Färbung ist der Alternan-	Strahlenblüten. 5 cm VI-VIII 1.—
thera Juwel ähnlich, auf der rotbraunen Grundfarbe	Anaphalis, Strohblume, Compositae ○ ∞ △ ∧
der Blätter erscheint die in roten Tönen gehaltene	- Royleana. Kriechende Polster bildend, Belaubung grau-
unregelmäßige Zeichnung derselben. 10 cm 0.30	filzig, Blumen gelb. 20 cm VII-VIII 0.50
- fol. purpureis superba. Blätter dunkelbraunrot,	- cinnamomea. Zimtbraune Blättch., Blüten weiß. 30 cm 0.50
tiefblaue Blüten. 10 cm , 0.40	— triplinearis. Weißfilzige Blätter, weißblühend. 20 cm 0.50 Anchusa myosotidifl. Siehe mittelhohe Stauden.
— rosea, Grüne Belaubung, rosa Blüten, 15 cm 0.30 Alchemilla, Frauenmantel, Rosaceae $\bigcirc - \bigcirc \cong \triangle$	Androsace, Mannsschild, Primulaceae O - 1 \(\triangle \)
— alpina. Behaarte, nierenförmig geteilte Blätter und	Vielgestaltige Gattung. Teils rasige, teils Rosetten
grünlichgelbe Blüten. 10 cm VI-VIII 0.40	oder Kugelpolster bildende Pflanzen mit meist
- vulgaris. Große, nierenförmig geteilte Blätter, Blüten	silbergrauer Belaubung und primelartigen Blüten-
grüngelb. 20 cm VI-VIII 0.40	dolden. Die auserlesensten und typischsten Alpen-
Allium, Alpenblumenlauch, Liliaceae O-1 A	kinder, wahre Wunderwerke der Schöpfung. Lieben
Doldenblütige, sommergrüne Zwiebelgewächse mit	humosen Boden, 5-10 cm IV-VI
grasartiger Belaubung. Lieben humosen, trockenen	 arachnoidea. Kleine, weiß übersponnene Rosetten . 0.60 carnea brigantiaca. Reichblüh., weißbl. Zwergsorte 0.50
Boden VII-VIII — albopilosum. Bis 25 cm breite, lilafarbene Blüten-	— Laggeri. Kleine, dichte Rasen bildend, hellrote Blüt. 0.60
dolden auf festen Stielen. 30 cm. Sehr dekorativ. 0.60	— Halleri rosea. Sehr feinrosettig, rosa Blumen 0.80
- cyaneum. 20 cm hohe, himmelblaue Blüten 0.40	- chamaejasme. Rosetten flach, Blüten weiß mit gelbem
— — album. Sehr schöne, weißblühende Abart d. blauen	Schlund
Blumenlauchs. 15 cm 0.40	- cinerea. Silbergraue Belaubung, rosarote Blütchen . 0.60
— coelestinum. Leuchtend hellblaue Varietät. 15 cm 0.40	— foliosa strigilosa. Breitblättrig, hellrosa Blumen 0.70
- superbum. Schöne, dichte, dunkelviolette Blüten-	- lactea. Polster bildend. Blütchen weiß 0.50
köpfe. 15 cm. Die späte Blütezeit machen diese Sorten für den Steingarten besonders wertvoll . 0.50	— lanuginosa. Zartrosa blühend, auf kleinen Ranken . 0.50 — Leichtlinii. Blüten weiß mit rotem Auge 0.60
Farreri. Purpurfarbene Blütendolden. 30 cm 0.50	— oculata. Weiß mit gelbem Auge
flavum. Hellgelbe Blüten. 20 cm 0.40	— obtusifolia. Weißblühend. Selten 0.50
- karataviense. Breite, bläuliche, zungenartige Blätter	- sarmentosa. Wolligseidige Blattrosetten und kleine
und große, rosafarbige Kugelblüten. 20 cm 0.50	Dolden rosafarbener Blütchen, sehr wüchsig 0.40
moly (luteum). Breite, blaugrüne Blätter, leuchtend	— Chumbyi. Kriechend, silberw. Belaub., lila Blütch. 0.50
gelbe Blütendolden. 30 cm 0.40	— primuloides.Große, rosarote Blum. auf schön.Polst, 0.50
narcissiflorum (pedemontanum). Auf festen Stielen großglockige purpurne Blütendolden. 20 cm 0.50	— — Watkinsii. Leuchtend rosarot, sehr gut gedeihend 0.40 — sempervivoides. Blätt. fleisch. dachziegelig, Blüt. rosa 0.60
odorum. Schöne, weiße Blütendolden. 30 cm 0.50	— villosa. Blätt. dicht weiß behaart, Blüt. weiß b. rosenrot 0.50
Ostrowskianum. Große, karminpurpurne Blüten. 30 cm 0.50	- yunnanensis. Ähnlich A. sarmentosa mit leuchtend
pulchellum. Lilarote, lockere Blütendolden. 30 cm 0.40	rosaroten Blüten in großer Menge. Selten 0.60
- sikkimensis. Blaue, hängende Glöckchen. 20 cm 0.50	Anemone, Buschwindröschen, Ranunculacea → △△
speciosum. Siehe Neuheiten 0.60	Beliebte Frühlingsblume. Eignen sich vortrefflich zur
sphaerocephalum. Blütendolden purpurkarmin. 50cm 0.50	Unterpflanzung von lichtem Gebüsch. Lieben hu-
tibeticum. Siehe Neuheiten	mosen Boden IV-V — apennina ∧ Große, schöne, himmelbl. Blüten.InWuchs
yunnanensis. Weiße Blütendolden. 20 cm. Selten 0.60	u. Belaubung gleicht sie unserem Buschwindröschen 0.50
Alyssum, Steinkraut, Cruciferae O O A Meist grau-	— — alba A Schöne, weißblühende Form. 15 cm 0.50
grünlaubige Stauden mit gelben Blüten. Sie sind	— blanda atrocoerulea ∧ In Belaubung d. vorig. ähnlich,
sehr reichblühend und passen sehr schön zu Au-	aber noch früher blühend, dunkelblauviolett. 15 cm 0.60
brietien, Iberis und Polsterphlox, mit denen sie zu-	- nemorosa. Weiß. Busch-Windrösch., Osterblume. 10cm 0.30
sammen blühen V-VI	— — Allenii. Großblumig, weichlila, eine der schönsten 0.70 — — Blue Beauty. Lichtblau mit silbrig. Rückseite. 20 cm 0.80
amanum. Silbergraue Polster, gelbe Blumen. 10 cm. 0.40	— Celestial. Klares, helles Himmelblau. 15 cm 0.70
großen, gelben Blütensträußen. 30 cm 0.40	cornubiensis. Dunkellila m. purpurnem Schein. 15cm 0.80
— diffusum. Dunkelgrüne Polster, Blumen gelb. 10 cm 0.40	- fl. alba pl. Weißgefülltes Buschwindröschen. 10 cm 0.60
Moellendorfianum. Kriechend, silbergraue, rundliche	— — fl. rubra. Rosa blühend. 10 cm
Blättchen und gelbe Blütenbällchen. 10 cm 0.40	— Robinsoniana. Zarthellblau. 10 cm 0.70
- montanum. Graugrün, kriechend, gelbe Blüten. 15 cm 0.40	- ranunculoides. Gelbes Buschwindröschen. 10 cm 0.40
— pyrenaicum. Graugrün belaubt, weiße Blüten. 15 cm 0.40	— fl. pl. Gelb gefüllte Spielart, kleinblumig. 20 cm. 0.60
repens. Niedrige Polster, gelbblühend. 10 cm 0.40	— Zeemannii. Hellgelber Bastard zwischen A. nemorosa und ranunculoides. 15 cm
- saxatile compactum. Blätter silbergrau behaart, Blüte rehr reich, leuchtendes Gelb. 30 cm 0.40	Anemone, Kuhschelle, Ranunculaceae ○ △
— citrinum. Schöne, hellschwefelgelbe Blüten. 30 cm 0.40	Behaarte Belaubung, nickende Blüten und auf-
—— fl. pl. Große Sträuße dichtgefüllter, goldgelber Blüt-	fallende Fruchtperücke. Lieben humos. Boden. IV-V
den. 30 cm	— albicyanea (albana hybrida). Feinzerschlitzte Be-
- fol. var. Weißbunte Art, Blüten goldgelb. 30 cm 0.50	laubung, nickende, mattlila Blütenglocken. 20 cm 0.40

fol. var. Weißbunte Art, Blüten goldgelb. 30 cm 0.50


Anemone (Fortsetzung)	Arabis albida (Fortsetzung)
— amoena. Prächtige, violette Glocken. 20 cm 0.50	— rosea. Blumen v. zartrosenroter Farbe, die namentl.
— montana rubra. Rotblühende Küchenschelle. 20 cm. 0.50	in nicht zu sonniger Lage schön hervortritt. 15 cm 0.30 — superba. Bes.großblum. Varietät, Blüten weiß. 20cm 0.30
- Halleri. Ähnlich Anemone Pulsatilla mit größeren, außen zottigeren Blüten. 20 cm 0.60	— alpina coccinea. Siehe Neuheiten
pulsatilla. Mit violetten Blüten. 15 cm 0.40	— Rosabella. Große Blüten von leuchtender rosa Farbe, die im Verblühen nicht hell wird. 15 cm. 0.40
— Mrs. v. d. Elst. Prachtv. rosa blühend. 20 cm. Selten 1.50 — regalis. Riesenblütige pulsatilla. 30 cm. Selten 2.—	- Schneehaube. Siehe Neuheiten 0.60
— coccinea. Scharlachdunkelrot. 30 cm. Selten 2.	— androsacea. Zierl. Art mit silbriggrünen Blätt. 10 cm 0.40
— Weißer Schwan (alba). Reinweißblühend. 15 cm 0.60	— caespitosa. Glänz. grüne Polster, weiße Blüten. 10 cm 0.60 — carduchorum. Niedrig, rasenbildend, weißblüh. 10 cm 0.40
vernalis. Violettweiße, kleine Glocken. 10 cm 0.70 Anemone, Alpenanemone, Ranunculaceae ○ - ● △	— Ferdinandi Coburgi. Graugrüne Belaubung, kleine
- alpina. Die weiße Alpenanemone. 20 cm VI-VII 0.80	weiße Blütentrauben. 10 cm 0.50 — Halleri. Lockere Polster mit zierl., weißen Blüt. 10 cm 0.40
— baldensis. Eine alpine Form von A. silvestris mit	- Kellereri. Hübsche, aschgr. Polster, Blüt. reinweiß. 10cm 0.50
großen, weißen Blumen. 20 cm IV-V 0.70 — sulphurea, Gelbblühend. 30 cm VI-VII 0.70	— procurrens. Saftiggrüne Polster m. weiß. Blütch. 10 cm 0.30
caroliniana (decapetale). Schwefelgelb blühendes,	— Scopolii. Dunkelgrüne Rasen, weiße Blüten. 10 cm. 0.50 — Sturii. Dunkelgrüne Polster, weißblühend. 10 cm 0.40
großblumiges Bergwindröschen, ähnlich Anemone silvestris, jedoch grundverschieden in der Belaub. 0.80	— Sündermannii. Schöne, graugr. Polst., weiße Blüt. 10 cm 0.50
Lesseri. Siehe Neuheiten	 vochinensis. Kleine zierliche Art, weißblühend. 10 cm 0.40 Wilczekii. Sehr schöne Polster bildend, weiß. 15 cm 0.60
narcissiflora. Kräftigwachsende Art, mit weißen, doldenständigen Blüten. 30 cm V-VII 0.70	Arenaria, Sandmiere, Cariophyllaceae $\bigcirc \bigcirc \triangle \triangle$
doldenständigen Blüten. 30 cm V-VII 0.70 pratensis. Dreifachfiederteilig, Blum. dunkelviol. 25 cm 0.60	Duftige, nadelblättrige Kissen bildende Pflanze
Antennaria, Katzenpfötchen, Compositae O O A a	- armeriastrum. Sehr schöne grüne starre Polster bil- dend, weißblühend. Selten VI-VII 0.70
Dichte Polster bildende Pflanzen mit aschgrauer bis silberweißer Belaub. u. kleinen Strohblümchen.	— caespitosa. Siehe Sagina subulata.
- alpina. Kleines, silbergraues Blattw. 5 cm V-VI 0.40	- foliosa. Grob nadelblättrig, Blüten groß, weiß. 10 cm 0.50
aprica. Besond. großblättrig, silberweiß. 10 cm 0.30	— grandiflora. Großblumig, weiß. 20 cm . VI-VIII 0.40 — Ledebouriana.Blaugraue Rosett.,gelbgrüneBlüt.20cm 0.50
hellrosa. 10 cm V-VI 0.30	— montana. Prachtv. Art, blendendweiße Blüten. 10 cm 0.40
- rubra. Wie vorsteh., jedoch rosenrote Blüten. 10 cm 0.40	— purpurascens. Blättchen glänzenddunkelgrün, Blüten
rosularis. Silberweiße kleine Blättchen. 5 cm 0.50 tomentosa candida. Blätter silbergr., Blütchen weiß.	hellrosa. 10 cm VII-VIII 0.50 — rigida. Schöne grüne Polster bildend, weiß. 10 cm . 0.40
10 cm V-VI 0.30	- Rosanii. Siehe Minuartia.
Anthemis, Bergkamille, Compositae ○ △ Aromatisches Laubwerk u. margueritenähnl. Blüten VI-VIII	— rotundifolia. Feste Polster mit runden Blättchen, weiß- blühend. 3 cm VI-VII 0.30
aizoon. Siehe Achillea aizoon.	- tetraquetra. Dichte Polster, deren vierzeilig angeord-
Biebersteinii. Die feinzerteilt. Blätter sind silbrigseidig	nete, übereinander liegende Blättchen die Triebe vierkantig erscheinen lassen. 5 cm VII-VIII 0.50
behaart; die Blüte ist gelb. Sehr feine Art. 25 cm 0.50 — carpathica (styriaca). Feinzerteilte graugrüne Belaub.,	Aretia vittaliana. Siehe Douglasia.
blendendweiße, ziemlich große Margaretenbl. 20 cm 0.40	Armeria, Grasnelke, Plumbaginaceae ○ ∞ △ : :
— cinerea. Große, weiße Blüten. 20 cm 0.50 — montana. Feinlaubig, weißblühend. 15 cm 0.40	Dichte, runde Büschel grasartiger Blätter u. rote, weiße oder rosa Blütenköpfe IV-VI
santolinoides. Frischgrüne Rasen, fein zerschlitzte	— alpina. Runde Büsche grasartiger Blätter, Blüten-
Belaubung, gelblichweiße Blumen, besonders stark	köpfe leuchtend rot. 20 cm
aromatisch duftend. 30 cm 0.40 Anthyllis, Wundklee, Leguminosae ○ ∞ △	bildend, rosa Blüten. 5 cm 0.60
montana. Schmetterlingsblütler mit behaarten Fieder-	— alba. Weißblühend, sonst wie vorige 0.60
blättern. Hübsch rosa. 20 cm V-VI 0.50 - angustifolia. Schmalblättrige und starkwüchsige	— formosa splendens. Dichte Rosette, lanzettliche Blätter, blendend rote Blütenköpfe. 30 cm0.50
Form. 20 cm V-VI 0.60	- hybr. Bees Ruby. Mit 30 cm hohen Stielen u. großen
vulneraria rubrifolia. Grob schmalförmige Belaubung, rosarote Blumen. 30 cm V-VII 0.40	leuchtend rosaroten Blütenköpfen
Antirrhinum, Löwenmaul, Scrophulariaceae O A A	— majellensis. Kräftige Belaubung, lilarosa Blüt. 30 cm 0.50
glutinosum. Ahnelt dem bekannten Löwenmäulchen,	— maritima. Mit lilaroten Blütenköpfen. 30 cm 0.30 — alba. Ähnl. der vorigen, mit reinweißen Blüt. 30 cm 0.30
ist jedoch mehr niederliegend. Blüten weißlichgelb. 30 cm VII-X 0.60	— Laucheana. Lilarosa, reichblüh. u. großblumig. 30 cm 0.30
Aposeris, Hainlattich, Compositae 1 – 1 \triangle	- rosea compacta. Frischkarminrosafarbene Blüten
foetida. Hübsche, löwenzahnartige, gelbblühende Pflanze für absonnige und feuchte Stellen. 15 cm 0.50	auf kräftigen Stielen. 20 cm
Aquilegia, Akelei, Ranunculaceae O-1 A	und reichblühend. 30 cm 0.40
alpina. Alpenakelei. Leudit. blau. 30 em V-VI 0.60	— Vindictive. Kräftig wachsende Sorte m. leuchtend purpurkarminroten Blütenköpfen. 15 cm 0.50
Helenae (flabellata nana). Dunkelblau mit weißer Korolle. 30 cm V-VI 0.50	Arnebia, Prophetenblume, Borraginaceae ○ △
Arabis, Gänsekresse, Cruciferae ○ △ : 1 □	- echioides. Die 30 cm hohen Blütenstengel bringen
Rasen- oder rosettenbildende Stauden mit einer Fülle von Blütentrauben III-IV	eine Menge schön goldgelber, im Schlunde mit 5 schwarz. Fleck. gezierte Blumen hervor IV-V 1.—
albida atrorosea. Siehe Neuheiten 0.80	Arnica, Wohlverleih, Compositae O-1 \(\triangle \)
- tl. pl. Die Rispen dichtgefüllter Blumen sind kleinen,	— longifolia. Siehe Neuheiten
gefüllten Nachtviolen ähnlich und liefern ein vorzügliches Schnittmaterial. 20 cm 0.30	— monfana. Goldgelbe Marguerite. Bekannt. Heilmittel für Wunden. 35 cm VI-VIII 0.50
- tol. var. Hübsche weißbuntblättrige Form, Blüten	- sacchalinensis. Goldgelb, besonders große Blumen.
weiß. 20 cm	30 cm VI-IX 0.50



Viola cornuta Spassvogel



Soldanella pusilla



Globularia trichosantha



Tunica saxifraga robusta fl. pl.



Achillea macedonica



Asperula nitida



Opuntia xanthostemma orbicularis



Carlina acaulis



Phlox subulata Sprite -



Cyclamen europaeum

	A. T.
Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Astragalus, Tragant, Leguminosae O O A Niedergestreckte, aufstreb. Triebe unpaariggefiederte Blätter,
Artemisia, Edelraute, Compositae O O A II	rundköpfige Blütentrauben. 20 cm VI-VII
Zwergbuschige, meist silberweiß belaubte Stauden.	- alpinus. Kriechende Polster, Blumen blauweiß 0.80
Blüten nur botanisch interessant, dafür ist aber das aromatische Laubwerk um so schöner.	- angustifolius. Prächt., silbrige Stachelpolst., Blüt. weiß 0.60
Baumgartenii. Breitgesiederte Silberblätter. 15 cm . 0.70	- aristatus. Hellgrüne stachelige Zweige, Blüten rosa . 1:50
- brachyphylla splendens. Feinzerteilte silbr. behaarte	— hypoglottis (purpureus). Buschige Polster, rote Blütenköpfe
Blätter. 10 cm	Astrantia, Sterndolde, Umbelliferae ○ – ① △
— caucasica. Großweißfilzige Polster. 20 cm 0.60	- carniolica. Zierliches, kleines Pflänzchen mit zerteilten
— lanata (pedemontana). Lockerrasig, silberweiß. 10 cm 0.50 — mutellina. Noch niedriger wie die vorige. 10 cm 0.50	Blättern und grünlichweißen Blütendolden.
— pontica. Silbergraue Belaubung. 30 cm 0.50	15 cm V-VI 0.50 Aubrietia, Blaukissen, Cruciferae ○ △ : □ □
- rupestris. Graugrüne Belaubung. 20 cm 0.50	Alle Aubrietien bilden dichte, niedrige Polster von
— Stelleriana. Silberweißblättrig, 40 cm 0.50	meist graugrüner Belaubung, welche im Frühling
Arum. Siehe mittelhohe Stauden. Asarum, Haselwurz, Aristolochiaceae ◑–• ㅛ	jedoch völlig verschwinden unter der Fülle der
— europaeum. Staude für waldige Plätze, frischgrün.	Blüten. 10 cm IV-V
lederartiges aromatisches Laubwerk. 10 cm 0.30	 croatica. Zierlichste u. kleinste von all. Aubrietien, blau 0.40 deltoidea. Hellila, sehr frühblühend 0.30
Asperula, Waldmeister, Rubiaceae ○ – ① △ △	— Alfred Willcock. Großblumig, rotviolett 0.50
Verwandte unseres Waldmeisters mit nadelförmigen	- Blue King. Lavendelblau, sehr großblumig 0.40
Blättchen. Lieben, mit Ausnahme des heimischen Waldmeisters, frisch humose, sonnige Lage.	— — Campbell Improved. Dunkelpurpurblau 0.40
10-20 cm V-VII	- Dr. Mules. Groß, leuchtend dunkelviolett 0.40
- Athoa. Graugrüne Polster, gelbblühend 0.70	— Feuerkönig. Leuchtend rot
- capitata. Ein duftiges Kissen, weißblühend 0.00	- Gloriosa. Leuchtend rosa, großblumig 0.50
- cynanchica. Üppiges Polster, rosablühend 0.60	— Godstone. Siehe Neuheiten
— Gussonei. Dunkelgrüne Polster, rosa Blütchen. 5 cm 0.70 — hirta. Reizende, rosablühende Alpine, schöne, lockere	— Hendersonii. Schön violettblau 0.30
Polster bildend	— H. Marshall. Leuchtend violett, großblumig 0.40
- longifolia. Lange nadelförmige Belaubung, weiße	— Lavender. Prächtig hellavendelblau 0.40 — Leichtlinii Crimson. Großblumig, leuchtend rot 0.40
Blütendolden 0.00	- Lilakönigin. Gutremontierende Sorte mit besonders
 nitida. Polsterbildend mit zierlichen rosa Blütchen . 0.50 odorata. Der bekannte Waldmeister, der sich auch zur 	großen, hellila Blumen, sehr vornehme Färbung 0.50
Deckung kahler und schattiger Plätze in Gärten	- Magnificent. Siehe Neuheiten
vorzüglich eignet	 — Moerheimii. Großblumig von schöner rosa Farbe 0.40 — Mrs. Lloyd Edwards. Leuchtend dunkelpurpurblau 0.40
- suberosa. Aschgraue Pölsterch. mit rosa Blüt. übersät 0.80	—— Pauls Lilac. Zartrosalila, großblumig 0.40
Asphodeline. Siehe mittelhohe Stauden.	— Peter Barr. Großblumig, dunkelviolett 0.50
Aster, Bergaster, Compositae O A & :: Bilden rundliche Büsche und sind sehr anspruchslos . V-VI	- Prichards. Herrlich dunkelviolette Blüten 0.30
— alpinus. Reichblühend, hellblau. 20 cm 0.40	- Prinzessin Wunderhold. Siehe Neuheiten 0.80
— — albus. Weiße Form. 20 cm	— Purple Robe. Purpurrosa, großblumig 0.30 — Purpurkönig. Dunkelpurpur 0.40
— — Dunkle Schöne. Tiefdunkellila. 20 cm 0.50	— Purpurteppich. Leucht. dunkelviolette, groß. Blum. 0.40
— Goliath. Sehr große hellblaue Blüten. 20 cm 0.40 — Güte. Siehe Neuheiten	— rosea splendens. Großblumig, leuchtend rosa . 0.40
— Liebe. Siehe Neuheiten	- Russel Vincent. Siehe Neuheiten 1
— — magnificus. Besonders großblumig, hellblau. 10 cm 0.40	 The Queen. Rotviolett, sehr reichblühend 0.40 Vera Prichards. Große, karminrote Blumen 0.50
— — Mut. Siehe Neuheiten	- Vesuv. Siehe Neuheiten
— Nixe. Großblumig, rosalila. 20 cm 0.40	- Vindictive. Dunkelrot, sehr großblumig 0.50
— Reinheit. Siehe Neuheiten	— graeca grdfl. Großblumig, violettblau 0.30
Blumen, edel geformt, herrlich weichlila. 15 cm . 0.40	— — superba. Sehr kompakt bleibende Form. Große, hellila Blumen
— ruber. Blumen rosarot. 20 cm 0.50	- tauricola. Dunkelblaue, ganz niedrig bleibende Art . 0.30
- Schönheit. Siehe Neuheiten	— — alba. Große weiße Blumen 0.40
— Stolz. Siehe Neuheiten	Azorella, Andenpolster, Umbelliferae O – 1 🛆 🕮
men, äußerst reichblühend, hellblau. 20 cm 0.30	- peduncularis. Immergrüne, noch dichtere Polster als
— Treue. Siehe Neuheiten 0.80	A. trifurcata. Selten V-VI 0.80 — trifurcata. Herrliche, immergrüne, unverwüstliche
— — Wunder. Siehe Neuheiten	Polsterstauden mit gezackten Blättchen, Blüten
- Andersonii. Rasenbildende Art, m. kleinen lila Blumen 0.30	grünlichweiß V-VI 0.40
- brachystrichus. Tracht wie A. subcoeruleus, jedoch früher blühend. Blumen hellblau. 30 cm 0.50	Bahia, Wüstenfeinstrahl, Compositae ○ ∞ △
— sibiricus. Lila Sternblüt., lanzettliche Belaubung. 20 cm 0.50	— lanata, Graufilz. Belaub., gelbe Strahlenblüten. 20 cm 0.40
Astilbe, Zwergspiraee, Saxifragaceae O-O Leder-	Banffia petraea. Siehe Gypsophila transylvanica.
artige, gekrauste dunkelgrüne Belaub. VII-VIII	Bellium, Zwergbellis, Compositae ○ - ♠ △ - minutum. Reizendes, kleines Pflänzchen mit weißen,
- crispa Däumling. Blüten hellrosa mit dunkler. Spitzen,	an Gänseblümchen erinnernde Blumen. Blüht den
etwas kräftiger wachsend wie die übrigen crispa 0.60 – elata. Siehe Neuheiten	ganzen Sommer hindurch. 5 cm 0.40
- Gnom. Frischrosa, gut verzweigte, kleine Rispen 0.60	Bergenia (Megasea) Saxifragaceae ○-① △ : Derbe
— Kobold. Dunkelrosa Rispen. 15 cm 0.00	Stauden mit meist immergrüner, großer, rundlicher
Liliput. Pyramidale Rispen von hellrosa Farbe 0.60	Belaubung u. hohen Blütendolden. Lieben frischen,
— Perkeo. Purpurlila, besonders nieder. 15 cm 0.60	humosen Boden IV-V — ciliata. Längleiförmige Blätter u. rosa Blüten. 20 cm 0.60
- sinensis pumila. Prächtige, kleine Ausläufer treibende Art mit rötlichlila Rispen in großer Zahl. 30 cm. 0.50	— cordifolia. Dunkelrot, sehr großblumig. 30 cm 0.40
The same of the sa	

Bergenia (Megasea) (Fortsetzung)	Campanula (Fortsetzung) 1 St. RM
- cordifolia erecta. Große, aufrechte, rosa Blüten-	— glomerata acaulis. Dichte, runde Sträuße dunkel-
dolden. 20 cm	violetter Glockenblumen, fast stengellos, auf saftig-
— purpurea. Blätter und Blüten dunkelrot. 30 cm. 0.50 — crassifolia. Frühblühende Blattstaude mit großen, glän-	grünen Blattrosetten. 10 cm 0.40
zendgrünen Blättern und rosaroten Blüten. 30 cm 0.40	 hybr. Abundance. Siehe Neuheiten 0.80 Hendersonii. Siehe Neuheiten 1.20
- Delavayi. Kerbzähnige Blätter, rosa Blütendold. 20 cm 0.50	— R. B. Loder. Siehe Neuheiten
orbicularis. Rundliche Blätter, rosenrote Blüt. 30 cm 0.50	- istriaca. Aus der Verwandtschaft der C. garganica, aber
— pacifica. Kleine, eiförmige Blätter, Blüt. rosa. 20 cm 0.50 — Schmidtii. Rundl. eiförm. Blätter, rosarote Blütendold. 0.50	kräftiger wachsend, mit hellila Sternblüten. 10 cm 0.60 — pelviformis. Flache, tellerförm. hellblaue Blum. 20 cm 0.50
- speciosa. Sehr frühblühend, rosa. 30 cm 0.50	— alba. Weißblühend, sonst wie vorige. 20 cm 0.50
Stracheyi. Frischgrüne Belaubung. Blüt. weißlichrosa 0.60	- Portenschlagiana. Niedrige Art mit dunkelblauen
Betonica nivea. Siehe Stachys.	Blüten, schön für Mauern. 10 cm 0.50
Brunella, Braunelle, Labiatae O- A Guter Dauer- blüher mit ansehnlichen Lippenblüten in dichten	— muralis. Etwas schwächer wachsend wie die vorher- gehende u. einige Tage früher m. d. Blüte beginnend 0.50
Ähren. 15-20 cm VII-VIII	- Poscharskyana. Siehe Neuheiten 0.60
grandiflora alba. Große reinweiße Blüten 0.40	- Pipperi. Ähnl. rhomboidalis m. hellblauen Blüt. 30 cm 0.40
- rosea. Schön karminrosa 0.40 - incisa. Blum. dunkelviolett, Blätt. tief eingeschnitt. 0.40	pulla Tiefdunkelviolette nickende, große Glock. 10 cm 0.50 alba. Siehe Neuheiten
rubra. Dunkelrosa blüh. Varietät der vorhergeh. 0.40	— pulloides. Hübsche Hybride von kräftigem Wuchs, mit
Webbiana. Große violette Lippenblumen 0.40	verhältnismäßig großen, dunkelvioletten Glocken;
Calamintha alpina. Siehe Satureia.	außerordentlich reichblühend. 15 cm 0.50
Calceolaria, Pantoffelblume, Scrophulariaceae	— punctata. Mit unterseits rot. Blattwerk v. weinroten, fingerhutähnlichen, hängenden Blütenglock. 30 cm 0.50
- polyrrhiza. Mit verkehrt eiförmigen, fast grundstän-	— alba. Weißblühende Form. 30 cm 0.50
digen Blättern und gestielten, gelben pantoffel-	- pusilla. Kleine, hellblaue Glöckchen, sehr reichblühend,
förmigen Blüten. 15 cm VI-VII 0.80	reizend für Mauern und Felspartien. 10 cm 0.40
Callianthemum, Jägerkraut, Ranunculaceae ○ △ — anemonoides. Anemonenartige weiße Blüten.	— — alba. Mit kleinen, weißen Glöckchen. 10 cm 0.40 — — Hallii. Mit zieml.groß. bläulichweißen Glock. Selten! 0.70
20 cm	- Mif Willmott. Silbrighellblau, großblumig. 10 cm 0.50
Caltha. Siehe mittelhohe Stauden.	— pallida. Mattblaue Glöckchen. 10 cm 0.40
Campanula, Zwergglockenblume, Campanulaceae	— Seiberti. Dunkelgrüne Belaubung u. stark dunkel- blaue Blüten, die in großer Fülle erscheinen. 15 cm 1.—
Gehören zu den schönsten und dankbarsten Felsen-	— tiroliensis. Großblumige dunklere Varietät. 10 cm 0.40
stauden. Bilden dichte Büsche oder lockere Rasen,	- Raddeana. Zierliche Art, violette Glöckehen, sehr
welche zur Blütezeit mit aufrechten oder nickenden	reichblühend. 30 cm 0.60
Blütenglocken übersät sind VI-VIII abietina. Mit lanzettlichen Blättchen und großen,	Art mit großen, porzellanblauen Glocken. 10 cm. 0.70
dunkelblauen Blüten. 20 cm 0.40	- rhomboidalis. Leuchtend blaue Glocken. 30 cm 0.40
Allionii. Seltene hochalpine Art aus den Westalpen	— alba. Siehe Neuheiten
mit großen, blauen Glocken. 20 cm 1.— carpathica. Runde Büsche bild., reichblüh., lila. 30 cm 0.40	rotundifolia olympica. Hellblaue Spielart, die fast den
- alba grdfl. Blendendweiße Blütenglocken. 30 cm 0.40	ganzen Sommer über ununterbrochen blüht. 30 cm 0.40 — superba. Dunkle, großblumige Form unserer wilden
Chewton Joy. Siehe Neuheiten 0.80	Wegrand-Glockenblume. 30 cm 0.40
- Elegant. Siehe Neuheiten	- saxifraga. Große, dunkelviolette, enzianartige Blumen
sonders dunkler Farbe. 20 cm 0.50	auf gedrungenem Laubbusch. 10 cm 0.60 — Scheuchzeri. Ähnlich C. caespitosa, mit unterirdischen
- Liliput. Siehe Neuheiten	Ausläufern. Blumen mittelgroß, blauviolett. 20 cm 0.40
- Little Gem. Großblumig weiß. 15 cm 0.50	— — alba. Mit weißen Blütenrispen. 30 cm 0.50
maxima. Siehe Neuheiten	- Stansfieldii. Reizende niedr. Hybride, die mit ihr. Flor
— alba. Weißblühend. 15 cm	später als die and. kleinblum. Sorten beginnt. 10 cm 0.60 — Tommasiana. Kleine Blättchen u. blaue Blüten. 15 cm 0.70
- Moonlight. Siehe Neuheiten	— Waldsteiniana. Zierl., kleine Art, mit grauschimmern-
— Queen of Somerville. Siehe Neuheiten 0.80 — Riverslea. Kräftigwachsend, mit großen violetten	dem Laub und kleinen, lila Glöckchen. 10 cm 0.70
Blumen. 20 cm 0.50	- Wockeana. Reizend. Bastard zwisch. Waldsteiniana und Tommasiana; blaue Sternblüten. 10 cm 0.80
Giant. Siehe Neuheiten	Cardamine, Teppichschaumkraut, Cruciferae ○-① ≅ △
turbinata echt. Reizende Art mit aufrechten,	- asarifolia. Gute Bodendeckungspflanze für feuchte
dunkelvioletten, flachen Glocken. 15 cm 0.50 White Star. Starkwachsende Spielart mit großen	Lagen. Blüten weiß. 20 cm V-VI 0.40
flachtellerförmigen weißen Blüten. 20 cm 0.50	Carex. Siehe Ziergräser.
- Wilsonii. Zur Zeit der Blüte verschwindet die grau-	Carlina, Wetterdistel, Compositae O O A II
grüne Belaubung fast ganz unter der Fülle der großen dunkelvioletten Glocken. 10 cm 0.50	— acaulis. Auf der Blattrosette sitzende große silber- weiße Blüten. 5 cm VI-VIII 0.50
Collina. Mittelgroße, dunkelviolette Glocken, 15 cm. 0.50	- var. caulescens. Die großen Blumen sitzen auf
elatines. Kleine, kriech., hellblaue Felsensorte, 5 cm 0.40	30 cm hohen Stengeln VI-VIII 0.50
ienestrellata. Grüne Blattrosett., blaue Sternblüt. 10 cm 0.60	— acanthifolia. Gelbliche Blütenköpfe, großblumiger als
Garganica. Niedr. Art mit kriechenden, reichverzweigt. Blütenranken und sternförm., hellila Blumen. 6 cm 0.40	die vorige. 15 cm VI-VII 0.60 — cynarea. Mehr weiße, noch größ. Blüt. 25 cm VI-VII 1.—
erinus major. Große violettblaue Sternblüt. 10 cm 0.60	Centaurea, Zwergkornblume, Compositae ○ △
Mrs. H. H. Payne. Siehe Neuheiten 0.70	- bella. Mit zerteiltem silbergrauem Laub und rosa
- villosa. Zottig hehaarte Abart. 6 cm 0.50 - alba. Weißblüh. behaarte Form. 6 cm. Selten . 0.70	Blüten. Selten. 20 cm VI-VII 0.60
died. Weinstein, bendarte Form, o cm. Setten . 0.70	- Kerneriana, Rothlühende Zwergsorte, 30 cm. Selten 0.80

vorstehendem Griffel und Staubfäden III-IV

0.80

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Coreopsis, Zwergmädchenauge, Compositae O A 18
Centaurea (Fortsetzung)	— rosea nana. Margueritenähnliche Staude mit rosa Blüten, für kalkhaltigen, nicht zu feuchten Boden.
- Koeningi. Silberige eingekerbte Blätter, rosarote	20 cm VII-VIII 0.40
Blüten. 20 cm VI-VII 0.80 Cerastium, Hornkraut, Caryophyllaceae 0 00 \triangle \triangle	Cornus, Teppichhartriegel, Cornaceae ○ - ① △ △ — canadensis. Blätter quirlig, große, weiße Blüten und
Niedere, kriechende Gewächse mit gegenständigen,	rote Beeren. Verlangt Moorboden. 10 cm 2.—
kleinen lanzettlichen Blättchen, meist silberweiß	Coronilla, Kronenwicke, Leguminosae O A
oder graugrün. 10–20 cm V-VI — alpinum villosum. Starkwollig behaarte, silberweiße	— vaginalis. Wickenartige Pflanze mit Dolden kleiner gelber Sehmetterlingsblüten. 20 cm. VI-VII 0.50
Blättchen, große weiße Blüten 0.40	Cortusa, Heilglöckchen. Primulaceae 🕦 🛆 🛆
- arvense compactum. Reinweißer, geschlossener Blü- tenteppich. Wächst geordneter als alle übrigen 0.30	— Matthiolii. Primelartige Pflanze mit karminroten Glöck- chen. 15 cm V-VI 0.60
- Biebersteinii. Herrlich für Böschungs- u. Mauerplätze,	- pubescens. Besonders stark und weich behaart.
silbergraue Belaubung, weiße Blütenmassen. 20 cm 0.30 — tomentosum. Silberweiße Belaub. Niedl. Art. 15 cm 0.40	$15~\mathrm{cm}$ V-VI 0.60 Corydalis, Lerchensporn, Papaveraceae $\bigcirc - \bigcirc \triangle$
— — candidissimum. Schneeigfilzig, große, weiße Blu-	Bilden dichte Büsche mit farnartiger Belaubung
men. 10 cm	und lockeren Blütenrispen. Gehören zu den besten Dauerblühern. 20 cm V-X
wuchernd. 15 cm	— cheilanthifolia. Farnwedelähnliche Blätter, mit gelben
— — lanatum. Silberweißwollige Belaubung. 10 cm 0.40	Blüten. 25 cm
Ceratostigma, Bleiwurz, Plumbaginaceae ○-① △ △ — plumbaginoides. Glänz. frischgrüne Belaub., enzian-	blühern des Steingärtchens, goldgelbblühend. 20 cm 0.4
blaue Sternblum. i. groß. Masse. 20 cm. VII-IX 0.50	- gracilis. Besonders feinblättrig und feinblütig.
Chaenorrhinum. Siehe Linaria.	20 cm. Selten
Cherleria. Siehe Minuartia. Chiastophyllum, Goldtröpfchen, Crassulaceae ○-••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Lerchensporn gleichend, nur mit gelblichweißen
— oppositifolium (Cotyledon simplicitolia). Fleischige,	Blüten. 20 cm
sedumartige Blätter und gelbe Blüten in zierlich überhäng. Rispen. Sehr schön. 20 cm. VI-VII 0.50	- reptans. Zierlich gesiederte Blättchen, schöne Rasen
Chrysanthemum, Alpenwucherblume, Compositae	bildend. Weiße Blütchen VI-VII 0.3 — squalida. Hübsche moosartige Polster bildende Pflanze
— alpinum. Polsterbildende Alpenpflanze mit weißen	mit feingefiederter, braungrüner Belaubung 0.3
Margueritenblumen. 15 cm VI-VII 0.70	Cotyledon, Nabelkraut, Crassulaceae ○ — ① △ — chrysantha. Graugrüne, hauswurzähnl. Blattrosetten
arcticum. Frischgrüne dickfleischige Blätter, sehr	mit grünlichgelben Sternblumen. 15 cm. VII-VIII 0.4
schöne, große, weiße Margueritenblumen. Der spä- ten Blüte wegen sollte diese Pflanze in keinem Stein-	 simplicifolia. Siehe Chiastophyllum. sempervivoides. Große grüne Rosett., rosarote Blüt.
garten fehlen. 30 cm IX-XI 0.40	10 cm VII-VIII 0.6
— atratum. Aehnlich Chr. alpinum, jedoch viel leichter gedeihend. Blätter dicklich kahl, dunkelgrün, mit	— spinosa. Eigenartig schöne, hauswurzähnliche Pflanze mit blaugrünen Blättern u. fester, kugeliger Winter-
3-7 Lappenzähnen. Bildet dichte, frischgrüne	rosette. Grünlichweiße Blumen in dichter, ähren-
Polster. Blumen weiß. 20 cm VII-VIII 0.50 — millefoliatum. Starkgesiederte, graugrüne Belaubung,	artiger Rispe. 30 cm VII-VIII 0.5
gelbe Blütenköpfe. 30 cm VI-VIII 0.60	Crepis, Pippau, Compositae ○ △ — aurea. Löwenzahnartige Pflanze mit orangeroten
olivanum. Hübscher Bastard zwischen Chrysanthe- mum arcticum und montanum, dessen große weiße	Blüten. 20 cm
Blum. sehr frühzeit. erscheinen. 30 cm. VI-VII 0.60	Crucianella, Riesenwaldmeister, Rubiaceae O-D A - stylosa. Kriechende Pflanze mit waldmeisterartiger
— Zawadskii. Gezackte Blätter, große rosa Blüten. 20 cm VI-VII 0.50	Belaubung, rosa Blütchen. 25 cm V-VII 0.4
Chrysogonum, Goldkörbchen, Compositae ○ △	— rubra. Siehe Neuheiten
- virginicum. Die gelben Blütenköpfchen vereinigen sich	— lobatus. Niederliegende Pflanze, lilablaue Röhren-
zu kleinen Rispen. 30 cm VI-IX 0.70 Chrysopsis, Goldaster, Compositae 0 ∞ \triangle	blüten, nur für warme Lagen, 10 cm VII-VIII 0.6 — incanus. Mit veilchenblauen Blum. 10 cm VII-VIII 0.7
- villosa Rutteri. Mit gelben Strahlenblüten und grau-	Cyclamen, Alpenveilchen, Primulaceae O-D A
grüner Belaubung. 20 cm VI-VIII 0.50	Knollenbild. Gewächse mit rundl. oder efeuähnl.,
Chrysosplenium, Goldmilz, Saxifragaceae ○-① ≅ ⊕ — rosulare. Saftiggrüne Polster mit gelben Blütendolden,	meist marmoriert. Laubwerk u. veilchenähnl. Blüt. Lieben Waldhumusboden u. geschützte Lag. 10 cm.
geeignet für feuchte Lagen. 10 cm IV-V 0.40	- Atkinsii. Mit silbrigmarmorierter Belaubung und rosa
Circaea, Alpen-Hexenkraut, Onagraceae ○-① △ — alpina. Frischgrüne Belaub. u. zahlreiche kleine weiße	bis roten Blüten III-IV 0.6 — album. Weiße Abart mit rot. Schlund. III-IV 0.8
Blütchen. Boden-Deckpflanze. 30 cm. VI-VIII 0.40	- cilicicum. Rosenrote Blumen IX-X 0.8
Cirsium, Zwergdistel, Compositae ○ ∞ △	— coum. Blätter oberseits einfarbig dunkelgrün, unter- seits rot. Blumen dunkelrot II-III 0.8
— acaule. Stark geschlitztes Laub und rote stengellose Blütenköpfe. 20 cm VII-VIII 0.50	— europaeum. Das bekannte reizende, rot blühende
Clematis alpina. Siehe Schlingpflanzen.	Alpenveilchen des Hochgebirges VIII-IX 0.5 — ibericum. Mit runden, silbrig gezeichneten Blättern
Convallaria, Maiglöckcken, Liliaceae (- • X	und roten Blüten III-IV 0.6
- majalis grdfl. Die Glocken u. Stiele sind doppelt so groß	— neapolitanum (hederaefolium). Efeublättrige Art,
wie bei der gewöhnl. Maiblume. 20 cm V Pflanzkeime % 8M 6.— Ballen 0.40	rote Blüten VIII-IX 0.6 — repandum (vernum). Dünne, herzförmige, etwas ge-
— — flore pleno. Gefülltblühende Form. Selten: 0.70	zackte Blätter. Blumen leuchtend karmin mit weit

— flore pleno. Gefülltblühende Form. Selten : . . 0.70 — rosea. Rosablühende Form. Selten 0.70

Cypripedium, Frauenschuh, Orchidaceae 🕽 🛆 1St.	Dianthus (Fortsetzung)
— calceolus. Prächtige, frauenschuhähnliche, rotbraune RM	
Blüten mit hellgelber, rot punktierter Lippe.	- suavis. Blendendweiße Blumen. 25 cm 0.5
Liebt humosen Boden. 30 cm V-VI 1.50	— subacaulis. Feste Polster, kleine rosa Blüten. 10 cm 0.5
	— vaginatus atrorubens. Glühendrote Knäuelblumen
Delphinium , Zwerg-Rittersporn, Ranunculaceae ○ △	auf festen Stengeln. 30 cm
grandiflorum chinense Tom Thumb. Leuchtend blau,	- viscosus. Klebrige Stengel, weiße geschlitzte Blumen.
sehr reichblühend. 30 cm VI-VIII 0.40	15 cm
nudicaule. Prächtig granatrot. Sehr reichblüh. 30 cm 0.60	- zonatus. Große Rasen bildende Art, weiß. 30 cm 0.4
Dianthus, Felsennelke, Caryophyllaceae ○ △	
	Dianthus plumarius fl. pl. ○: #: 🗴 🗆 Gefülltblüh., wohl-
Niedrige, meist polsterbildende Gewächse mit	riechende Federnelken. Liefern sehr feines Schnitt-
grüner oder blaugrüner Belaubung und prächtigen	material und sind sehr beliebte Einfassungsstauden.
wunderbar duftend. Blüt. Dürfen in keinem Stein-	20-30 cm V-VI
garten fehlen da sehr anspruchslos. V-VII	
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in	— Alpha. Reinweiß, sehr großblumig, ganzrandig . 0.4
20 Sorten	— — Delicata. Seidenartig lila mit heller Cremetönung 0.5
- alpestris. Graugrüne Polster bildend, weißlichrosa,	— — Diamant. Großblumig, weiß
	Erfolg. Die Blumen stehen aufrecht und meist ein-
geschlitzte Blüten. 20 cm	zeln auf kräftigen Stielen, lilarosa 0.5
alpinus. Karminrote Alpennelke, sehr großblum. 10 cm 0.60	— — Excelsa. Großblumig, rosa 0.5
anatholicus. Rosafarbige Blüten. 15 cm 0.40	— Fleur de May. Leucht, rosarotblühend. Sehr früh 0.4
arenarius. Rasenbildend, rosa Blüten. 20 cm 0.50	— Gloriosa. Lilarosa, großblumig 0.5
brevicaulis. Kurzstengelig, weißblütig. 10 cm 0.40	
caesius carminatus. Leuchtend karmin. 20 cm 0.60	— Her Majesty. Reinweiß
- compactus. Dichte Polster bildende Form, mit	— Maischnee. Früh, weiß
großen rosa Blüten. 10 cm	— — Marktkönigin. Silbergraue Belaubung, große
- hybridus Ross of rate Plitt in rate Many 20 - 0.40	weiße Blumen
- hybridus. Rosa od. rote Blüt. in groß. Masse. 20 cm 0.40	— — Mrs. Sinkins. Weiß mit grünlicher Mitte 0.4
- Leuchtfeuer. Mit großen, einfachen, weithin	— — Nobel. Großblumig, weiß, platzt nicht 0.5
leuchtenden, purpurroten Blumen. 30 cm 0.70	— — Purpurkönigin. Ungewöhnlich kräftig hohe Stiele,
- lilacinus, Siehe Neuheiten	purpurrote Blumen
robustus splendens. Siehe Neuheiten 0.80	— Roter Vorbote. Rot, sehr frühblühend 0.4
splendens. Mit leuchtend rosaroten Blüten. 20 cm 0.50	
carthusianorum. Langstielig, Blum. leucht. dunkelrot 0.40	
corsicus. Schöne Teppiche bildend, rosa blühend 0.50	schöner, roter Farbe
deltoides. Mit niederliegenden Zweigen u. blutroten	Rouge de may. Herrlich rosarot blühend und
Blüten. 20 cm 0.40	starkwüchsig
	— — Saxonia. Prächt. purpurrote Blum. auf kräft. Stiel. 0.5
albus. Weißblühende Form der vorigen. 20 cm . 0.40	— — Schöne von Prag. Großblumig, rosa 0.5
- Brillant. Leuchtend karminrote Blumen. 20 cm . 0.40	— Thomsons Frühe. Elfenbeinweiß, sehr frühblühend 0.4
- splendens. Mit leuchtend dunkelkarminrot. Blüt. 0.40	— — scoticus. Einfachblühende Federnelke, feinstes
fragrans. Gefranste weiße Blüten. 20 cm 0.40	
furcatus. Reiz. kleine ganzrandige weiße Blüten. 20 cm 0.50	Farbenspiel 0.3
glacialis Freynii. Herrliches Zwergpolster, vielblütig,	Dicentra (Dielytra) Herzblume, Papaveraceae 🛈 🛆
rot 10 cm	— eximia, Gefiedertes Blattwerk m. rosafarbenen Blüten.
- neglectus. Hübsche Alpenpflanze mit leuchtend	30 cm VI-VIII 0.4
bonning to Division 15	- formosa. Mit rosa Herzblüten. 30 cm hoch. VI-VIII 0.5
karminroten Blumen. 15 cm	
giganteus. Besond. starkwüchs., rosarote Blum. 30 cm 0.40	Dodecatheon, Götterprimel, Primulaceae) \triangle
granificus. Ähnlich "deltoides" mit karminroten Blüten 0 40	- Jeffreyi. Großblum. als nachsteh. 30 cm. V-VI 0.6
inodorus. Runde Polster bildend, rosa Blüten. 20 cm 0.40	— meadia. Breit lanzettliche Belaubung, cyclamenartige
Juniperifolius. Stachelige Polster, lilarot. 20 cm 0.50	Blumen auf kräft. Kandelaberdolden. Nach dem
Knappii. Gelbe Blütenköpfe. 30 cm 0.60	Verblühen zieht die Pflanze ein. 30 cm. V-VI 0.6
Lerechii. Kleine, rosarote Blüten. 5 cm 0.60	
macrodemus. Starkwüchsige Art. Blüten weiß. 20 cm 0.40	Douglasia (Aretia) Goldprimel, Primulacea O-D A
microlepis. Niedrige Art mit roten Blüten. 10 cm . 0.50	Sie gehören zu unseren schönsten, nicht schwierig
Musalae. Dichtrasig, aufsitzende rote Blüten. 10 cm. 0.50	zu haltenden Hochalpinen. 5 cm IV-V
nardiformis Nadalfarmia silhanarana Blättahan lila	- cinerea. Aschgraue Zwergpölsterchen, gelbblühend . 0.7
nardiformis. Nadelförmig silbergraue Blättchen, lila-	— praetusiana. Silberblättrig, goldgelb 0.7
rosa Blüten. 20 cm. Selten 0.80	- Vitaliana. Dunkelgrüne Polster, goldgelb 0.6
nitidus. Flache Polster, dunkelrosa. 10 cm 0.60	
noeanus. Bläulichgrüne Belaubung, weiße geschlitzte	Draba, Hungerblümchen, Cruciferae ○ △ Niedrige
Blumen. 10 cm 0.60	grüne oder graugrüne Rasen bis kleine Rosetten
pelviformis. Kleine leuchtend rote Blütchen. 30 cm . 0.40	bildende Gewächse mit doldenartigen Blütenträub-
petraeus. Blaugrüne Polster bildend, tiefgeschlitzte,	chen im zeitigen Frühling. 5-10 cm III-IV
zartrosa Blüten. 15 cm	- aizoides. Kleine Rosett., lineale Blättch. Blüt. goldgelb 0.5
pruinosus. Wohlriechend, rasenbildend, weiß. 25 cm 0.40	- aizoon. Spitzblättrige Rosett., sehr früh, goldgelb blüh. 0.5
pungens.BlaugrünePolst., weiße geschlitzteBlum. 25cm 0.50	— argaea. Weichhaariges Pölsterchen, gelbblühend 0.4
Tunicola Schäng and High Polyton accellil 15 - 040	
rupicola. Schöne, rundliche Polster, rosablüh. 15 cm 0.40	— ciliata. Kleine Rosettenpolster, weißblühend 0.4
sanguineus. Blutrote Blüten. 30 cm	- diversifolia. Lockerrasige Kugelrosetten, gelb 0.4
silvestris. Schöne Steinnelke, rot. 25 cm 0.60	- Dedeana. Kleine Polster, weiß
frigidus. Zierliche Art mit rosa Blüten. 10 cm 0.50	— olympica (bruneifolia). Groß. grüne Polst., gelbe Blüt. 0.4
Spiculifolius. Kräftige Polster mit feinzerteilten weißen	- repens. Kriechende Art, gelbe Blüten 0.4
Blüten. 25 cm 0.50	— rigida (dicranoides). Schöne Zwergpolster, goldgelbe
spinosus. Spitzstachel. Blättch., rote Knäuelblüt. 20 cm 0.50	Blütchen
Sternbergii. Seegrüne Belaubung. Blumen federig,	- Salomonii. Zwergige Polster, Blüten weiß 0.4
rosarot. 20 cm 0.50	Scabra Spitzblättning Polatorahor - iftliih - 1
strictus (integer). Blaugrüne Polster mit reizenden,	scabra. Spitzblättrige Polsterchen, weißblühend . 0.5
gangrandigan waif an Divid	- streptocarpa. Breite Blättchen, dunkelgelbe Blüten 0.4
ganzrandigen weißen Blütchen. 15 cm 0.50	- Sündermannii. Schöne grüne Polster, weißblühend 0.4

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Erigeron (Fortsetzung) 1 St.
Dracocephalum, Drachenkopf, Labiatae ○ △	— grandiflorus. Siehe Aster Andersonii. RM
— botryoides. Aschgraue Blätter, Blüten rosa. 20 cm 0.60	- leiomerus. Man glaubt eine ganz niedliche, kleine
- nutans alpinum. Niedrige Büsche, Blum. tiefblau. 20 cm 0.60	Alpenaster zu sehen. Die Blütchen sind zartblau.
- Ruyschianum. Schmallanzettl. Blätter, blaue Blüten in	20 cm VI-VII 0.50
groß. Fülle, gut. Dauerblüher. 30 cm. VI-VIII 0.40	- salsuginosus. Ahnl. E. glabellus, jedoch mit kleineren
Dryas, Silberwurz, Rosaceae ○ △ Halbholzige Pflanze	Blüten und Blattwerk. 20 cm VI-VIII 0.50
mit kleinen, gekerbten Blättchen und anemone-	- trifidus. Die graugrünen Blättchen sind fein zerschlitzt,
artigen Blumen. Uberzieht ganze Felsen. Liebt	die Blütchen blau mit gelber Mittelscheibe. Eine reizende Alpenpflanze. 10 cm V-VI 0.70
feucht humosen Boden. Unbedingt eine der schön-	Erinus, Leberbalsam, Scrophulariaceae O-DA
sten Alpenpflanzen. 10-15 cm V-VIII	Überaus anspruchsloses und zierliches Pflänzchen
Drummondii, Weißwollige Blattunterseite, Blüt. gelb 1.—	mit dunkelgrünen Blättchen und 10-15 cm hohen
— grandiflora. Großblumig, gelb	Lippenblütenrispen V-VII
federige Samenstände im Herbst 0.60	— alpinus. Dichte Polster von roten Sternblüten 0.40
— robusta. In Belaubung u. Blüten bedeutend größer	— albus. Weißblühend
als vorige. 20 cm	- Dr. Hannie, Leuchtend karminrot, großblumig . 0.50
— — lanata. Silbrigbehaarte, besonders reichblühende	— — Olivanus, Leuchtend karminviolett 0.60
Abart der vorigen mit weißen Blüten 0.80	Errogonum, Wollknoterich, Polygonaceae $\bigcirc \bigcirc \land$
minor. Dichtlaubige und sehr zierliche Zwerg-	- James II. Halbstrauchige Felsenpflanze mit unterseits
form. Sehr selten	silbrigen Blättern und 10 cm hohen goldgelben
— vestita. Filzig behaarte Zwergsorte, weißblühend 1.—	Blütendolden VIII-IX 1.20
— Sündermannii. Großblumig, weiß, halbgefüllt 0.60	- racemosum, Silbergraublättrige, aufrechtwachsende
tenella. Sehr seltene Zwergform, weißblühend 1.20	Art mit rosa Blüten. 20 cm VII-IX 1.20 — umbellatum. Der vorigen ähnlich, jedoch mit gelblich-
Edraianthus, Büschelglocke, Campanulaceae O A	weißen Blütendolden VII-IX 1.20
Glockenblumenartige Pflanzen von niedrig. Wuchs und großem Blütenreichtum. 10-15 cm V-VII	Eriophorum. Siehe Ziergräser.
— dalmaticus. Dunkelpurpurne Blüten 0.60	Eriophyllum, Wüstengoldaster, Compositae 000 A
— dinaricus. Silbergraue Polster, mit dunkellila Blüten 0.60	- caespitosum. Silbergraue Belaubung und goldgelbe
graminifolius. Fingerlange grasartige Blätter und	Coreopsis ähnliche Blüten während des ganzen
leuchtend blaue Blüten 0.60	Sommers. 20 cm VI-VIII 0 50
- intermedius. Dichte, silberblättrige Zwergpolster,	— lanatum. Siehe Bahia.
Blumen leuchtend blau. 5 cm 0.60	Erodium, Reiherschnabel, Geraniaceae O-DA
- pumilio. Noch niedriger wie die vorhergehende 0.60	Fast den ganzen Sommer blühende Staude mit zer- schlitzter Belaubung u. geraniumähnlichen Blüten.
- serpyllifolius. Dichte, dunkelgrüne Rasen mit tiefblau-	Sehr anspruchslos. 20–30 cm V-VIII
violetten Blüten 0.60	— absinthioides (Sibthorpianum). Schöne Polst., rotblüh. 1.—
— tenuifolius. Steifgewimperte Blätter u. leuchtend blaue Blüten auf langen Stielen 0.60	— amanum. Graugrüne Blätter, rosafarbene Blumen 0.60
Epilobium, Weidenröschen, Oenotheraceae O- 1 A 1	— chamaedryoides, Zierl, Art m. leuchtend rosa Blitten 0.60
- Hectori. Mit bräunlichen kleinen Blättchen und weißen	- chellantifolium. Weiß mit schöner dunkler Zeichnung 0 80
Blütchen. 5 cm VII-VIII 0.40	- Chrysaninum. Schwefelgelb. Blüt.m. rostrot. Staubbeut. 0.80
- Fleischeri. Schmallanzettliche Blättchen, rosarote	- macradenum. Kleinbleibende Art mit dunkel gezeich-
Rispen. 20 cm VII-IX 0.60	neten lilarosa Blumen
Epimedium, Sockelblume, Berberidaceae 🕦 🛆	— seseliflorum. Schöne aparte Blüten
Bildet dichte Büsche mit äußerst haltbaren, fast	Eryngium, Edeldistel, Umbelliferae O OO A &
immergrüner, gesiederter Belaubung und zierlichen	- Bourgatii. Stark zerteilte, weiß geaderte ornamentale
Blütenrispen, die vielfach an tropische Orchideen erinn. Liebt feucht humos. Bod. 20 cm IV-VI	Blätter, blaue Blütenstände. 40 cm . VII-IX 0.60
— alpinum. Violettrote Blumen, Blätter schön bronzerot 0.50	- maritimum. Silberweiße, stachelig gezähnte, ornament.
- bicolor. Zweifarbig rot und gelb 0.50	Blätter u. Blütenstände. Echte Stranddistel. 40 cm 0.60
- diphyllum. Länglich herzförmige Belaubung und bläu-	- Siehe auch mittelhohe Stauden.
lichweiße Blüten 0.60	Erysimum, Scheindotter, Cruciferae O 🛆
hexandrum (Vancouveria). Sehr starkwüchsig, zier-	- Kotschyanum. Sehr schöne, goldgelbe Zwergsorte.
lich belaubt und weiße Blüten 0.50	Silbergraue Blättchen. 5 cm V-VI 1.—
— lilacinum. Lilablühend	- ochroleucum (helveticum). Kräftige Büsche bildend,
macranthum. Mit schön geformten groß. weiß. Blüt. 0.80	gelbblühend. 30 cm V-VI 0.60
- niveum. Weiß, frühblühend, niedrigste Art 0.50	— pumilum. Hübsches Felsenpflänzchen mit goldgelben Blüten. 20 cm V-VI 0.60
— violaceum. Lilablühend 0.50 — Musschianum. Niedrig, weißlichrosa 0.50	- rupestre aurantiacum. Prächtige, orangefarbene
- pinnatum elegans. Lebhaft gelbblühend. Prachtvolle	Blüten. 20 cm V-VI 0.50
großblumige seltene Art 0.70	Euphorbia, Wolfsmilch, Euphorbiacea O O A
- rubrum. Rot mit weißer Mitte 0.50	— capitulata. Kriechende, kissenbildende Alpine, Blüten
— — coccineum. Mit roten Blüten	goldgelb. 5 cm V-VI 0.60
_ sulphureum. Schwefelgelb blühend 0.50	- cyparissias. Nadelartige Belaub., Blüten gelb. 30 cm 0.40
Eranthis, Winterling, Ranunculaceae O- A	— epithymoides (polychroma). Siehe mittelh. Stauden.
- hiemalis. Reizender Vorfrühlingsblüher mit gelben	myrsinites. Niederlieg., silbergraue dickliche Blätter u.
Schalenblüten. 5 cm II-III 0.40	gelbe Blütendold., auffall. schön. 20 cm V-VI 0.60
Erica. Siehe Heidekräuter.	— rigida. Im Habitus E. myrsinites ähnlich, jedoch auf- rechtwachsend u. höher werdend. Blume goldgelb,
Erigeron, Berufskraut, Compositae ○ △ — aurantiacus. Mit orangekupferfarbigenStrahlenblüten.	Belaubung immergrün, graublau. 30 cm V-VI 1.50
30 cm · · · · · · · · · · · · · VI-VII 0.40	Evonymus radicans. Siehe Zwerggehölze.
— glabellus alpinus. Mit intensiv blauen Blüten.	Festuca. Siehe unter Ziergräser.
30 cm V-VI 0.40	Frankenia laevis. Siehe Neuheiten

Frankenia (Fortsetzung)	Geranium cinereum subcaulescens (Fortsetzung) 1St.
- thymifolia. Siehe Neuheiten 0.80	splendens. Zeichnet sich durch besonders
Gaillardia, Kokardenblume, Compositae O ∞ \wedge	auffallende Färbung aus. Die Blumen sind leuchtend reinkarminrot
hybr. nana Colibri. Kugelförmige, dichte, kleine Büsch- chen, Blüten rot mit gelb. 30 cm. Sommer VII-IX 1.—	- Endressii. Niedrig bleibende rosablühende Art 0.40
Galax, Bronzeblatt, Diapensiaceae ● △	- grandiflorum. Tiefviolettblau, sehr großblumig und
aphylla. Liebt frischhumosen Boden. Lederartige, herz-	reichblühend
förmige, immergrüne Belaubung mit prächtigen rosaweißen Blütenähren. 25 cm V-VI 3.—	- hybr. Russel Prichard. Siehe Neuheiton 0.80
Galium, Labkraut, Rubiaceae → • • △	- ibericum platypetalum. Von leuchtend blauvioletter
- cinereum. Silbergraue Blättchen und gelblichweiße	Farbe. Eine der schönsten 0.50 — macrorrhizum. Großblumig, blutrot 0.40
Blüten. 10 cm VI-VIII 0.60 helveticum. Schöne kleine Polster bildend, gelb-	- pratense album. Weißblüh. Wiesenstorchschnabel.
blühend. 10 cm VI-VIII 0.70	Bis 40 cm hoch werdend 0.50 - sanguineum. Dunkelgrünes Laub, Blumen leuchtend
Incanum. Schöne graugrüne Polst. 10 cm VI-VIII 0.70	dunkelkarmin
ochroleucum. Waldmeisterartige Belaubung, zahlreiche Rispen hellgelber Blütch. 20 cm VI-VIII 0.50	— — album. Weißblühend
Genista. Siehe unter Felsensträuchern.	— lancastriense. Kriechende Art mit rosa Blüten . 0.50 — sylvaticum. Lilarote Blüten
Gentiana, Enzian, Gentianaceae O- A Herrliche,	— albiflorum. Kräft. Büsche bildend. Weiße Blumen 0.50
reichblühende Pflanzen von verschiedenartigem Charakter, die in keinem Garten fehlen sollten.	Geum, Nelkenwurz, Rosaceae $\bigcirc \triangle \cong$
Sie lieben alle feuchten, lehmigen oder moorigen	— hybr. Gladys Perry. Siehe Neuheiten 1.20 — montanum. Immergrüne Belaubung. Leuchtend gelb,
Boden. 10-30 cm. Frühling-Spätsommer. Siehe	großblumig. 30 cm V-VI 0.40
auch halbhohe Stauden. acaulis. Mit großen, glockenförmig., tiefdunkelblauen,	— — aurantiacum. Hübsch, goldorange, Hybride von
aufrechtstehenden Blüten. 15 cm V-VI 0.70	Geum Heldreichi. 30 cm V-VI 0.40
- angustifolia. Schmaleliptische Blätter und große	Rossii. Feingefiederte Belaubung, leuchtend gelbe Blüten. 20 cm V-VI 0.50
hellblaue Blumen. 10 cm V-VI 1.— Clusii. Ähnlich G. acaulis jedoch mit bedeutend kräf-	— triflorum. Interessante rosenrote Blüten mit zierenden
tigerer Belaubung und riesiggroßen, aufrechten,	Samenträgern. 20 cm. Selten V-VI 0.50
leuchtend blauen Blüten. Sehr gut gedeihend und	Siehe auch mittelhohe Stauden und Neuheiten. Glechoma, Gundelrebe, Labiatae • • • • • • •
außerordentlich reichblühend. 10 cm. V-VI 1.— Cruciata. Vielblütig, blau. 20 cm VII-VIII 0.50	- hederaceum fol. var. Eine weißbunte Form der be-
dahurica. Großblumig, dunkelblau, lanzettliche Be-	kannten, heimischen Gundelrebe. Sie ist sehr wert-
laubung. 30 cm VIII-IX 0.80	voll, besonders dadurch, daß sie tiefen Schatten verträgt. Herznierenförmige Blätter u. hellviolette
decumbens. Hellbl. Büschelblüten. 30 cm VII-VIII 0.70 depressa. Niederliegend, hellblau. 20 cm VII-VIII 0.70	Blüten. 10 cm IV-VI 0.40
Farreri. Nadelförmige Blätter, hellblaue, hellgelb ge-	Globularia, Kugelblümchen, Globulariaceae O-D
streifte Blüten. 20 cm VIII-X 1.50	Dunkelgrüne, polsterbildende Stauden mit immer- grünen Blättchen und 10–20 cm hohen Kugelblüm-
Fetisowii. Hell- bis dunkelblau. 30 cm. VIII-X 0.50 Freyniana. Ähnlich septemfida, glänzend dunkelgrüne	chen. Lieben frischen Boden V-VI
Blätt., himmelblaue Knäuelblüt. 20 cm VII-IX 0.70	— angustifolia. Lanzettliche Blätt., dunkelblaue Blumen 0.50
Resselringii.Kräft.belaubt,weißblüh.30cm VIII-IX 050	— cordifolia. Schöne Alpine mit hellblauen Köpfchen 0.50 — alba. Blüten weiß
phlogifolia. Großbl., blaue Büschel. 30 cm VII-IX 0.70 pneumonanthe. Lineales Laub, kornblumenblaue,	— rosea. Mit rosa Blüten. Selten 0.80
langtrichterige Blumen. 20 cm VIII-IX 0.80	— incanescens. Sehr reichblumig, leuchtend blau 0.50
pterocalyx. Ahnlich Gentiana cruciata, jedoch mit	— nana. Zwergige Art, welche Felsen dicht überspinnt. Kleine, blaue Blütenköpfchen 0.60
schmälerem Laubwerk u. aufrechten Blütenstengeln, die dicht besetzt sind mit leuchtend reinkornblumen-	- trichosantha. Frischgrüne, spatelförmige Blätter, blaue
blauen Blüten. 30 cm. Selten VII-IX 1.—	Kugelblüten
semptemfida. Blaue Blumen mit hellerem Schlund	 vulgaris (nudicaulis). Großblättr., hellbl. Blütenköpfe 0.50 Willkommii. Rosetten bildend, große blaue Blüten 0 50
in starkem Knäuel. 15 cm VII-IX 0.60 lagodechiana. Auf 20 cm hohen Stielen stehen die	Gratiola, Gnadenkraut, Scrophulariaceae ○ ≅
hellblauen Knäuelblumen, die während des ganzen	- officinalis. Gegenständige, lanzettliche Blätter und
Sommers erscheinen. Eine der allerbest. u. schönst. 0.70	weiße Blüten. 20 cm VI-VIII 0.60 Gypsophila,
— cordifolia. Kräftigerer Wuchs als vorige. 15 cm 0.70 sino ornata. Ähnlich Farreri mit etwas gröberer Belau-	Schleierkraut, Caryophyllaceae 🔾 🗠 🗘 🕮 📙
bung, leucht. blaugrün gestreift. 20 cm. VII-IX 1.50	Die niedrigen Schleierkrautarten sind herrliche
Inianshanica. Vielgestaltige Art, bald hell-bald	Steingartenstauden mit kleinen, lanzettl. Blättern u. schleierartig. Blütenständen. 10-30 cm. V-VII
dunkelblau. 30 cm VII-IX 0.70 tibetica. Starkwüchsig, weiße Büschelblüten, groß-	Siehe auch mittelhohe Stauden.
blumig. 30 cm VII-IX 0.50 I	- aretioides. Zwergschleierkraut, ähnl. einer Androsace
Walujewi. Großblum., weißlichblau. 40cm. VII-IX 0.50	helvetica, m. weiß. Blüt. Bildet steinh. Polster. 5 cm 1.20 — Bungeana. Überspinnt ganze Felsen, weißblüh. 10 cm 0.60
Geranium, Storchschnabel, Geraniaceae O-O A	- cerastoides. Mit behaarten Blättchen und großen
Nicht allein durch ihre Blüten, sondern auch durch ihr schönes Herbstlaub sich auszeichnende Staude	weißen Blüten mit violetten Adern. 15 cm 0.50
mit grundständigen, fünflappigen Blättern und	- curvifolia. Starre verzweigte Polster, weißblüh. 10 cm 1.— - hybr. fl. pl. Rosenschleier. Siehe Neuheiten 0.70
flachen Blumen. 20-30 cm VII-VIII	— Ilbanofica. Mit zartrosa Blütchen. 15 cm 0.40
argenteum. Silberweißes Laub, rosablühend 0.60	- repens. Kriechend, weißblühend. 10 cm 0.40
armenum (psilostemon). Großblumig, karminrot . 0.60 cinereum. Graugrünes Laub, rosa 0.70	monstrosa. Starkverzweigte Stiele reinweiß. Blüt.
subcaulescens. Leucht. purpurne. Blüt., sehr schön 0.60	Prächtige Pflanze für größere Felspartien. 30 cm 0.40 — Purpusi. Breitblättrig, kriechend, weißblüb, 10 cm 0.40

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Heloniopsis, Sugerokia, Liliceae → △ 1St.
Gypsophila repens (Fortsetzung)	- breviscapa. Japanische Art mit Rosetten frischgrüner RM
— rosea. Reizende zartrosa Blütenrispen. 10 cm 0.40	lanzettlicher Blätter, aus denen sich Blütenstiele
- reptans (prostrata) rosea. Ähnlich voriger, jedoch	mit rosa Glocken erheben. 15 cm IV-V 1.— — japonica. Wintergrüne Rosetten mit großen, finger-
schmäleres Laubwerk. Auch im Wuchs ist sie lockerer. Blüten rosa. 15 cm 0.40	breiten, lanzettlichen Blättern. Rosa Blütenrispen.
— Sündermannii. Kräftig wachs., mit weiß. Blütenrisp. 0.40	20 cm IV-V 1.—
- transylvanica. Mit weißen Blüten. 10 cm 0.50	Hepatica, Leberblümchen, Ranunculaceae
Haberlea, Gesneriaceae	Blätter u. anemoneartige Blüten im zeitig. Frühjahr.
kleinen, hellila Lippenblüten. Verlangt feuchten	Sie verlangen frischen humosen Boden. 10-15 cm.
Standort, mögl. an absonnig. Fels. 10 cm VI-VII 1.50	— angulosa. Fünflappige Blätt. u. große hellblaue Blüt. 0.60
rhodopensis. Ähnlich der vorhergehenden, mit etwas größeren Blüten. 10 cm V-VII 1.20	alba. Großblumig, weiß, einfach 0.70 rosea. Großblumig, rosa, einfach 1
Hacquetia, Schaftdolde, Umbelliferae → → △ ≅	— Iriloba. Dreilappige Blätter u. leuchtend blaue Blitten 0.40
- epipactis. Reizende Pflanze für humosen Boden mit	— — piena. Blau, gefüllt
gelappten Blättern und gelben Blütendolden in	— alba. Weiß, einfach
grüner Hülle. 10 cm IV-V 0.60 Hedraeanthus. Siehe Edraianthus.	Tubia (losed). Rosarot, eintach
Helianthemum, Sonnenröschen, Cistaceae ○ ∞ △ : :	— — piena. Rotblühend. Stark gefüllt 0.80
Niedrige, holzige Gewächse mit lanzettlichen Blätt-	Herniaria, Tausendkorn, Caryophyllaceae O A Decaucasica. Groblaub., frischgr. Rasen bild. V-VI 0.40
chen und kleinen, wildrosenartigen Blüten in großen Massen. Sie gehören zu den besten Steingarten-	— glabra. Frischgrüne, kleine rundliche Belaubung.
pflanzen. 10-20 cm VI-VIII	weiße Bluten V-VI 040
— alpestre serpyllifolium a Bildet dichte Teppiche.	— gracilis. Mit zierl. Belaub. u. weiß. Blütch. V-VI 0.40
Blüten goldgelb. 5 cm	Heuchera, Purpurglöckchen, Saxifragaceae O- \(\Delta \) \(\text{arizonica. Frischgrüne, gezackte Blätter, Blütchen weiß.} \)
rosa Blüten 0.40	25 cm. Selten! VI-VII 0.70
carmineum (rhod. carmin). Silbergraue Belaub.,	- rubescens. Zierliche alpine Art mit weißen Blitten-
Blüten leuchtend rosenrot	glöckchen u. rötl. Blütenstengeln. 25 cm V-VII 0.70 Hieracium, Habichtskraut, Compositae 0 0 \(\triangle \)
- hyssopifolium. Scharlachzinnoberrot, einfach 0.40	- aurantiacum. Tietorange Blitten 30 cm VII IV 040
hybr. album oculatum. Einfach, weiß mit gelb. Auge 0.40	- Dombycinum. Weißwollig behaart und gelbblühend.
— — pl. Weiß, gefülltblühend 0.40 — — Attraction. Hellorange mit dunkler Mitte 0.40	- dentatum (marmoratum). Kräftig wachsend, weiß-
— aurantiacum plenum. Orangefarben, gefüllt 0.40	filzig, gelbe Bluten. 40 cm. VI.VII 040
- Ben Dearg. Großblumig, karminrot 0.50	- Intypaceum. Graugrüne, stark behaarte Belaubung
- Ben Lui. Großblumig, dunkelkarmin 0.50 - Ben More. Siehe Neuheiten 0.80	und goldgelbe Blüten. 20 cm VI-VII 0.40 — lanatum. Weißwollig behaart mit gelben Blüten.
— Ben Nevis. Siehe Neuheiten 0.80	30 cm VI_VII 0 40
— Ben Venue. Siehe Neuheiten 0.80	- racemosum (crinitum). Goldgelbe Blüten, 10 cm., 0.30
— Blutströpfchen. Siehe Neuheiten 0.50 — Bronce. Bronzefarben, einfachblühend 0.40	 rubrum. Leuchtend orangerot. 20 cm VI-VIII 0.40 villosum. Zottig behaarte Blätter, gelbe Blüten.
— — coccineum pl. Dunkelrot, gefüllt 0.40	30 cm VI-VIII 0.40
Die Braut. Sehr großblumig, weiß 0.40	nomogyne, Alpenlattich, Compositae () —
— Fire flame. Leuchtend karminrötlich mit orange, nach der Mitte zu in gelb übergehend, großblumig 0.50	- alpina. Immergrüne, lederartige Belaubung und trübrote Blütenköpfchen. 10 cm VII-VIII 0.60
— — Gelbe Perle. Gelb gefüllt blühend 0.40	norminum, Drachenmaul, Labiatae O - 1 A
- Golden Queen, Großblumig, einfach, goldgelb . 0.40	- pyrenaicum. Mattgrüne, große Blattrosetten, aus
— Goldlachs. Siehe Neuheiten	denen sich die mit blaulila Lippenblüten besetzten Stiele erheben. 15–20 cm V-VI 0.40
- Rosa Königin. Großblumig, einfach, rosa 0.40	- rubrum. Rötlich blühende Abart, mit etwas größeren
- Sunbeam. Einfach großblumig, leuchtend gelb . 0.40	Blumen. 15-20 cm V-VI 0.50
— Watergate Orange. Siehe Neuheiten 0.60 unulatum. Kleine aufrechte Büsche mit silbergrauer	Houstonia, Tausendsternchen, Rubiaceae () - ()
Belaubung und gelben Blüten 0.50	- superba. Leucht. dunkelbl. Blüt. 10 cm. V-VI 0.50
oelandicum & Einfach gelb, niedrigstes von allen, 5 cm 0.50	- serpyllitolia. Mit kleinen runden Blättchen und einer
Helichrysum, Strohblume, Compositae ○ ∞ △ — bellidioides. Kriechende Strohblume mit klein. weißen	Fülle klein., lichtblauer Blümch. 10 cm. V-VI Hutchinsia, Gemskresse, Cruciferae O - 1 \(\triangle \)
Blüten, 10 cm VII-VIII 0.50	alpina. Krause, zierliche Pflanze, die zahlreiche Dolden
Heliosperma. Siehe Silene.	kleiner weißer Blütchen bringt. 10 cm. V-VI 040
Helleborus, Christrose, Ranunculaceae → → ¾ □ — foetidus. Laub lederartig dunkelgrün, d. größt. Kälte-	- Auerswaldii. Zierlicher als die vorhergehende, groß- blumig weiß. 5 cm V-VI 0.40
graden trotzend. Blüt. grünlich gelb. 30cm II-III 0.60	nypericum, Hartheu, Guttiterae O-O A Kleine rund-
- Hybriden. Vereinigen die schönsten Farbentöne in	liche Busche mit meist nadelartigem Laubwerk und
sich: rot, rosa, weiß, punktiert, geadert usw., groß- blütig. 30 cm II-III 0.80	wildrosenartigen, gelben Blüten während des ganzen Sommers VI-VIII
- hybr. praecox. Siehe Neuheiten 1.20	- calycinum. Großblumig, goldgelb, ähnlich einer Wild-
- niger. Christ- oder Weihnachtsrose, deren blendend	rose, immergrünes, breites, lederartiges Laub 30 cm 0 60
weiße Blüten bei mildem Wetter zu Weihnachten schon im Freien erscheinen. 30 cm XII-III 1.—	- coris (empetrifolium). Dunkelgrüne, erikaartige Be- laubung mit gelben Sternblüten. 10 cm 0.50
- macranthus. Die schönste und großblumigste aller	— Degenii. Silbergraue rundliche Blätter, mittelgroße.
Christrosen für den Weihnachtsflor . XII-III 1.20	gelbe Blumen. 30 cm 0.40

fregile Nadelförmige Blättechen Bläten belgebl. 1 form 0.40 nummularinfolium. Reizende Art mir fällich austreisbenden Blättechen und goldgelben Bläten 1 form. 2.75 OympCum. Nadelförmige Blättechen das dahene Ober Grandform. Siehe Neubeiten 0.70 prophylyflurn. Reizende, kleine, gelbhülk. Art. 10 em 0.40 prandform. Siehe Neubeiten 0.70 repens. Niederlieg, kleine Zweige, gelbhülk. art. 10 em 0.40 prandform. Siehe Neubeiten 0.70 repens. Niederlieg, kleine Zweige, gelbhülk. art. 10 em 0.40 prandform. Siehe Neubeiten 0.70 repens. Niederlieg, kleine Zweige, gelbhülk. art. 10 em 0.40 prandform. Siehe Neubeiten 0.80 rhodopaeurn. Ein aus den stüdlichen Macedonien Blätenernen. Grobe silber graue Polster bilden. 0.70 rhypsella longiflora. Siehe Neubeiten 0.80 platenernen. Grobe silbergraue Polster bilden. 0.80 platenernen. 0.80 plat	Hypericum (Fortsetzung) 1St.	Iris (Fortsetzung)
benden Blättchen und goldgelben Bläten. 15 cm. 0.70 olympicum, Nadelömiges Blättweck und ashaber türnige, goldgelbe Bläten. 15 cm. 0.40 polyphylum. Reisende, kleine, gelbklüh. Ari. 10 cm. 0.40 roppens. Niedelige, kleine Zweige, gelbklüh. Ari. 10 cm. 0.50 roppens. Niedelige, kleine Zweige, gelbklüh. Ari. 10 cm. 0.50 rhodopasum. Ein aus dem süldlichen Macedonien stammendes Zwergharthen mit goldgelben Blüten. 5 cm. 0.50 rhodopasum. Ein aus dem süldlichen Macedonien stammendes Zwergharthen und großen, Goldgelben stammendes Zwergharthen und großen, Goldgelben bent, 20 cm. 10 cm. 1	fragile. Nadelförmige Blättchen, Blüten hellgelb. 15 cm 0.40	- serbica. Ähnlich pumila, mit großen lichtgelben
olympicum. Nadelförniges Blattwerk und schalenströmige, goldgelbe Blitten. 15 cm		
polyphyllum. Reizende, kleine gelbblik. Art. 10 cm 0.40 grandflorum. Siehe Nucheiten Grandforum. Siehe Nucheiten Opens. Niederlieg, kleine Zweige gelbblikend. 10 cm 0.55 root opens. Niederlieg, kleine Zweige gelbblikend. 10 cm 0.55 root stammender Zwerghartheu mit großen goldgelben Blittensternen. Große silbergraue Polseter bildend. 0.70 Hypsella longiflora. Siehe Neuheiten Oktysopus. Siehe mittelhole Stauden. Bleris, Schleifenblume, Cruciferae O − Φ Δ ≋ Immergriine Geweichse mit kleinen, lederartigen Blattwerk und schneeweißen Rosettenblitten in großer Menge. Sie gehören zu den skönsten Einfäg- bezw. Stringartenstanden Verdrichen. Sie gehören zu den skönsten Einfäg- bezw. Stringartenstanden Verdrichen. Sie gehören zu den skönsten Einfäg- bezw. Stringartenstanden Verdrichen. Sie gehören zu den skönsten Einfäg- bezw. Stringartenstanden Verdrichen. Sie gehören zu den skönsten Einfäg- bezw. Stringartenstanden Verdrichen. Sie gehören zu den schönsten Einfäg- bezw. Stringartenstanden Verdrichen. Sie mohe Staude mit weißen Blitten oder weiß. 60 npurur überaleren. 20 cm . 0.40 Saxatlits. Zweige daxusartig, niederliegend, Blitten weiße, oft purpur überaleren. 20 cm . 0.50 Sempervirens. 30 em bobe Staude mit weißen Blitten oder weiße, oft purpur überaleren. 20 cm . 0.50 Sempervirens. 30 em bobe Staude mit weißen Blitten oder weißen Blittenden. 20 cm . 0.50 Sempervirens. 30 em bobe Staude mit weißen Blitten oder weißen Blittenden. 20 cm . 0.50 Sempervirens. 30 em bobe Staude mit weißen Blitten oder weißen Blittenden. 20 cm . 0.50 Sempervirens. 30 em bobe Staude mit weißen Blitten oder het weißen Blittenbla. 20 cm . 0.50 Schnebellen Blitten Semper weißen Blittenblang und gradellen Blitten Semper weißen Blittenblang und gradellen Blitten Semper weißen Blittenblang und gradellen Blitten	olympicum. Nadelförmiges Blattwerk und schalen-	Selten III-IV 1.50
repens. Niedekeiteg, keine Weiger gelbühlinad. 10 en 0.50 replens. Kriechende Form mit goldgeben Bliten o en 0.50 rhodopseum. Ein aus dem südinden Macdonien stammender Zwerghartheu mit großen goldgeben Bliten of en 0.80 Hystopus. Sich mittelliche Stauden 0.80 Hystopus. Sich mittelliche Stauden 0.80 Hystopus. Sich mittelliche Stauden 1.9-4 № Immergüne Gewähler mit kleinen, lederartigen Blattwerk und schweewijen Rootetebhliten in großer Menge. Sie gehören au den schönsten Einfaß- bezw. Steingartenstanden 1.9-4 Corifolia. Großblättig. dunkelgrün. Blimen weiß, mit verblauend. 30 en 0.40 Perfection. Kompakte, gleichmäßige Büsche blitzen den 1.9-4 Corifolia. Großblättig. dunkelgrün. Blimen weiß, mit verblauend. 30 en 0.40 Perfection. Kompakte, gleichmäßige Büsche blitzen den 1.9-4 Stemsten 1.9-	Förmige, goldgelbe Blüten. 15 cm 0.40 — polyphyllum. Reizende, kleine, gelbblüh. Art. 10 cm 0.40	Iris pumila O A :: Sehr wertvolle niedrige Garten-Iris
replans, Niederlegs, Alemac Zweiger getblishend, 10 and 0.50 froofoppeum: Ein ans dem süldinen Macedonien Blütenschende Form auf golligelben Blüten. Sein 0.50 froofoppeum: Ein ans dem süldinen Macedonien Blütenschen. Cropse ilbegrane Politere bildend. O.80 froofoppeum: Ein ans dem süldinen Macedonien Blütenschen. Cropse Siehe Neuheiten 0.80 froofoppeum: Ein aus dem süldinen Macedonien O.80 froofoppeum: Ein aus dem süldinen O.80 froofoppeum: Ein Bulanung on O.80 froofoppeum: Ein aus dem süldinen O.80 froofopp	grandiflorum. Siehe Neuheiten 0.70	
rhodopaeum. Ein aus dem süllichen Macedonien stammendes Zwerglachten mit große, goddgelben 1 (2004) Hypsella longilfore. Sieh Neuheiten (2004) Hypsella longilfore. Sieh Neuheiten (2004) Hypsella longilfore. Sieh Neuheiten (2004) Beris, Schleifenblume, Cruciferae ⊙ ⊕ ∆ 3 Immergrine Gewächse mit kleinen, lederarigen Blattwerk und schneewigen Rosettenbliten in großer Menge. Sie gehören au den schonsten Einfaß- bew. Corifolia Großblürrig, Aunkelgrin. Blumen weiß, nicht verblauend. 30 cm. (2004) — Perfection. Kompakte. gleidmäßige Bläsche blidend. Großblürnig weiß. 20 cm. (2004) — Abazdilis. Xweige tawawarig, niederlegend. Bläten weiß, oft purpur überlaufen. 20 cm. (2004) — Sazdilis. Xweige tawawarig, niederlegend. Bläten weiß, oft purpur überlaufen. 20 cm. (2004) — Sazdilis. Xweige tawawarig, niederlegend. Bläten weiß, oft purpur überlaufen. 20 cm. (2004) — Gemen verschen Stande mit weißen Bläten (2004) — Die Foel. Dom einhellveildenblau, 30 cm. (2004) — Die Foel. Dom einhellveildenblau, Hängeblätter dunkelveildenblau, 30 cm. (2004) — Die Foel. Dom einhellveildenblau, 30 cm. (2004)	repens. Niederlieg., kleine Zweige, gelbblühend. 10 cm 0.50	— — atropurpurea. Dunkelviolettpurpur 0.40
Hyssellen longiflora. Siche Neuheiten . 0.80 Hyssopus, Siche mittelhole Stauden . 0.80 Hyssopus, Siche mittelhole Stauden . 0.80 Heris, Schleifenblume, Cruciferae ○ ⊅ ∆ \$ Immergrine Gewähne mit kleinen, lederartigen Blattwerk und schneeweißen Roseitenblitten in großer Neuer St. 1988 of the Stauden . 0.40 Heris, Schleifenblume, Cruciferae ○ ⊅ ∆ \$ Immergrine Blattwerk und schneeweißen Roseitenblitten in großer Neuer St. 1988 of the Stauden St. 1988 of the St. 1988 of	rhodopaeum. Ein aus dem südlichen Macedonien	— aurea. Reingoldgelb
Hyssopus, Siehe mittelhole Standen. Oso Heris, Schleifenblume, Cruciferae A		— — coerulea. Himmelblau
Hystopus. Siche mittelhole Stauden. grüne Gewächse mit kleinem, lederartigen Blattwerk und schneeweißen Rosettenblitten is großer Menge. Sie gehören zu den schörsten Einfaß- bezw. Steingartenstanden i IV-V Corifolia. Großblättrig, dunkelgrün. Blumen weiß, nicht verblauend. 30 cm		— cuprea. Kupfrig mit gelber Zeichnung 0.40 — nova candida. Rahmweiß
No. No	Hyssopus. Siehe mittelhohe Stauden.	— — sulphurea. Schwefelgelb
werk und schneeweißen Rosettenblitten in großer Menges. Sie gehören au den schönsten Einfaß-bews. Steingartenstauden V-V Corifola. Großblättig, dunkelgrün. Blumen weiß, nicht verblauend. 30 cm V-V Perfection. Kompakte, gleichmäßige Büsche bil- dend. Großblümig weiß, 20 cm V-O Asafilis. Zweige taxusuartig, niederliegend, Blüten weiß, oft purpur überlaufen. 20 cm V-O Sempervirens. 30 cm hobe Stande mit weißen Blüten O.50 Ermpervirens. 30 cm hobe Stande mit weißen Blüten O.50 Climax. Mit besond, großen weißen Blüten 20 cm V-O Sempervirens. 30 cm V-V O Schneeigen. Große, weiße Blüten untschen den kräßig. Stiel in überaus groß. Anzahl. Die massige, dunkelgrüne Belaubung gibt der Planze nand der Blütezeit eine besonders gute Wirkung. 20 cm Veliger Zwerg. Dicht gedrungener Wudst. In Früllung bedeut mit schneeweißen Blüten und in Sommer dichte saftiggrüne Belaubung und große, trompetenartige, rosenorte Blüten und in Sommer dichte saftiggrüne Belaubung und große, trompetenartige, rosenorte Blüten und in Sommer dichte saftiggrüne Belaubung und große, trompetenartige, rosenorte Blüten und in Sommer dichte saftiggrüne Belaubung und große, trompetenartige, rosenorte Blüten und in Sommer dichte saftiggrüne Belaubung und große, trompetenartige, rosenorte Blüten und in Sommer dichte saftiggrüne Belaubung und große, trompetenartige, rosenorte Blüten und in Sommer dichte saftiggrüne Belaubung und große, trompetenartige, rosenorte Blüten und in Sommer dichte saftiggrüne Belaubung und große, trompetenartige, rosenorte Blüten und in Sommer dichte saftiggrüne Belaubung und große, trompetenartige, rosenorte Blüten und in Sommer dichte saftiggrüne Belaubung und goldgelben Blüten in großer Fülle, birdaceae Δ Δ "Corresti, Mit graaartiger Blütensetten mit am Boden ausfützend gelben Blum. 20 (m. V-VI "O cristiala. Rasenbildend, amethystblaue Blüten. 10 cm. Selten "Creestien blumen. 15 cm. V-VI "O cristiala. Rasenbildend, amethystblaue Blüten. 10 cm. Selten VY-VI (10,000 prossible Standen) "Intervention blüten 10 cm. Selten VYI "Holl		— — velutina. Dunkelsamtblau 0.40
Menge. Sie gebören zu den achönsten Einfaß- bezw. Steingartenstauden		pumila mit Iris germVarietäten entstanden. Sie
orifolia. Großblättrig, dunkelgrün. Blumen weiß, nicht verblauend. 30 cm. 0.40 — Perfection. Kompakte, gleichmäßige Büsche bildend. Großblumig weiß, 20 cm. 0.40 — Saxafilis. Zweige taxusartig, niederliegend, Blüten weiß, of purpur überlaufen. 20 cm. 0.60 — Sempervirens. 30 cm hohe Staude mit weißen Blüten 0.40 — nana. Zwergform von I. sempervirens, der sie sonst in allen Teilen gleicht 0.50 — Climax. Mit besond großen weißen Blüten. 20 cm. 0.60 — Elffenreigen. Große, weiße Blüten 20 cm. 0.60 — Elffenreigen. Große, weiße Blüten 20 cm. 0.60 — Schneeflocke. Große reinweiße Blüten 20 cm. 0.60 — Schneeflocke. Große reinweiße Blütendold. 20 cm. 0.60 — Schneeflocke. Großer einweiße Blütendold. 20 cm. 0.60 — In Frühling bedeckt mit schneeweißen Blüten und im Sommer dichte saftigerine Belaubung und große, trompetenartige, rosenrote Blumen mit gelden dem Schlund. 20 – 30 cm. VI-VII 0.50 — bybr. Bees Pirk. Siehe Neuheiten 1.— Siehe auch mittelhole Stauden. Inula, Zwergalant, Compositae ⊙ ∆ — acaulis. Stengellose große gelbe Blüten. 5 cm. Selten VII-VIII 1.— ensifolia. Kugelrunde Bische bildend, mit klargelben Strahelhaliten. 20 cm. VII-VIII 0.80 — acaulis. Stengellose große gelbe Blüten. 5 cm. Selten VIII 0.80 — selten aus er selten von 1 VIII 0.80 — acaulis. Stengellose große gelbe Blüten. 5 cm. Selten VIII 0.80 — acaulis. Stengellose große gelbe Blüten. 5 cm. Selten VIII 0.80 — selten in großer Fülle. 20 cm. v. VII 0.80 — selten in großer Fülle. 20 cm. v. VIII 0.80 — rein selten blüten. 20 cm. Selten v. VIII 0.80 — selten in großer Fülle. 20 cm. v. VIII 0.80 — selten in großer Fülle. 20 cm. v. VIII 0.80 — selten in großer Fülle. 20 cm. v. VIIII 0.80 — selten in großer Fülle. 20 cm. v. VIII 0.80 — selten in großer Fülle. 20	Menge. Sie gehören zu den schönsten Einfaß- bezw.	blühen einige Tage später als die ersten Iris pumila
nicht verblauend. 30 cm. 0.40 Perfection. Kompakte, gleichmäßige Büsche bildendendendendendendendendendendendendend		
dend. Großblumig weiß, 20 cm	nicht verblauend. 30 cm	gelb mit leuchtend goldgelbem Bart. 30 cm 0.40
Saxhilis. Zweige taxusartig, niederliegend, Blüten weiße, of purpur überlaufen. 20 cm. 0.60 Sempervirens. 30 cm hohe Staude mit weißen Blüten 0.40 — nana. Zwergform von I. sempervirens, der sie sonst in allen Teilen gleicht . 0.50 — Climax. Mit besond, großen weißen Blüten. 0.40 — Elfenreigen, Große, weiße Blüten umstehen den kräftig, Stiel in überaus groß. Anzahl. Die massige, dunkelgrüne Belaubung gibt der Pflanze nach der Blüterseit ein besonders gute Wirkung. 20 cm. 0.60 — Schneeflocke. Große reinweiße Blüten und im Schmeewißen Blüten und im Semmer dichte sattiggrüne Belaubung. 10 cm. 0.40 — Weißer Zwerg. Dicht gedrungener Wuds. Im Frülling bedeckt mit schneeweißen Blüten und im Große, trompetenartige, rosenrote Blumen mit goldene Schlund. 20-30 cm. VI-VII 0.50 — berovipes. Starkwichsiger als vorige und noch intensiver rosenrote Blüten. 30-40 cm. VI-VII 0.50 — berovipes. Starkwichsiger als vorige und noch intensiver rosenrote Blüten. 30-40 cm. VI-VII 0.50 — berovipes. Starkwichsiger als vorige und noch intensiver rosenrote Blüten. 30-40 cm. VI-VIII 0.50 — selten VII-VIII 0.50 — deaulis, Stengellose große gelbe Blüten. 5 cm. Selten VII-VIII 0.50 — selten VII-VIII 0.50 — deaulis, Stengellose große gelbe Blüten. 5 cm. Schlen. V-VI 0.40 — hilocoephala. Eigenartige Blattrosetten mit am Boden aufsitzend. gelben Blum. 20 cm. Selten. V-VI 0.40 — Selten VII-VIII 0.80 Gracilipes. Miniaturungs v. Iris Kaempferi. Schmale, gravartige Belaubung und hübsche, blane Blumen mit gelben Kämmen. 20-30 cm. Selten. V-VI 0.40 — selten in geoßer Fülle. 20 cm. V-VI 0.40 — selten in geoßer Fülle. 20 cm. V-VI 0.40 — selten in geoßer Fülle. 20 cm. V-VI 0.40 — selten in geoßer Fülle. 20 cm. V-VI 0.40 — selten in geoßer Fülle. 20 cm. V-VI 0.40 — selten in geoßer Fülle. 20 cm. V-VI 0.40 — selten in geoßer Fülle. 20 cm. V-VI 0.40 — selten in geoßer Fülle. 20 cm. V-VI 0.40 — selten in geoßer Fülle. 20 cm. V-VI 0.40 — selten in geoßer Fülle. 20 cm. V-VI 0.40 — selten in geoßer Fülle. 20 cm		— — cyanea. Tiefultramarinblau. 30 cm 0.40 — — Darmstadt. Siehe Neuheiten 060
Sempervirens. 30 cm hohe Staude mit weißen Blüten 0.45 co. Sches and Rwergform von I. sempervirens, der sie sonst in allen Teilen gleicht	- saxatilis. Zweige taxusartig, niederliegend, Blüten	Die Fee. Dom reinhellveilchenblau, Hänge-
nana. Zwergform von I. sempervirens, der sie sonst in allen Teilen gleicht		blätter dunkelveilchenblau, 30 cm 0.40
sonst in allen Teilen gleicht	nana. Zwergform von I. sempervirens, der sie	fangs mattrahmfarben, später weiß. 30 cm 0.50
Eftenreigen. Große, weiße Blüten umstehen den kräftig. Stell ni überaus groß. Anzahl. Die massieg, dunkelgrüne Belaubung gibt der Pflanze nach der Blütezeit eine besonders gute Wirkung. 20 cm . 0.60 — Schneeflocke. Große reinweiße Blütendold. 20 cm 0.40 — Weißer Zwerg. Dicht gedrungener Wuchs. Im Frühling bedeckt mit schneeweißen Blüten und im Sommer dichte saftiggrüne Belaubung. 10 cm . 0.40 Incarvillea, Freilandgloxinie, Bignoniaceae ○ △ □ — florida. Außerst, reichblühend, zitronengelbe Farbe mit feinen Adern. 30 cm . 0.40 Incarvillea, Freilandgloxinie, Bignoniaceae ○ △ □ — florida. Außerst, reichblühend, zitronengelbe Farbe mit feinen Adern. 30 cm . 0.40 Incarvillea, Freilandgloxinie, Bignoniaceae ○ △ □ — Jean Siret. Leuchtend gelb, außerordentlich reichblühend und sehr gut remontierend. 30 cm . 0.50 — Leander. Die Insgermanica großen Blumen sind reingoldgelb, sehr reichblühend 30 cm . 0.50 — Schneekluppe. Edle reinweiße Blüten von Iris germanica-großen Blumen sind reingoldgelb, sehr reichblühend. 30 cm . 0.50 — Schneekluppe. Edle reinweiße Blüten von Iris germanica-großen Blumen aufsitzend, gelben Blum. 20 cm . VII-VIII 0.40 Incarvillea, Freilandgloxinie, Bignoniaceae ○ △ VII-VIII 0.50 Incarvillea, Freilandgloxinie, Bignoniaceae ○ M. VII-VIII 0.50 I	sonst in allen Teilen gleicht 0.50	— — eburnea. Obere Blumenblätter reinweiß, untere
kräftig. Stiel in überaus groß. Anzahl. Die massige, dunkelgrüne Belaubung gibt der Pflanze nach der Blütezeit eine besonders gute Wirkung. 20 cm 0.60 Schneeflocke. Große reinweiße Blüten dold. 20 cm 0.40 Weißer Zwerg. Dicht gedrungener Wuchs. Im Frühling bedeckt mit schneeweißen Blüten und im Sommer dichte saftiggrüne Belaubung. 10 cm 0.40 formore dichte saftiggrüne Belaubung. 10 cm 0.40 grandiflora. Dekorative, geficherte Belaubung und große, trompetenartige, rosenrote Blumen mit goldenem Schlund. 20-30 cm . VI-VII 0.50 brevipes. Starkwichsiger als vorige und noch intensiver rosenrote Blüten. 30-40 cm. VI-VIII 0.50 hybr. Bees Pink. Siehe Neuheiten . 1.— Siehe auch mittelhobe Stauden. Hula, Zwerglant, Compositae ⊙ △ acaulis. Stengellose große gelbe Blüten. 5 cm. Selten . VII-VIII 0.40 rhizocephala. Eigenartige Blattrosetten mit am Boden aufsitzend, gelben Blum. 20 cm. Selten. VII-VIII 0.40 rhizocephala. Eigenartige Blattrosetten mit mBoden aufsitzend, gelben Blum. 20 cm. Selten. VVI 0.70 crisfata. Rasenbildend, amethystblaue Blüten. 10 cm. Selten . VVI 1.— Forresti. Mit grasartiger Belaubung und goldgelben Blüten. 10 cm. Selten . VVI 1.— Forresti. Mit grasartiger Belaubung und goldgelben Blüten. 10 cm. Selten . VVI 0.70 crisfata. Rasenbildend, amethystblaue Blüten. 10 cm. Selten . VVI 0.70 crisfata. Rasenbildend, amethystblaue Blüten. 10 cm. Selten . VVI 0.70 crisfata. Rasenbildend, amethystblaue Blüten. 10 cm. Selten . VVI 0.70 crisfata. Schöre Zwergsiris, blaublik. 20 cm. VVI 1.— Galebon Kömmen. 20-30 cm. Selten. VVI 0.40 crisfata. Schöre Zwergsiris, blaublik. 20 cm. VVI 0.40 cm. Willender gelben Kämmen. 20-30 cm. Selten. VVI 0.40 cm. Willender gelben Kämmen. 20-30 cm. Selten. VVI 0.40 cm. Willender gelben Kämmen. 20-30 cm. Selten. VVI 0.40 cm. Willender gelben Kämmen. 20-30 cm. Selten. VVI 0.40 cm. Willender gelben Kämmen. 20-30 cm. Selten. VVI 0.40 cm. Willender gelben Kämmen. 20-30 cm. Willender gelben Kämmen. 20-30 cm. Willender gelben Kämmen. 20-30 cm. Willender gelben gelben gelben gelben gerben gelbe	Elfenreigen. Große, weiße Blüten umstehen den	— excelsa. Blüte von ganz reiner, reich ocker-
Blütezeit eine besonders gute Wirkung. 20 cm	kräftig. Stiel in überaus groß. Anzahl. Die massige,	gelber Farbe. 30 cm
- Schneeflocke. Große reinweiße Blütendold. 20 cm 0.40 - Weißer Zwerg. Dicht gedrungener Wuchs. Im Frühling bedeckt mit schneeweißen Blüten und im Sommer dichte saftiggrüne Belaubung. 10 cm . 0.40 Incarvillea, Freilandgloxnine, Bignoniaceae ○ Δ □ grandiflora. Dekorative, gefiederte Belaubung und große, trompetenartige, rosenrote Blumen mit gol- denem Schlund. 20-30 cm . VI-VII 0.50 - brevipes. Starkwüchsiger als vorige und noch intensiver rosenrote Blüten. 30-40 cm . VI-VII 0.50 - hybr. Bees Pink. Siehe Neuheiten . 1.— Siehe auch mittelhohe Stauden. Inula, Zwergalant, Compositae ○ Δ - acaulis. Stengellose große gelbe Blüten. 5 cm. Selten . VII-VIII 1.— ensifolia. Kugelrunde Büsche bildend, mit klargelben Strahlenbliten. 20 cm . VII-VIII 1.— ensifolias. Kengelrunde Büsche bildend, mit klargelben Strahlenbliten. 20 cm . VII-VIII 1.— ensifolias. Kengelrunde Büsche bildend, mit klargelben Strahlenbliten. 20 cm . VII-VIII 1.— ensifolias. Kengelrunde Büsche bildend, mit klargelben Strablenbliten. 20 cm . VII-VIII 1.— ensifolias. Kugerrunde Büsche bildend, mit klargelben Strablenbliten. 20 cm . VII-VIII 1.— ensifolias. Kingerrunde Büsche bildend, mit klargelben Strablenbliten. 20 cm . VII-VIII 1.— ensifolias. Kingerrunde Büsche bildend, mit klargelben Strablenbliten. 20 cm . VII-VIII 1.— ensifolias. Kingerrunde Büsche bildend, mit klargelben Strablenbliten. 20 cm . VII-VIII 1.— ensifolias. Kingerrunde Büsche bildend, mit klargelben Strablenbliten. 20 cm . VII-VIII 1.— ensifolias. Kingerrunde Büsche bildend, mit klargelben Strablenbliten. 20 cm . VII-VIII 1.— ensifolias. Kingerrunde Büsche bildend, mit klargelben Strablenbliten. 20 cm . VII-VIII 1.— ensifolias. Kingerrunde Büsche bildend, mit klargelben Strablenbliten. 20 cm . VII-VIII 1.— ensifolias. Kingerrunde Büsche bildend, mit klargelben Strablenbliten. 20 cm . VII-VIII 1.— ensifolias. Kingerrunde Büsche bildend, mit klargelben Strablenbliten. 20 cm . VII-VIII 1.— ensifolias. Kingerrunde Büsche bildend, mit klargelben Strablenbliten. 20 cm . VII-VIII 1.— ensi		— — floribunda. Domblätt. cremegelb, Hängeblätter
Farbe mit feinen Adern. 30 cm 0.40 Incarvillea, Freilandgloxinie, Bignoniaceae ○ Δ □ grandfilora. Dekorative, gefiederte Belaubung und große, trompetenartige, rosenrote Blumen mit gol- denem Schlund. 20−30 cm VII-VII 0.50 □ brevipes. Starkwüchsiger als vorige und noch intensiver rosenrote Blitten. 30−40 cm VII-VIII 0.50 □ brevipes. Starkwüchsiger als vorige und noch intensiver rosenrote Blitten. 30−40 cm VII-VIII 0.50 □ brevipes. Starkwüchsiger als vorige und noch intensiver rosenrote Blüten. 30−40 cm VII-VIII 0.50 □ hybr. Bees Pink. Siche Neuheiten 1.— Siche auch mittelhohe Stauden. Inula, Zwergalant, Compositae ○ Δ □ acaulis. Stengellose große gelbe Blüten. 5 cm. Selten VII-VIII 0.40 □ hizocephala. Eigenartige Blattrosetten mit am Boden ausistzend. gelben Blum. 20 cm. Selten. VII-VIII 0.40 □ hizocephala. Eigenartige Blattrosetten mit am Boden ausistzend. gelben Blum. 20 cm. Selten. VII-VIII 0.40 □ respitosa. Hübsche, seltene, chinesische Zwergsorte mit violetten Blumen. 15 cm V-VI 0.40 □ Forresti. Mit grasartiger Belaubung und bilbsche, blaue Blumen. Selten V-VI 1.— Forresti. Mit grasartiger Belaubung und goldgelben Blüten in großer Fülle. 20 cm V-VI 0.80 □ gracilipes. Miniaturausg. v. Iris Kaempleri, Schmale, gyrasartige Belaubung und bilbsche, blaue Blumen mit gelben Kämmen. 20−30 cm. V-VI 0.80 □ patula. Achalith Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend a gedeihen in jedem Boden. 20−30 cm. V-VI 0.80 □ patula. Achalith Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend a gedeihen in jedem Boden. 20−30 cm. V-VI 0.80 □ patula. Achalith Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend a gedeihen in jedem Boden. 20−30 cm. V-VI 0.80 □ patula. Achalith Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend a gedeihen in jedem Boden. 20−30 cm. V-VI 0.80 □ patula. Achalith Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend a gedeihen in jedem Boden. 20−30 cm. V-VI 0.80 □ patula. Achalith Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend a gedeihen in jedem Boden. 20−30 cm. V-VI 0.80 □ patula. Achal	- Schneeflocke. Große reinweiße Blütendold. 20 cm 0.40	florida. Außerst, reichblühend, zitronengelbe
Sommer dichte saftiggrüne Belaubung. 10 cm. 0.40 Incarvillea, Freilandgloxinie, Bignoniaceae ○ △ □ grandiflora. Dekorative, gefiederte Belaubung und große, trompetenarfige, rosenrote Blumen mit goldenem Schlund. 20—30 cm. 0. VI-VII 0.50 — brevipes. Starkwichsiger als vorige und noch intensiver rosenrote Blüten. 30—40 cm. VI-VII 0.50 — bybr. Bees Pink. Siehe Neuheiten. 1.— — Siehe aud mittelhohe Stauden. Inula, Zwergalant, Compositae ○ △ — acaulis. Stengellose große gelbe Blüten. 5 cm. — Selten. VII-VIII 0.40 — rhizocephala. Eigenartige Blattrosetten mit am Boden aufsitzend. gelben Blum. 20 cm. Selten. VII-VIII 1.— Ensifolia. Kugelrunde Blüsche bildend, mit klargelben Strahlenblüten. 20 cm. VII-VIII 1.— Ensifolia. Rasenblüten. 20 cm. Selten. VII-VIII 1.— Ensifolia. Rasenblüten. 20 cm. Selten. VII-VIII 1.— Selten. V-VI 1.— Forresti. Mit grasartiger Belaubung und goldgelben Blüten in großer Fülle. 20 cm. V-VI 1.— Forresti. Mit grasartiger Belaubung und blübsche, blaue Blumen mit gelben Kämmen. 20—30 cm. Selten. V-VI 1.— Ensifolia. Rasenblüten. 30 cm. V-VI 0.40 — maculatum argentume. Eiförmige, weißgefleckte Belaubung, die sich im Witter noch rotbraun färbt. Die schönste Schattenpflanze für große Fläden. V-VI 0.40 — maculatum argentume. Eiförmige, weißgefleckte Blaubung, die sich im Witter noch rotbraun färbt. Die schönste Schattenpflanze für große Fläden. V-VI 0.40 — maculatum argentume. Eiförmige, weißgefleckte Blaubung, die sich im Witter noch rotbraun färbt. Die schönste Schattenpflanze für große Fläden. V-VI 0.40 — alpestris. Weißlichrosa. 30 cm. III-V 0.40 — alpestris. Dead of the dem. 20— 20 cm. VIII-VIII 0.4	- Weißer Zwerg. Dicht gedrungener Wuchs. Im	Farbe mit feinen Adern. 30 cm 0.40
Grandiflora. Dekorative, gefiederte Belaubung und große, trompetenartige, rosenrote Blumen mit goldenem Schlund. 20—30 cm	Sommer dichte saftiggrüne Belaubung. 10 cm 0.40	blau, die unteren penseeviolett. 30 cm 0.50
große, trompetenartige, rosenrote Blumen mit goldenem Schlund. 20—30 cm. VI-VII 0.50	Incarvillea, Freilandgloxinie, Bignoniaceae O A	Jean Siret. Leuchtend gelb, außerordentlich
denem Schlund. 20—30 cm VI-VII 0.50 — brevipes. Starkwüchsiger als vorige und noch intensiver rosenrote Blüten. 30—40 cm VI-VII 0.50 — hybr. Bees Pink. Siehe Neuheiten 1.— Siehe auch mittelhohe Stauden. Inula, Zwergalant, Compositae ⊙ △ acaulis. Stengellose große gelbe Blüten. 5 cm. Selten 1.— VII-VIII 1.— ensifolia. Kugelrunde Büsche bildend, mit klargelben Strahlenblüten. 20 cm VII-VIII 0.40 — rhizocephala. Eigenartige Blattrosetten mit am Boden aufsitzend. gelben Blum. 20 cm. Selten. VII-VIII 1.— Iris, Zwerg-Schwertlille, Iridaceae ⊙ △ Verschiedene Arten: Caespitosa. Hübsche, seltene, chinesische Zwergsorte mit violetten Blumen. 15 cm. V-VI 0.70 Cristata. Rasenbildend, amethystblaue Blüten. 10 cm. Selten. V-VI 1.— Forresti. Mit grasartiger Belaubung und goldgelben Blüten in großer Fülle. 20 cm. V-VI 1.— mellitis. Schöne Zwergiris, blaublüh. 20 cm. V-VI 1.— mellitis. Schöne Zwergiris, blaublüh. 20 cm. V-VI 1.— Baron Götz von Okocim. Zartmagentarosa 1.— Jenny. Hellviolettblau 1.— Kazimir Missona. Tiefdunkellila 1.— 1.— VIII VIII 0.40 sind reingoldgele. sehr reichblühend 1.— 0.50 — Schneekuppe. Edle reinweiße Blüten von 1.— Schneekuppe. Edle reinweiße Blüten von 0.50 — Schneekuppe. Edle reinweiße Blüten von 0.60 Jankaea. Siehe Ramondia. Jasione, Sandglöckchen, Campanulaceae 0 ∞ △ — humilis. Reizendes Felsenpflänzchen mit beluen Kugelbumen. 15 cm. VII-VIII 0.80 — humilis. Reizendes Felsenpflänzchen mit blauen Kugelbumen. 15 cm. VIII 0.80 — perennis. Länglich lanzettliche Blätter und blaue Blüten. 10 cm. Selten. V-VI 0.40 — galeobdolon luteum. Immergrünes, leicht geflecktes Schattenpflanze für große Flächen. V-VI 0.40 — maculatum argenteum. Eißermige, weißgefle Belaub. und hübsche, rote Lippenblüten. 20 cm. V-VI 0.40 — alpus. Mit weißen Blüten. 30 cm. III-V 0.60 — alpestris. Weißlichrosa. 30 cm. III-V 0.60 — alpestris. Weißlichrosa. 30 cm. III-V 0.60 — alpestris. Weißlichrosa. 30		- Leander. Die Iris germanica-großen Blumen
intensiver rosenrote Blüten. 30–40 cm. VI-VII 0.50 hybr. Bees Pink. Siehe Neuheiten	denem Schlund. 20-30 cm VI-VII 0.50	sind reingoldgelb, sehr reichblühend. 30 cm 0.50
Nybr. Bees Pink. Siehe Neuheiten Siehe auch mittelhohe Stauden. Siehe auch mittelhohe Stauden. Siehe auch mittelhohe Stauden. Inula, Zwergalant, Compositae ⊙ Δ acaulis. Stengellose große gelbe Blüten. 5 cm. Selten		— — Orange Queen. Große, orangegelbe Bliit. 20cm 0.00 — — Schneekuppe. Edle reinweiße Bliiten von
Inula, Zwergalant, Compositae ○ Δ acaulis. Stengellose große gelbe Blüten. 5 cm. Selten	hybr. Bees Pink. Siehe Neuheiten	Iris germanica-Größe. 30 cm 0,50
acaulis. Stengellose große gelbe Blüten. 5 cm. Selten	Siehe auch mittelhohe Stauden.	— — Souv. de Lt. Chavignac. Violett mit bronze-
Selten	acaulis. Stengellose große gelbe Bliiten, 5 cm.	Jankaea. Siehe Ramondia.
Strahlenblüten. 20 cm	Selten VII-VIII 1.—	Jasione, Sandglöckchen, Campanulaceae ○ ∞ △
rhizocephala. Eigenartige Blattrosetten mit am Boden aufsitzend. gelben Blum. 20 cm. Selten. VII-VIII 1.— Iris, Zwerg-Schwertlilie, Iridaceae ○ △ Verschiedene Arten: — caespitosa. Hübsche, seltene, chinesische Zwergsorte mit violetten Blumen. 15 cm V-VI 0.70 — cristata. Rasenbildend, amethystblaue Blüten. 10 cm. — Selten V-VI 1.— Forresti. Mit grasartiger Belaubung und goldgelben Blüten in großer Fülle. 20 cm VI-VIII 0.80 Gracilipes. Miniaturausg. v. Iris Kaempferi. Schmale, grasartige Belaubung und hübsche, blaue Blumen mit gelben Kämmen. 20—30 cm. Selten. V-VI 2.— lacustris. Kleine lichtblaue Blüten. 15 cm V-VI 1.— — mellitis. Schöne Zwergiris, blaublüh. 20 cm. V-VI 0.80 — patula. Aehnlich Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend u. gedeihen in jedem Boden. 20-30 cm. V-VI 1.— — Baron Götz von Okocim. Zartmagentarosa 1.— — Jenny. Hellviolettblau	ensitolia. Kugelrunde Büsche bildend, mit klargelben Strahlenblüten 20 cm. VII-VIII 0.40	- numilis. Reizendes Felsenpflänzchen mit blauen Kugel-
aufsitzend, gelben Blum. 20 cm. Selten. VII-VIII 1.— Iris, Zwerg-Schwerflilie, Iridaceae ○ △ Verschiedene Arten: Caespitosa. Hübsche, seltene, chinesische Zwergsorte mit violetten Blumen. 15 cm V-VI 0.70 Cristata. Rasenbildend, amethystblaue Blüten. 10 cm. Selten V-VI 1.— Forresti. Mit grasartiger Belaubung und goldgelben Blüten in großer Fülle. 20 cm VI-VIII 0.80 gracilipes. Miniaturausg. v. Iris Kaempferi. Schmale, grasartige Belaubung und hübsche, blaue Blumen mit gelben Kämmen. 20—30 cm. Selten. V-VI 2.— lacustris. Kleine lichtblaue Blüten. 15 cm V-VI 1.— mellitis. Schöne Zwergiris, blaublüh. 20 cm. V-VI 0.80 patula. Achnlich Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend u. gedeihen in jedem Boden. 20-30 cm V-VI 1.— Baron Götz von Okocim. Zartmagentarosa 1.— Jenny. Hellviolettblau	rhizocephala. Eigenartige Blattrosetten mit am Boden	- perennis. Länglich - lanzettliche Blätter und blaue
Verschiedene Arten: Caespitosa. Hübsche, seltene, chinesische Zwergsorte mit violetten Blumen. 15 cm V-VI 0.70 Cristata. Rasenbildend, amethystblaue Blüten. 10 cm. Selten V-VI 1.— Forresti. Mit grasartiger Belaubung und goldgelben Blüten in großer Fülle. 20 cm VI-VIII 0.80 gracilipes. Miniaturausg. v. Iris Kaempferi. Schmale, grasartige Belaubung und hübsche, blaue Blumen mit gelben Kämmen. 20—30 cm. Selten. V-VI 2.— lacustris. Kleine lichtblaue Blüten. 15 cm V-VI 1.— mellitis. Schöne Zwergiris, blaublüh. 20 cm. V-VI 0.80 patula. Achnlich Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend u. gedeihen in jedem Boden. 20-30 cm V-VI 1.— Baron Götz von Okocim. Zartmagentarosa 1.— Jenny. Hellviolettblau	aufsitzend. gelben Blum. 20 cm. Selten. VII-VIII 1.—	Blüten in dichten Köpfchen. 30 cm . VII-VIII 0.50
Caespitosa. Hübsche, seltene, chinesische Zwergsorte mit violetten Blumen. 15 cm V-VI 0.70 — Cristata. Rasenbildend, amethystblaue Blüten. 10 cm. Selten V-VI 1.— — Forresti. Mit grasartiger Belaubung und goldgelben Blüten in großer Fülle. 20 cm VI-VIII 0.80 — Gracilipes. Miniaturausg. v. Iris Kaempferi. Schmale, grasartige Belaubung und hübsche, blaue Blumen mit gelben Kämmen. 20—30 cm. Selten. V-VI 2.— — lacustris. Kleine lichtblaue Blüten. 15 cm V-VI 1.— — mellitis. Schöne Zwergiris, blaublüh. 20 cm. V-VI 0.80 — patula. Aehnlich Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend u. gedeihen in jedem Boden. 20-30 cm V-VI 1.— — Baron Götz von Okocim. Zartmagentarosa 1.— — Jenny. Hellviolettblau 1.— Kazimir Missona. Tiefdunkellila 1.— Kazimir Missona. Tiefdunkellila 1.—	Verschiedene Arten:	— galeobdolon luteum. Immergrünes, leicht geflecktes
sich im Winter noch rotbraun färbt. Die schönste Schattenpflanze für große Flächen . V-VI 0.40 Forresti. Mit grasartiger Belaubung und goldgelben Blüten in großer Fülle. 20 cm . VI-VIII 0.80 gracilipes. Miniaturausg. v. Iris Kaempferi. Schmale, grasartige Belaubung und hübsche, blaue Blumen mit gelben Kämmen. 20−30 cm. Selten. V-VI 2.− lacustris. Kleine lichtblaue Blüten. 15 cm V-VI 1.− mellitis. Schöne Zwergiris, blaublüh. 20 cm. V-VI 0.80 patula. Aehnlich Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend u. gedeihen in jedem Boden. 20-30 cm V-VI 1.− Baron Götz von Okocim. Zartmagentarosa 1.− Jenny. Hellviolettblau		Laub, Blüten goldgelb, 20 cm V-VI 0.40
Selten		sich im Winter noch rotbraun färbt. Die schönste
Forresti. Mit grasartiger Belaubung und goldgelben Blüten in großer Fülle. 20 cm VI-VIII 0.80 gracilipes. Miniaturausg. v. Iris Kaempferi. Schmale, grasartige Belaubung und hübsche, blaue Blumen mit gelben Kämmen. 20−30 cm. Selten. V-VI 2.− lacustris. Kleine lichtblaue Blüten. 15 cm V-VI 1.− mellitis. Schöne Zwergiris, blaublüh. 20 cm. V-VI 0.80 patula. Aehnlich Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend u. gedeihen in jedem Boden. 20-30 cm V-VI 1.− Baron Götz von Okocim. Zartmagentarosa 1.− Jenny. Hellviolettblau 1.−	_ Selten V-VI 1.—	Schattenpflanze für große Flächen V-VI 0.40
grasartige Belaubung und hübsche, blaue Blumen mit gelben Kämmen. 20–30 cm. Selten. V-VI 2.— lacustris. Kleine lichtblaue Blüten. 15 cm V-VI 1.— mellitis. Schöne Zwergiris, blaublüh. 20 cm. V-VI 0.80 patula. Aehnlich Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend u. gedeihen in jedem Boden. 20-30 cm V-VI 1.— Baron Götz von Okocim. Zartmagentarosa 1.— Jenny. Hellviolettblau 1.— Kazimir Missona. Tiefdunkellila 1.— Leontopodium, Edelweiß, Compositae O A Sternblüten. 10—20 cm VIII-V 0.40 Sternblüten. 10—20 cm VIII-V 0.40 Sternblüten. 10—20 cm VIII-V 0.40 Sternblüten. 10—20 cm VIII-VIII 0.40	Forresti. Mit grasartiger Belaubung und goldgelben	maculatum argenteum. Eiformige, weißgefl. Belaub.
grasartige Belaubung und hübsche, blaue Blumen mit gelben Kämmen. 20–30 cm. Selten. V-VI 2.— lacustris. Kleine lichtblaue Blüten. 15 cm V-VI 1.— mellitis. Schöne Zwergiris, blaublüh. 20 cm. V-VI 0.80 patula. Aehnlich Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend u. gedeihen in jedem Boden. 20-30 cm V-VI 1.— Baron Götz von Okocim. Zartmagentarosa 1.— Jenny. Hellviolettblau 1.— Leontopodium, Edelweiß, Compositae OA— alpinum. Grünweißfilzige Blätter und schneeweiße Sternblüten. 10–20 cm. VIII-VIII 0.40	gracilipes. Miniaturausg. v. Iris Kaempferi. Schmale,	
— albus. Mit weißen Blüten. 30 cm III-V 0.50 — alpestris. Schöne Zwergiris, blaublüh. 20 cm. V-VI 0.80 — alpestris. Weißlichrosa. 30 cm III-V 0.50 — alpestris. Weißlichrosa. 30 cm III-V 0.50 — alpestris. Weißlichrosa. 30 cm III-V 0.60 — aureus. Goldgelb. 30 cm III-V 0.60 — aureus. Goldgelb. 30 cm III-V 0.60 — Lavandula. Siehe mittelhohe Stauden. Leontopodium, Edelweiß, Compositae ○ △ — alpinum. Grünweißfilzige Blätter und schneeweiße — Sternblüten. 10-20 cm. VIII-VIII 0.40	grasartige Belaubung und hübsche, blaue Blumen	- vernus. Mit leuchtend karminroten wickenartigen
mellitis. Schöne Zwergiris, blaublüh. 20 cm. V-VI patula. Aehnlich Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend u. gedeihen in jedem Boden. 20-30 cm V-VI Baron Götz von Okocim. Zartmagentarosa Jenny. Hellviolettblau Kazimir Missona. Tiefdunkellila Sternblüten. 10−20 cm V-VI — alpestris. Weißlichrosa. 30 cm III-V 0.60 Lavandula. Siehe mittelhohe Stauden. Leontopodium, Edelweiß, Compositae ○ △ — alpinum. Grünweißfilzige Blätter und schneeweiße Sternblüten. 10−20 cm VII-VIII 0.40	lacustris. Kleine lichtblaue Blitten, 15 cm V-VI 1-!	—— albus. Mit weißen Blüten, 30 cm. HI-V 0.40
— dureus. Goldgelb. 30 cm	mellitis. Schöne Zwergiris, blaublüh. 20 cm. V-VI 0.80	— alpestris. Weißlichrosa. 30 cm III-V 0.50
Baron Götz von Okocim. Zartmagentarosa . 1.— Jenny. Hellviolettblau	Patula. Aehnlich Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend	— — aureus. Goldgelb. 30 cm III-V 0.60
Jenny. Hellviolettblau 1.— — alpinum. Grünweißfilzige Blätter und schneeweiße Kazimir Missona. Tiefdunkellila 1.— Sternblüten, 10-20 cm	Baron Götz von Okocim. Zartmagentarosa . 1.—	Leontopodium, Edelweik, Compositae
Nazimir Missona. Tiefdunkellila 1.— Sternblüten, 10—20 cm VII, VIII 0.40	Jenny, Hellviolettblau	- alpinum. Grünweißfilzige Blätter und schneeweiße
	Valery Germanis. Leuchtend blau 1.—	Sternblüten, 10-20 cm VII-VIII 0.40 — sulphureum. Mit schwefelgelben Blumen, Selten . 1.—

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung 1St.	Marrian Andrea L. L.
Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung 1St. RM Leontopodium (Fortsetzung)	Marrubium, Andorn, Labiatae O A — candidissimum. Silberweiße, zottig behaarte Belau- — hung Blitten weiß 200
- callocephalum. Chinesische Art mit besonders großen	oung. Dittell Welk, 30 cm
Blumen	bullet weige Delaubung, weibe I inpenblites
- japonicum. Im Wuchs u. Aussehen verschied. v. obigen 0.50	VI-VII 050
- sibiricum. Mit größeren Sternblüt. 20 cm VII-VIII 0.50 - transylvanicum. Besond. großblum. Art. VII-VIII 0.60	I Midiricaria, leppichkamille Compositac o co
Leptinella. Siehe Cotula.	— caucasica. Kriechende Art mit niedlichen, weißen Blüten über einer saftig dunkelgrünen Belaubung.
Lewisia, Bitterwurz, Portulacaceae O-D \(\triangle \)	1 stellen, sonnigen Doschungen und
- cotyledon. Saxifragaähnliche, silberweiße Rosetten,	a de la la sentiachen am de la la contraction de
rosa Blüten im Sommer, sehr eigenartig. 20 cm.	diese schnellwachsende immercrine lai
Selten VII-VIII 1.— Leana. Stielrunde bläulichgrüne Belaubung, rosa	dende Staude ersetzen. 10 cm VI-VIII 0.30 oreades. Ähnlich voriger, jedoch noch feinere Belaubung und kleinere Blau-
Blüten. 20 cm VII-VIII 1.20	I S and Richlete Dillen, 5 cm Wi Will A 70
Linaria, Leinkraut, Scrophulariaceae ○- → △	Trial and the state of the stat
Meist kriechende Pflänzchen mit teils ober- teils	
unterirdischen Ausläufern und kleinen, löwenmaul- ähnlichen Blüten in großer Massc. Lieben frischen	bildend, stumpfeiförmiges Laub und hellblaue Röhrenblütchen. 5 cm. Selten V-VI 0.50
Boden. 15–20 cm VI-VIII	
- acutangula. Die zierlichste von allen, mit winzigen	Rasige kleinblatteriae D-1
Blättchen und lila Blütchen. 3 cm 0.50	Mertensia, Lungenwurz Borner V-VIII 0.40
— alpina. Kleine, nadelförm. Blättchen u. blaue Blüten in großer Zahl. 5 cm	Mertensia, Lungenwurz, Borraginaceae ○-① △ - echioides (primuloides). Mit kobaltblauen Blüten.
rosea. Wie vorige, jedoch rosa Blüten. 5 cm 0.50	— elongata (elegans) Las VII-VIII 0.50
- cymbalaria. Heidelberger Schloßkräutchen, kriechend.	1 January 1 1
Wuchs, kleine efeuartige Blättch., blaue Lippenbl. 0.40	dinablaue Blütentrauben. 20 cm . VII-IX 0.50 Micromeria, Scheinbohnenkraut, Labiatae ○ △
alba. Weiße Form. 5 cm	
von violetter Farbe. 10 cm	— microphylla. Zierliche Belaubung. 10 cm VII-VIII 0.50 Mimulus. Gauklerhlumg. Sergeld. 10 cm VII-VIII 0.60
- hepaticaefolia. Kräftig wachsende Art, weiß marmo-	
rierte Blätter, weiße Blüten. 5 cm 0.50 — nevadensis. Weißblühend. 15 cm. Selten 0.60	
— pallida. Bleichviolette Blüten, eine der schönsten. 5 cm 0.40	löwenmaulähnlichen Blüten während des ganzen Sommers. 20-30 cm VI-VIII Fremontii Hellgelb
alba. Großblumig, weißblühend. 5 cm 0.50	
- pilosa. Hübscher, kriechender Zwerg. Feine blaue	— hybr. Bees Dazzler. Mit leuchtend karminroten Blüten 0.50 — Burnetii. Leuchtend kunfangen 6 de 1
Blütchen mit gelber Mitte. 5 cm 0.50 - repens alba. Ähnlich Pancicii, mit weiß. Blüten. 30 cm 0.50	- Feuerfalter Großbl 0.40
- villosa. Behaart, violettblühend. Selten. 10 cm 0.60	— Leopard. Gelb mit schwarzbrauner Zeichnung . 0.40 — Netzfalter. Siehe Neuheiter.
Linum, Lein, Linaceae ○ ∞ △ Niedl. Büsche mit nadel-	- Netzfalter. Siehe Neuheiten
artiger oder rundlicher Belaubung und kopfartige,	- Postillon Siehe N. 1
gedrängte Blütenstände. 20–30 cm. VII-VIII — alpinum. Bildet schöne niedere Polster, leuchtend blau 0.50	Schmetterling Siehe N-1
- capitatum. Kopfartig gedrängte Blütenstände gelber	
Blumen	blühend
orientale. Grob rundliche Blätter und goldgelbe Blü-	—— alpinus. Niedr. Form, ockergell, color in 1997
ten. Sehr selten	(Alsine), I dill Kraut (aryonhyllaces a cos A
- tenuifolium. Mit feinem Laubwerk u. blauen Blüten 0.50	Titulze III. Ulchi. Poletono de la la
- Siehe auch halbhohe Stauden.	
Lithospermum, Steinsame, Borraginaceae O A	- graminifolia, Grasariige Belevi
— fruticosum (prostratum). Kleiner kriechender Strauch, mit lanzettlicher Belaubung u. dunkelblauen Blüten.	— juniperifolia. Dauerhafte u. gut wachsende Art. 15 cm 0.40 — laricifolia. Weiße Tenniche I. L.:
20 cm VII-VIII 0.70	— laricifolia. Weiße Teppiche kleiner Blüten. 15 cm 0.40 — linifolia. Scharfnadelige Balant 0.40
- Heavenly Blue. Hellblaue große Blüte. 20 cm 0.70	
— purpureo-coeruleum. Starkwachsende Art. dunkel- blaue Blüten. 30 cm V-VII 0.60	- Rosanii. Dichte, dunkelgrüne Polst., weiße Blüten. 15 cm 0.40 - sedoides (Cherleria). Rasenbildend, lanzettliche
Lotus, Hornklee, Leguminosae O A Q	
- corniculatus fl. pl. Gefülltblühende Abart des krie-	
chenden, gelben Hornklees. 20 cm VII-VIII 0.40	- verna. Schöne, grüne Polster bild., weiße Blüt. 10 cm 0.40 - fl. pl. Weiß gefülltblühende Form. 10 cm. Selten! 1.— Mitchella Robbitscher Robinscher Ro
Lychnis alpina. Siehe Viscaria alpina.	The state of the s
Lysimachia, Goldmünzkraut, Primulaceae O-0 \approx \text{\ti}\text{\texic}\tex{\text{\texi{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text	Poris. Immergrune, rundovale general. Divid
— nemorum. Kriechende Art, Blätter eiförmig, Blüten dottergelb. 5 cm V-VIII 0.40	Districted tige, weige Dilitchen 10 am 111 111
— nummularia. Kriechend, Blätter stumpfrundlich. Blü-	Millella, Dischotskappe Savitragassas
ten groß, goldgelb. 5 cm V-VII 0.30	oddioscolis, itricenende Phanas
— — aurea. Goldbuntblättrige Form. 5 cm. V-VIII 0.50	und aufrechten Trauben kleiner, gelblicher Blütten. 15 cm V-VI 0.40
— phyllocephala. Siehe Neuheiten	
Maianthemum, Schattenblümchen, Liliaceae D- A — bifolium. Mit kriechenden Rhizomen und herzeiför-	Modification of the state of th
migen Blättchen, kleine, weiße, duftende Blüten in	
Träubchen 10 cm	schönem Kontrast zu der hellgrünen moosarrigen




Dianthus spiculifolius



Primula Juliae

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ ∧	1 St.
Moltkia, Borraginaceae ○ △	Aus den Hochgebirgen Nord- u. Zentral-Amerikas	RM
- Doerfleri, Alpine mit knoll. Wurzelstock u. leuchtend	stammend, sind sie wegen ihrer großen Bedürfnis-	
blauen Blütenbüschel. Außerordentl. reichblühend	losigkeit u. ihrer bizarren Formen für Böschungen.	
und sehr hart. 20 cm VI-VII 1.50	Felspartien u. Trockenmauern ein sehr schätzbares	
petraea. Halbholzige Pflanze mit himmelblauen Blüten	Material. Im Winter genügt eine Deckung mit	
in traubigen Köpfen. 15-20 cm V-VI 1.20	Tannenreisig. Samtliche Opuntien eignen sich auch	
Morina. Siehe mittelhohe Stauden.	vorzüglich als Topf- und Schalenpflanzen.	
Mühlenbeckia. Siehe unter Felsensträucher.	10-30 cm VI-VII	
Myosotis, Vergißmeinnicht, Borraginaceae ○ △	Wir liefern ein feines Sortiment mehrgliedriger	
— alpina superba. Leuchtend blaue Blüten. 10 cm 0.40	Pflanzen von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl	
— olympica. Niedliche, kleine Büsche bildend, himmel-	zu RM 68.—, 25 Stück zum 100 Stück-Preis.	
blaue Blumen. 10 cm V-VII 0.40	— arborescens. Siehe Neu- und Seltenheiten	3.—
- palustris Graf Waldersee ○ ≅ Leuchtend dunkel-	dictional Lingelli. Zierliche Art, rundl kurze Glieder	
blau, sehr reichblühend. 30 cm V-IX 0.40	Blüten gelb	1.—
- Perle von Ronnenberg. Große dunkelhimmelblaue	arizonica Griff. Siehe Neuheiten brachiathra. Gelbe Blüten, walzenförmige Glieder brachyclada rosea. Plant	3.—
Blüten, kräftig., straffer Wuchs. 40 cm. V-IX 0.40	Diddifforday 1030d, Dillmen karmanaga 1	000
— Thüringen. Siehe Neuheiten 0.70	Dial Notal N	000
Rehsteineri (caespitosa). Zwergiges, dichtrasiges Pflänzchen mit himmelbl. Blüten. 2 cm V-VII 0.70		
— rupicola. Kugelrunde Büsche und herrlich dunkelultra-	Tailod Carricosidillilled Trails Dist	000
marinblaue Blumen. 10 cm V-VI 0.40		
Nepeta, Blauminze, Labiatae ○ ∞ △ ::	The state of the s	0.00
— grandiflora. Herzförmige Belaubung und lilarote Blü-	- orbicularis Blitten di la	0.90
ten. 30 cm VI-IX 0.40	Dallidd, Hellgelb mit grinlid - C1:	000
- Souvenir d'André Chaudron. Abart der Nepeta		
grandiflora mit überaus groß. Blum. v. schöner, blau.		
Farbe. Sehr guter Dauerblüher. 35 cm VI-IX 0.40		
- hybr. Six Hills Giant. Siehe Neuheiten 0.60		
- kokanica. Rundliche, graubehaarte Blättchen und lila		
Blüten. 25 cm VII-VIII 0.50 — Mussinii. Den ganzen Sommer blühende Staude mit		
silbergrauer Belaubung und blauen Blütenrispen.	- grandifl. Engelmann, Siehe Neuk-	0.90
Sehr empfehlenswert. 20 cm VI-X 0.30		
— — superba. Mit dunkelblau. Blüt. 20 cm V-VII 0.30		
- nervosa. Siehe Neuheiten	January Brumen	000
Nierembergia, Weißbecher, Solanaceae O A	dicariodita. Pitt Stacheln dicht herrichet	000
- rivularis. Frischgrüne Belaubung mit großen, weißen		
Trichterblüten. 15 cm VI-IX 0.60		
Oenothera, Nachtkerze, Oenotheraceae O A		
— caespitosa (marginata). Mit großen, weißen Blüten.	- humilis. Bräunliche, walzenförmige Clied	0.90
20 cm VII-IX 0.60		
- linearis. Siehe Neuheiten		
- missouriensis. Von kriechendem Wuchs mit prachtvoll.,		
außerordentlich großen, schwefelgelben Blumen. 20 cm VII-IX 0.40	Polyadamina, Octob Dillien, Stark backs challe (1)	000
— Nuttallii. Zierliche, schmalblättrige Art mit goldgelben	The state with the state of the A-t	000
Blüten. 20 cm. Selten! VII IX 0.80	The state of the s	
- pumila (pusilla). Rosettenbildend; in kleinen, gelben	fäden rot	
Rispen blühend. 20 cm VI-VII 0.40	I did by the deliber billion storle back- 1 1/	000
Omphalodes, Gedenkemein, Borraginaceae 🕒 🗅 🛆		
- cappadocica. Blüten prächtig blau, einem riesigen		
immergr. Vergißmeinnicht ähnl. 20 cm IV-V 0.60		
- lusitanica (nitida). Mit großen, lanzettlichen Blättern		
und leuchtend blauen Blüten. 20 cm. IV-V 0.60		
 verna. Kriechend Staude mit eiförmigen Blättern und vergißmeinnichtart., blauen Blüt. 10 cm IV-VI 0.40 	— salmonea, Länglicheirunde Glieder Plive	0.90
—— alba. Reinweiß blühende Abart der vorigen.		
10 cm IV-VI 0.40		
Ononis, Hauhechel, Leguminosae ○ △		
- spinosa. Halbstrauchige, stachelige Pflanze mit prächtig		
rosaroten Schmetterlingsblüt. 30-40 cm VII-IX 0.50		
Onosma, Lotwurz, Borraginaceae ○ ∞ △ VI-VIII		
- albo roseum. Mit weißlichrosa Blüten. 20-30 cm . 0.80	— xanthostemma gracilis Blitten belli	0.90
- cassium. Rauhborstige, steife, graugrüne Steppenpfl.		
mit nickenden, weißen Blüten. 20-30 cm 0.80		
— helveticum. Gelbblühend. 20-30 cm 0.80		
— sericeum. Silbergraue Belaubung, gelbe Blüten 0.80	i osca, Diaten Iosakarmin	000
— stellulatum. Große gelbe Blüten. 20-30 cm 0.80	I — rubra. Blüten leuchtend rot	. 0.90

Origanum, Majoran, Labiatae O OO A	Pentastemon Roezlii, Aufrechtwachsende Art mit schar-
officinarum compactum. Würzige Pflanze mit rundl.	lachkarminroten Blüten. 30 cm VI-VII 0.80
Laubwerk u. rosalila Blüten. 15–25 cm VII-IX 0.50	Phlox, Teppichphlox, Polemoniaceae ○ △ : □
	Meist kriech. Stauden mit nadelförmig. od. kleiner,
Orobus. Siehe Lathyrus.	
- lathyroides. Siehe Vicia.	länglichrundlicher, fast immergr. Belaub. u. stern-
Othonopsis, Fettkreuzkraut, Compositae O O A	förmig. Blüten, unter denen das Laubwerk im Früh-
- cheirifolia. Dickfleisch., graugrüne Belaub. mit herrlich	jahr verschwindet. Sollten in keinem Garten fehlen.
goldlackartigen, gelben Blumen. 30 cm VII-VIII 0.80	— adsurgens. Siehe Neuheiten
Oxalis, Sauerklee, Oxalidaceae 🕽 – 🖭	- amoena. Von kräftigem Wuchs mit schmaler, lanzettl.
acetosella. Dreizahlige kleeartige Blätter und weiße	Belaubung u. leuchtend karminroten Blüten. 20 cm 0.40
71.	— Douglasii hybrida. Bildet feinbelaubte, dichte runde
	Polster, die auch im Winter grün bleiben. Die röt-
- rosea. Sehr schön, rosablühend. 10 cm V-VI 0.50	lichlila Blüten erscheinen in großen Massen und
Oxytropis, Fahnenwicke, Leguminosae O OO A	erinnern stark an Aubrietien. 5 cm . IV-V 0.50
- argentea. Samtigsilberweiße Blättchen, rote Blüten.	— hybr. Cecil Davis. Siehe Neuheiten 0.80
10 cm VI-VIII 0.50	— ovafa. Kleine, eiförmige Blätter und rosarote Blüten.
— campestris. Gefiederte Blätter u. hellgelbe Schmetter-	10 cm V-VI 0.50
lingsblüten. 10 cm VI-VII 0.50	— saxatilis. Leuchtend rosa Blüten. 5 cm . V-VI 0.50
- montana. Dichtwüchsig, blaugrün belaubt, purpurne	- stellaria. Unter den Teppichphloxen die schnellwach-
Blüten. 10 cm VI-VIII 0.50	sendste Sorte mit großen, hellschieferblauen
Pachysandra, Ysander, Euphorbiaceae 🕦 – 🚳	Blüten. 15 cm IV-VI 0.40
- terminalis. Immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Be-	— subulata (setacea) atropurpurea. Polsterbildend,
laubung; Blüten weiß. 20 cm V-VI 0.50	purpurfarbene Blüten. 15 cm IV-V 0.40
- fol. var. Weißbunte Art. 20 cm VI-VII 0.70	— Brightness. Dunkelrosa, Mitte karmin. 15 cm 0.40
Papaver, Zwergmohn, Papaveraceae ○ △	Camlaensis. Die großen, dunkelrosa Blüten er-
- alpinum. Alpenpslanze mit kleinen Blüten, in Farben	scheinen in großen Mengen. 15 cm IV-V 1
wie nudicaule. 10 cm VI-VII 0.40	— — Daisy Hill. Karminpurpur. 15 cm IV-V 0.50
- nudicaule. Sibirischer Mohn. Eine sehr beliebte	— Fairy. Blaßlila, purpurne Mitte, spätbl. IV-V 0.50
Pflanze mit mittelgroßen, schalenförmigen Blumen	- G. F. Wilson. Schieferblaue Blüten, ungemein reich-
auf drahtartigen, festen Stielen, sehr reichblühend	blühend. 15 cm IV-V 0.40
in den Farben: weiß, gelb, orangerot. Sehr wert-	— — Leuchtsfern. Leuchtend lachsrosa, kleine Blüten in
voll für Steingärten. 30 cm IV-IX 0.40	reicher Fülle auf dichten Polstern IV-V 0.60
- nudialpinum. Ein Bastard von P. alpinum u. nudicaule	- Lilakönigin. Reichblühend, dichte Polster mit hell-
mit zerschlitzter Belaubung und großen Blumen.	lila, dunkler geaugten Blüten. 10 cm . IV-V 0.50
Feines Farbspiel. 30 cm IV-IX 0.40	— Maischnee. Sehr reichblüh. u. großblumig, schnee-
- rupifragum. Seidenborstige Belaubung und ziegel-	weiß, frischgrüne Polster bildend. 10 cm IV-V 0.50
rote Blumen. 30 cm VI-VIII 0.50	- Morgenstern. Mit zahlreichen weißen, im Zentrum
Paronychia, Mauerraute, Cariophyllaceae ○ △ △	rot gesternten Blumen. 15 cm IV-V 0.60
- argentea. Silberwollige, kleine rundliche Blättchen	— Moerheimii. Sehr kompakter Wuchs. Aufrecht-
und weiße Blüten. 5 cm V-VI 0.40	wachsende Blütenstiele mit großen leuchtend kar-
- kapela. Kleine, rundliche, blaugrüne Belaubung und	minroten Blumen. 15 cm IV-V 0.50
silberköpfige Blüten. 5 cm V-VI 0.40	— Nelsonii. Bläulichweiß mit lila Auge IV-V 0.50
Patrinia, Goldbaldrian, Valerianaceae () \triangle	— nivalis. Schneeweiße Blüten. 10 cm. IV-V 0.40
- triloba. Handförmig geteilte Blätter und duftende	— Ronsdorfer Schöne. Leuchtendes lachsrosa, die
goldgelbe Blütenrispen. 25 cm VI-VII 0.60	Mitte haltend zwischen Brightness und Vivid.
Pelargonium Endlicherianum. Siehe Neuheiten 1.50	Kräftig und gesund wachsend. 10 cm. IV-V 0.60
Petasites, Winterheliotrop, Compositae	- rosea. Starker Wachser von feiner, karminrosa
fragrans. Rundliche, frischgrüne Belaub. u. nach Vanille	Färbung. 15 cm IV-V 0.40
	— Rotkäppchen. Siehe Neuheiten 0.80
duftende purpurrosa Blüten. 30 cm . I-II 0.70 Pentastemon, Bartfaden, Scrophulariaceae ○ △	- Samson. Große, tiefrosa Blumen, deren Mitte
Teils aufrechte, teils kriechende Büsche bildende Stauden mit großen, rispenständigen Lippenblüten.	karminrot ist. 15 cm IV-V 0.80 — Schneewittchen. Reizend, polsterbildend, frisch-
- arizonicus. Hellpurpurne Blütenglocken, saftiggrüne	grüne Belaubung und kleine schneeweiße Blüten,
Belaubung. 25 cm VI-VIII 0.50	unter denen das Laub vollständig verschwindet.
confertus. Herrliche Felsenpflanze mit großen, violetten	10 cm
Blütenrispen. 30 cm VI-VII 0.50	- Sensation. Leuchtend rosarote Blumen IV-V 0.50
— Davidsonii. Hübsche, kriechende Art aus Nordamerika	- Sternteppich. Überschüttet mit sternförmigen, lila-
mit purpurblauen Blüten. 15 cm V-VI 0.80	blauen Blüten. 15 cm IV-V 0.50
glaucus. Ovalrundliche, dunkelgrüne Belaubung und	- Sprite. Karminrot m. dunkl. Auge. 15 cm IV-V 0.40
	- Vivid. Leuchtend weinrot, eine herrliche Farbe.
violettpurpurne Blüten. 30 cm VI-VII 0.50 — stenosepalus. Blätter tiefgrün, polsterartig. Blüte	
purpurent goodent 30 am VVI 050	
purpurrot, geadert. 30 cm V-VI 0.50	Phlox, Frühjahrs-Zwergphlox, Polemoniaceae O A
Hallii. Siehe Neuheiten	Aufrechte, kleine Büsche bildend. Große Blüten-
heterophyllus, Lavendelblau, rosa getuscht. 30 cm 0.50	dolden auf festen Stielen V-VI
Jamesii. Nadelartige Blättchen, große purpurrosa	- divaricata canadensis. Reinlilablaue Blütendolden
Blütenrispen. 10 cm VI-VII 0.60	auf ca. 20 cm hohen Stielen
Menziesii. Kriech., purpurrosa Blüt. 10 cm VI-VII 0.70	— Küppelstein. Leuchtend violettdunkelblau. 20 cm. 0.50
- Scouleri. Halbstrauchige Art, lila Lippenblüten.	— Laphamii. Starkwüchsig, violettblau, 30 cm 0.50
30 cm VI-VII 0,60	— Müngsten. Verbesserte Phl. Laphamii Var., pracht-
pubescens. Prächtige Pflanze mit großen weißlila	voll leuchtend blau. 20 cm 0.50
Blütenglocken. 30 cm VI-VII 0.40	- Schaberg. Große Blüten von zartwasserblauer
pygmaeus. Zwergform von voriger. Sehr schöne u.	Färbung, gut sich abhebend von den Farben aller
interessante Steinstaude, lila Blüt. 15 cm VI-VII 0.50 1	anderen Varietäten. 30 cm



Ausschnitt aus einem Staudengarten



Teilansicht eines Steingartens




Zwergkoniferen im Steingarten



Berberis Wilsonae im Steingarten



Crucianella stylosa



Edraianthus pumilio



Campanula Portenschlagiana



Ramondia myconii



Aubrietia tauricola




Aster dumosus hybr. in Sorten



Cotyledon spinosa

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Primula, Primulaceae (1) \(\text{Sie gehören zu 1} \)
Phlox divaricata (Fortsetzung)	Scholisten Schmuck unserer (Tarten ()has a Stant
Schloß Burg. Farbe ähnlich der vorigen, aber mit	ist ein Garten undenkbar. Alle lieben einen L
dunkelviolettem Auge. 20 cm 0.50	sen, redditen Doden. In Anbetracht, daß das an
— Schneeteppich. Mit reinweiß. Blütenständ., 20 cm 0.50	and ful still schon sehr groke Sortiment ichalid
- Violet Queen. Mit prächt., violetten Blumen. 20 cm 0.50	durch Nedeinfuhrungen und Neuzichtungen nod.
- pilosa. Schmale behaarte Blättchen und leuchtend rosa	wir insere Primal in 6 Al
Blütenrispen von lang anhaltendem Flor. 30 cm. 0.40	teilungen gegliedert, was die Auswahl wesentlich
— Altenberg. Malvenrosa, eigenartig schön. 30 cm 0.50 — Brillant. Leuchtend dunkelkarminrosa Färlung: von	
daniel da	1. Alpenprimel. Sie gehören zu den edelsten Gebilden
großer Wirkung. 30 cm	der Alpenflora. Es sind hier, mit wenigen Ausnahmen, nur typische Arten angeboten.
	— acaulis Gelbhiil D.1.
Phyteuma, Teufelskralle, Campanulaceae O - D A - orbiculare. Dunkelblaue, kugelrunde Köpfe.	— acaulis. Gelbblüh. Polsterprimel. 10 cm. III-V 0.40
35 cm V-VI 0.50	— hybrida. Reizende, reich- und frühblühende Primeln in prächtigem Farbenspiel. 10 cm III-V 0.40
Pirola, Wintergrün, Pirolaceae → • △	weike Abart mit malham A
- rotundifolia. Maiglöckchenartige, weiße Blüten, rund-	Promot Well petulit born TIT IT
liche lederartige Blätter. 20 cm VII-VIII 0.50	
Plantago, Silberwegerich, Plantaginaceae O O A	
- argentea. Lange, seidensilberige Belaubung. Ähren	
weißlich. 20 cm V-VI 0.60 — nivalis. Weißfilzige Rosetten, sehr eigenartig.	
25 cm V-VI 0.60	
Plumbago. Siehe Ceratostigma.	
Poa alpina, Siehe Ziergräser.	— Croussei pl. Gefüllt, lilarot mit feinem, weißen Saum. 10 cm — lilacina, Kurz gestielte III 6 1 IV-V 0.80
Polemonium, Sperrkraut, Polemoniaceae ○ △	
- reptans. Kriechend, dunkelgrüne Belaubung und blaß-	— — — pl. Dicht gefüll., lilafarb. Blüt. 5 cm. IV-V 0.50
blaue Blüten. 25 cm V-VII 0.50	— sanguinea plena. Rot gefüllt. 5 cm. IV-V 0.80
— superbum. Mit dunkelviol. Blüt. 25 cm. V-VII 0.50	— sulphurea plena. Gelb gefüllt. 5 cm IV-V 0.80 — auricula. Echte Alpenauril 1
Polygala chamaebuxus. Siehe Zwerggehölze.	
Polygonum, Alpenknöterich, Polygonaceae O-1 A	köstlichem Wohlgeruch. 10–15 cm. V-VI 0.60 — Clusiana. Derbe, kleine Blätter und purpurrosa Blüten. 10 cm.
- affine. Rasenbild., Blätter lanzettlich, Ähren leuchtend	ten. 10 cm
rosa, 15 cm, sehr schöne Felsenpflanze. VIII-X 0.40	
superbum. Kräftiger wachsende Form und größere	ten. 20 cm
intensiver gefärbte Blumen. 20 cm VIII-X 0.50	
— — sphaerosfachyum. Die dichten, kurzen Blütenähren	farbene Blütchen. 10 cm² V-VI 0.50
sind von leuchtend karminroter Farbe. Sehr selten.	
30 cm VII-VIII 1.20	starkwüchsigste aller harten Primeln mit sehr gro- ßer Blattrosette. Die beben Die
- vaccinifolium. Heidelbeerblättriger Knöterich mit schö-	her Blattrosette. Die hohen Blütenstengel tragen
nen rosaroten Blütenrispen. 20 cm VIII-X 0.60	große Büschel stark duftender schwefelgelber Blumen. 40 cm
Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △ Niedrige, teils	- frondosa Einer kräftig wachsenden Mehlprimel der
polsterbildende Pflanzen mit kleinen erdbeerartigen Blättern und Blüten	Alpen und Moore ähnlich, mit zahlreichen Dolden kleiner rosa Blütchen 10 cm
- alba. Kräftig wachsend, mit großen, weißen Blumen.	kleiner rosa Blütchen. 10 cm – leucophylla, Achnlid Production V-VI 0.50
20 cm V-VI 0.40	
- alchemilloides. Fünf- bis siebenteilige, silbergraue	weißfilzigen Blättern. 10 cm
Blättchen und weiße Blüten. 10 cm V-VI 0.80	
- alpestris. Mit leuchtend gelben Blumen . V-VI 0.60	10 cm
— ambigua. Kriech., Blätter graubehaart, Blüt. goldgelb 0.40	- microdantha alpicola Mit - 11 · · · · III-IV 0.80
	innen bemehlten Blüten. 20 cm. VI-VII 0.80
— argentea calabra. Silbergraue Blätter mit hellgelben	
Blüten. 20 cm V-VIII 0.40	blauen, aurikelartigen großen Blumen. VI-VII 1.— minima. Zierliche Art mit 11.—
- chrysocraspeda aurea. Die niedrigen Polster sind	— minima. Zierliche Art mit kleinen rosa Blütchen.
dicht bedeckt mit leuchtend gelben, in der Mitte etwas dunkleren Blüten. 10 cm V-VII 0.40	3 cm
	— officinalis. Schlüsselblume, wohlriechend, mit großen
— aurantiaca. Siehe Neuheiten	gelben Kelchen. 20 cm III-IV 0.35 - rosea grandiflora. Früheste von allen mit herrlichen, leuchtend karmingsa Blüter von 6
insignis. Siehe Neuheiten	leuchtend karminrosa Blitte von allen mit herrlichen,
— nitida. Silberglänzende Laubteppiche, pfirsichrosa Blü-	einer glänzend saftiggrünen Blattrosette stehen.
ten. 10 cm. Selten VII-VIII 0.50	20 cm
— — alba. Mit weißen Blüten. 10 cm VII-VIII 0.50	— serratifolia. Kleiner, zierlicher Bastard mit karmin- purpurnen Blüten. 20 cm
— pedata. Frischgrüne Belaub., goldgelbe Blüten. 30 cm 0.50	purpurnen Blüten. 20 cm VI-VII 0.70
- pyrenaica. Kleine, aufstrebende Büsche bildend,	Stielen zartlile Bl. 20 Diatter; an langen
Blätter dreizählig, Blumen goldgelb Sehr reich-	Stielen zartlila Blumen. 20 cm V-VI 0.50
blühend. 15-20 cm VI-VII 0.50	Blumen, 30 cm
- Tonguei. Gelb mit rötlichem Grund. 20 cm VII-VIII 0.60	- Späthiana, Eine Kreuzung - 1 7 VI-VII 0.60
tridentata. Dreiteilige Blätter, weiße Blüten. 10 cm. 0.50	Primula Sibthorpii mit leuchtend lilaroten Blumen
- verna. Niederliegend, gelb. 10 cm IV-V 0.40	in grober Fill 10

Speciabilis, Sakini leauktend lilarot. 10 cm. V-VI. Q.O. Wordell. Stark gezähnte Belaubung, illarote Biltendellen	Primula (Fortsetzung) . 1St.	Primula denticulata (Fortsetzung) 1St.
Wordei. Stark gezähnte Baubung, Blarche Blüten- bloden. 10 cm. — 1111 V. 1. 2. Erlagenprimel. 3 ⊆ Sie sind durchweg dissensiechen bler japanischen Ursprungs, haben ca. 20 cm lange Geuchten Pilkten gedishen sie aut in sonoiger Lage noch sehr gut. 30 – 40 cm. — V.I.VII Beessina. Bringt im Friiksomer eine Masse leud- tender. sammetpurpurner Blumen an straffen SKeugslen. — in high gebruchten sie aut in sonoiger Lage noch sehr gut. 30 – 40 cm. — V.I.VII Beessina. Bringt im Friiksomer eine Masse leud- tender. sammetpurpurner Blumen an straffen SKeugslen. — in high gebruchten sie aut in sonoiger Lage noch sehr gut. 30 – 40 cm. — V.I.VII Beessina. Bringt im Friiksomer eine Masse leud- tender. sammetpurpurner Blumen an straffen Mischagel im Jerupur, von autsetsen ladernan sie der dunkelladskarmin Skeugslen. — in high gebruchten sie her der dunkelladskarmin Marian durch gerichten sie aut in sonoiger Lage noch sehr gut. 30 – 40 cm. — V.I.VII Sieboldii Beauty of Sala. Leuchtend rosarot, sehr größblung. — Co- Cordburtnans. Schwedwichsinge Art mit grazisisen Blumen and stark weighende von etn hierarus in den Blumen and stark weighende von etn hierarus in dunkelladskarmin Blumen and stark weighende von etn hierarus in Blumen and stark weighende von etn hierarus in dunkelladskarmin Blumen and stark weighende von etn hierarus in Blumen and stark weighende von etn hierarus in dunkelladskarmin Blumen and stark weighende von etn hierarus in Blumen and stark weighende von etn hierarus in durch großblung von Gardenpflieden Schaffen froßblung et Co- Coduburiana. Schwedwichten Bastard von Primala Jake und Primala gedelten sie sam leichtesten. 10 – 20 cm. — IIII-V pruboniciana (Helenae). Herrlicher Bastard von Primala Joha und Primala gedelten sie am leichtesten. 10 – 20 cm. — IIII-V pruboniciana (Helenae). Herrlicher Bastard von Primala Joha und Primala gedelten sie am leichtesten. 10 – 20 cm. — IIII-V pruboniciana (Helenae). Herrlicher Bastard von Primala Joha und Primala gedelten sie am leichtesten. 10 –	- spectabilis. Schön leuchtend lilarot. 10 cm V-VI 0.70	— Rosamunde, Reinpurpurrosa 0.50
dolden. I) em	- Wardii. Lilafarbene, duft. Blumen. 30 cm V-VI 0.60	- cashmeriana. Blätter auf der Unterseite m. gelbem
2. Etagenprimel y ≅ ∆ Sis sind durchweg dinesishen oder jangsichen Usprungs, haben ca. 20 can large lauretitische Blätter und blüben in Etagen. An feudsten Plätzen gedeichen sie auch in sonniger Large noch sehr gut. 30 - 40 cm. VI-VII bergen noch sehr gut. 30 - 40 cm. VI-VII bergen noch sehr gut. 30 - 40 cm. VI-VII bergen noch sehr gut. 30 - 40 cm. VI-VII bergen noch sehr gut. 30 - 40 cm. VI-VII bergen noch sehr gut. 30 - 40 cm. VI-VII bergen noch sehr gut. 30 - 40 cm. VI-VII bergen noch sehr gut. 30 - 40 cm. VI-VII bergen noch sehr gut. 30 - 40 cm. VI-VII bergen noch sehr gut. 30 - 40 cm. VI-VII bergen noch sehr gut. 30 - 40 cm. VI-VII bergen noch sehr gut. 30 - 40 cm. Mit sehr gut. 30	dolden. 10 cm	——— alba. Reinweiße Form
oder japanischen Ursprungs, haben ca. 20 cm lange lansettische Blätter auch bläben in Etagen. An Guden Pläten gelächen sie auch in sonniger Cheuden Pläten Geschafterungen bei Stangelb. Boessiana Von rahmgelb und kellorangegelb finden sie auch geschen sie auch statterungen bis zum dunkelsten orange, karmin und purpur, vom zartesten ladurosa bis dunkellackskarmin Die Farbe ist orange, aprikosen, scharlach Summanica. Karmen geschen sonniger Schatterungen bis zum dunkelsten orange. An der Schatterungen bis zum dunkelsten orange. An der Schatterungen bis zum dunkelsten orange. An der Schatterungen Schatten orange kapten der Schatterungen Schatten stauden zwecknäßig ist 20–30 cm. V-VII Sieboldi Beauty O Salo Leuchtend oranzot, schreiben Schattenstauden zwecknäßig ist 20–30 cm. V-VII Sieboldi Beauty O Salo Leuchtend oranzot, schreiben Schattenstauden zwecknäßig ist 20–30 cm. V-VII Sieboldi Beauty O Salo Leuchtend oranzot, schreiben Schattenstauden zwecknäßig ist 20–30 cm. V-VII Sieboldi Beauty O Salo Leuchtend oranzot, schreiben Schattenstauden zwecknäßig ist 20–30 cm. V-VII Sieboldi Beauty O Salo Leuchtend oranzot, schreiben Schattenstauden zwecknäßig en kauft zu Schatten von Schatten Schattenstauden zwecknäßig schatten von Schattenstauden zwecknäßig en kauft zu Schatten zu Schatten von Schatten schreiben Schattenstauden zwecknäßig en kauft zu Schatten von Schatten schatt	2. Etagenprimel ⊕ ≅ △ Sie sind durchweg chinesischen	— — "Rubin". Blütenbälle tiefrubinrot 0.60
Euchen Plätzen gedelien sie auch in somiger Lage noch sehr gut, 30 – 40 cm. V.IVII Beesiana. Bringt im Frühsommer eine Masse leuch- tender, samnetpurpurere Blumen an straffen Stengeln 40 Bulleesiana. Von rahmgelb und hellorangegell finden sich alle Schattierungen bis zum dunkehten orange, karmin und prupur, vom zarteisten lacharosa bis dund satranakinggell. Burmanica. Karmin mit orange Auge 0.60 Cockburniana. Schwachetheinge Art mit graziñsen hupferorangefarbenen Blitten Loperangefarbenen Blitten Herriches Farbeipiel von rot bis rosa u. weiß 0.50 pluverulenia. Ahmich Pr. japonica mit leucht. roten Blumen auf stark weißneibig bepuderten Stengela 0.50 Siva Iaroucana. Kupferiget Som Blumen auf stark weißneibig bepuderten Stengela 0.50 Siva Iaroucana. Kupferiget Som Pubmigen Gartenprimel. Das besonders frischigfüne sonders wertvoll. Von allen Primeln gedelben nie am leichtesten. 10 – 20 cm. 111-17 pruhoniciana (Helonae). Herrichere Bastard von Primula Juliae mit Urenula acaulis mit großen Hähroten Blumen Primula Juliae und Primula acaulis mit großen Hähroten Blumen Primula Juliae und Primula acaulis mit großen Hähroten Blumen 0.40 Arno von Oheimb. Santig dunkelpurpur 0.55 Brack Berner Siele Nacheiten 0.50 Gardenglück. Karminoran mit hellvoitet 0.50 Odergruß, Amasarutor, sehr gefühlung 0.50 Gardenglück. Karminoran mit hellvoitet 0.50 Schleesierkind. Leuchtend violett, sehr großbulmig 0.40 Gardenglück. Karminoran mit bellvoitet 0.50 Schleesierkind. Leuchtend violett, sehr großbulmig 0.40 Gardenglück. Karminoran mit hellvoitet 0.50 Golfelsien, handen ein 19 den der der den der	oder japanischen Ursprungs, haben ca. 20 cm lange	- Mooreana. Leuchtend blauviolett, großblumig 0.70
Lage noch sehr gut. 30-40 cm. VI-VII Beessiana. Ringig in Früiknomer eine Masse leuchtender, sammetpurpurer Blumen an straffen Stengele. A. Code Bulleessiana. Von rahmgelb und helloranegeglib finden sich alle Schattierungen bis zum dunkelbein orange, karmin und purpur, vom zarteten lachrona bis dan kallachskarmin von generaten lachrona bis dan den stantakningelb 0.55 Bulleyana. Die Farbe ist orange, aprikosen, scharlach den generaten lachrona bis dan den stantakningelb 0.55 juponica. Herrilicher Farbspiel von rot bis rosa u. weiß 0,55 juberulenda. Abulich Pr., japonica mit beucht, roten Blumen auf stark weißnehlig bepuderten Stengeln 0,50 Red Hught. Leuchtend scharlachrote Blumen 0,50 Silva Taroucana. Kupferigrot 0.65 Silva Taroucana. Kupferigrot 0.65 Silva Taroucana. Kupferigrot 0.65 Blumings Gartenprimel. Das besonders friesdegfüne Laub, welches im zeitigen Früishar unter einen Blumensisen verselwindet, macht diese Art be- sonders wertvoll. Von allen Primeln gedeiben sie am leichtseten. 10-20 cm. 111-17 prulponiciana (releane). Herrilicher Bastard von Blumen auf stark weißnehe sich generaten verselber betreiten besteht verselber betreiten besteht verselber besteht	lanzettliche Blätter und blühen in Etagen. An	rietäten gehören ihrer großen Farbenpracht und
Doesiana. Bringt im Frühsommer eine Masse leudstender, sammetpurpuren Blumen an straffen Stengeln . O.40 Bullessiana. Von rahmgelb und hellorangegelb finden sich alle Schattferungen bis zum dunkelsten orange, dunkeltakskarnin . O.50 Bullewana. Die Parhe ist erange, aprikosen, scharladi und artamakinggelb . O.50 Burmanica. Karmin mit orange Auge . O.60 Cockburniana. Schwachwichsige Art mit graziissen kupferorangefarbenen Blitten . O.50 pulverulenta. Ahnlich Pr. japonica mit leucht roten Blumen auf stark weinbenig beparteren Stengeln 0.55 pulverulenta. Ahnlich Pr. japonica mit leucht roten Blumen auf stark weinbenig beparteren Stengeln 0.55 Sik Issanprimel 9 ≅ ∆ Sie entstaamen mist einer Kseugung von Primala Juliae mit unserer großigen Haroten Blumen . O.60 Sik Kissen vertvoll. Von allen Primela gedelhen sie am leichstetsen. 10–20 cm . III-1V pruhoniciana (Helenae). Herriiches Bastard von Primala Juliae mit unserer großigen Haroten Blumen . O.60 Edelstein. Siehe Neuheiten . O.50 Juliae Blumen . O.60 Frühlingszauber. Lihrot . O.50 Jurel Leuchtend rötlich magenta . O.50 Marjanne. Eine Kissenprimel, bis der jedoch die leucht, purpursete Blitten, wie bei den bekannten Gartenprimel, in Delden auf kurzen Stellen stelen . O.50 Schnecksiksen. Von hellveilchenblauer Farbe . O.50 Marjanne. Eine Kissenprimel, bis der jedoch die leucht, purpursete Blitten, wie bei den bekannten Gartenprimel, in Delden auf kurzen Stellen stelen . O.50 Schnecksiksen. Von hellveilchenblauer Farbe . O.50 Schnecksiksen. Von hellveilchenblauer Farbe . O.50 Schnecksiksen. Von einweiger Farbe . O.50 Schnecksiksen. Von einweiger Farbe . O.50 Schnecksiksen. Von heldveilchenblauer auf o.50 Schnecksiksen. Von einweiger Farbe . O.50 Schnecksiksen. Von einweiger Farbe . O.50 Schnecksiksen. Von heldveilchenblauer Farbe . O.50 Schnecksiksen. Von einweiger Farbe . O.50 Schnecksiksen. Von heldveilchenblauer Farbe . O.50 Schnecksiksen. Von einweiger Farbe . O.50 Schnecksiksen. Von einweiger Farbe . O.50 Schnecksiksen. Von einweiger Farbe . O.50 Schnecksiksen.	Lage noch sehr gut. 30-40 cm VI-VII	Reichblütigkeit wegen, zu den schönsten all. Primeln.
Stengeln Sulleesiana. Von rahmgelb und hellerangegelb finden sich alle Schattferungen bis zum dunkelsten orange, karmin und purpur, vom zartesten lachtroan bis dunkellachskarmin O.50 Bulleyana. Die Farbe ist orange, aprikosen, scharlach und arstnankingelb O.50 Cockburniana. Schwachwüchsige Art mit graziosen kupferorangefarbenen Bilten Nophorica. Herrilches Farbspiel von rot bis rosa u weiß O.50 jeponica. Herrilches Farbspiel von rot bis rosa u weiß O.50 poponica. Herrilches Farbspiel von rot bis rosa u weiß O.50 Aumenn auf stark weißmehlig bependerten Stengela O.50 Rissenprimel ② ≥ △ Sie enstatammen meist einer Kreundenan. Kupfer den Frinkla Juliae mit unserer groß- blunigen Grown Frinkla Juliae mit unserer groß- blunigen Grown Frinkla Juliae mit unserer groß- blunigen Grown Brimals Juliae mit unseren groß- blunigen Grown Brimals Juliae mit unseren groß- blunigen Grown Brimals Juliae mit grown Brimals Juliae der Grown Brimals Juliae der Grown Brimals Juliae grown Brimals Juliae groß- Blunie Brimals Juliae g	Beesiana. Bringt im Frühsommer eine Masse leuch-	
Bulleesiana. Von rahmgelb und hellorangegelb finden sich alls Schattierungen bis zum dunkelstan orange, karmin und purpur, vom zartesten lachsroas bis dunkellachskarmin (2.50). Bulleyana. Die Parhe ist orange, aprikosen, scharlach und aztranahinggelb (2.50). Burmanica. Karmin mit orange Aug. (2.60). Cockburnians. Schwachwichsige Art mit graziösen kupferorangefarbenen Blüten (2.50). paponica. Herriches Farbepiel von rothis rosa u. weiß 0.50. pulverulenta. Ahnlich Pr. japonica mit leucht, roten Blumen auf tark weißenbeilg bepaderten Stengeln 0.50. Red Hugh. Leuchtend scharlachrote Blumen (2.60). Sikssenprimel (2.20) ≥ is enstaamen meist einer Kreuzeng von Primula Juliae mit unserer großhlumig en schere vertroll. Von allen Primela gedichen sie mei Blumen allen er einem Blumenskinen verschwindet, macht diese Art besonders wertvoll. Von allen Primela gedichen sie Blumen blumen allen er einem Blumen kinsen verschwindet, macht diese Art besonders wertvoll. Von allen Primela gedichen sie Blumen blumen allen er einem Blumen kinsen verschwindet, macht diese Art besonders wertvoll. Von allen Primela gedichen sie Blumen blumen allen er einem Blumen blumen er einem Blumen blumen er einem Blumen er großhlumig der der blumen der klausen verschwindet. Mehre der her blumen (2.60) and gedich sie eine Primula acadis mit großen Eleuthen der blumen (2.60) and gedich sie eine Primula acadis mit großen Eleuthen weißen bekannten Elliaret (2.60) auf eine Blumen (tender, sammetpurpurner Blumen an straffen	mit Farnen oder sonstigen, belaubten Schatten-
ach alle Schattferangen bis zum dunkelsten oranges karman und purpur, vom zartesten lachersoa bis Bulleyana. Die Parbe ist orange, aprikosen, scharlach und artinankingelb (1988)	Bulleesiana. Von rahmgelb und hellorangegelb finden	stauden zweckmäßig ist. 20-30 cm . V-VII
karmin und purpur, vom zartesten lachsroas bis dunkellakskarmin vom Gerken vertrolle vom Silvardinakskardin vom Schneckten Parke ist orange, aprikosen, scharlach und zartnankingselb 0.50 Burmanica. Karnain mit orange Auge 0.60 Cockburniana. Schwachwichsige Art mit graziosen kupferorangefarbenen Blüten 0.50 pulverulenta. Almich Pr. japonica mit leucht. roten Bemen auf stark weijnehig bepuderten Stengeln 0.50 pulverulenta. Almich Pr. japonica mit leucht roten Bemen auf stark weijnehig bepuderten Stengeln 0.50 Silva Industrial pulme in timerer großibumigen Gartenprimel Das besonders frischgrüne Blümen 0.60 Silva Industrial pulme in timerer großibumigen Gartenprimel Das besonders frischgrüne Blümen 0.60 Silva Industrial pulme in timerer großibumigen Gartenprimel Das besonders frischgrüne Blümen 0.60 Silva Industrial pulme in timerer großibumigen Gartenprimel Das besonders frischgrüne Blümen 0.60 Silva Industrial pulme 111-14 pruhoniciana (Helenae). Herrlicher Bastard von Primuls Juliae with Primuls acausil mit großen lilaroten Blumen 0.60 Arno von Oheimb. Santig dunkelpurpu 0.50 Blaukissen. Von hellveilchenblauer Farbe 0.50 E. R. Jennes. Siehe Neubeiten 0.50 Gardenglück. Karminrota mit gelber Mitte 0.50 Juwel. Leuchtend röllich magenta 0.50 Lebensfreude Karminrota mit gelber Mitte 0.50 Magenta. Tiefdunkles, sammetartiges karmiosinrod 0.50 Miss Mac Gilovyt. Likrot Missen. Santig dunkelvie Blüten 0.50 Schleeskriken 1. Eune Kissenprimel, bei der jedech die leucht. purpurroten Blüten 1. 0.50 Magenta. Tiefdunkles karmiosinrod 0.50 Schneekkissen. Nom zie dunkelvie Blüten 0.50 Schneekkissen. Von reinweiliger Farbe 0.50 Schleeskriken 1. Eunektien 0.50 Schneekkissen. Von reinweiliger Farbe 0.50 Schleeskriken 1. 20-30 cm 111-14 (111-14) Schneeper 1. 20-30 cm 111-	sich alle Schattierungen bis zum dunkelsten orange,	
— Gartendirektor Steffen. Großblumig, leucht. roas 0.05 Burmanica. Karmin mit orange Auge. Cockburniana. Schwachwichsige Art mit graziisem kupferorangefarbenen Blüten. Spaponica. Herrilches Farbspiel von rot bis rosa u. weiß o.50 pulverulenta. Ähnlich Pr. japonica mit leucht. roten Blumen and stark weißnehig bepunderen Stengeln. Silva Iaroucana. Kupferigort. O.60 Silva Iaroucana. Kupferigort. O.60 Siksarprimel № ≦ △ Sie enstammen meist einer Kreszuang von Primula Juliae mit unter einem Blumenkissen verschwindet, macht diese Art besonders wertvoll. Von allen Primele Bediens is en elicitesten. 10−20 cm. Primula Juliae und Primula acaulis mit großen Blilaroten Blumen. Arno von Oheimb. Santig dunkelpurpu. O.50 E. R. Janes. Siehe Neubeiten. O.60 Gartenglück. Karminor mit gelber Mitte. O.50 Gartenglück. Rarminor mit gelber Mitte. O.50 Marjanna. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimel, in Dolden auf kurzen Stielen stehen. O.50 Marjenha. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimel, in Dolden auf kurzen Stielen stehen. O.50 Marjenha. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimel, in Dolden auf kurzen Stielen stehen. O.50 Marjenha. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimel, in Dolden auf kurzen Stielen stehen. O.50 Marjenha. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, vie bei den bekannten Gartenprimel, in Dolden auf kurzen Stielen stehen. O.50 Marjenha. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, reichblühend o.50 O.50 O.50 Marjenha. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, reichblühend o.50 O.50 Marjenha. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, reichblühend o.50 O.50 Marjenha. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, reichblühend o.50 O.50	karmin und purpur, vom zartesten lachsrosa bis	— Daphnis, Lebhaft rot mit weißem Auge
ourd zatrankingselb Durmanica. Karnin mit orange Auge Oco-Cockburniana. Schwachwichsige Art mit graziesen kupferozangefarbene Bläten Diponica. Herrliches Farbypiel von rot bis rosa u. weiß 0.50 japonica. Herrliches Farbypiel von rot bis rosa u. weiß 0.50 pulverulenta. Ahnlich Pr. japonica mit leucht. roten Blumen auf stark weißmehig bepuderten Stengeln 0.50 Red Hugh. Leuchtend scharlachrote Blumen Kreuzung von Primula Juliae mit unserer groß- blumigne Gartenprimel 0 ≥ 6.50 Silva Jaroucana. Kupferigrot Kissenprimel 0 ≥ 6.50 Silva Jaroucana. Kupferigrot Kreuzung von Primula Juliae mit unserer groß- blumigne Gartenprimel 1 ≥ 6.50 Elaub, welches im zeitigen Frühjahr unter einem Blumen Gartenprimel. Das besonders frischgrüne Laub, welches im zeitigen Frühjahr unter einem Blumen Herrlicher Bastard von Primula Juliae mit unserer groß- blumigne Gartenprimel. 20 cm III-IV pruhonicians (Helenae). Herrlicher Bastard von Primula Juliae mit unserer groß- blaukisen. Veimb. Santig dunkelpurpur 0.50 E. Baukkisen. Veimb. Santig dunkelpurpur 0.50 E. Baukkisen. Veimb. Santig dunkelpurpur 0.50 E. Baukkisen. Veimb. Santig dunkelpurpur 0.50 E. Gartenplück. Karamirot mit gelher Mitte 0.50 Frühlingszauber I.I.I.pur 0.50 Gartenplück. Rarminota mit gelher Mitte 0.50 Marjanne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurvoten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimel, in Dollen auf kurzens Stielen stehen 0.50 Marjanne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurvoten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimel, in Dollen auf kurzens Stielen stehen 0.50 Marjanne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurvoten Blüten, eichblühend 0.50 Marjanne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurvoten Blüten, eichblühend 0.50 Marjanne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurvoten Blüten, eichblühend 0.50 Marjanne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurvoten Blüten, eichblühend 0.50 Marjanne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurvoten Blüten, eichblühend 0.50 Marja	Bullevana. Die Farbe ist grange aprikosen scharlach	— Gartendirektor Steffen. Großblumig, leucht. rosa 0.60
Surmanica. Karamis mit orange Auge. CoCokburniana. Schwachwüchsige Art mit graziüsen kupferorangefarbenen Blüten kupferorangefarbenen Blüten Supferorangefarbenen Blüten Supferorangefarbenen Blüten Blumen auf stark weißpehlig bepunderten Stengeh 0.50 — Red Hugh. Leuchtend scharlachrote Blumen Sliwe Jaroucana. Kupferigrot O.60 S. Kissenprimed № № △ Sie entstammen meist einer Kreuzung von Primula Juliae mit unserer groß- blumigen Gartenprimel. Das besonders frischgrüne Blumenkissen verschwindet, macht diese Art be- sonders wertvoll. Von allen Primulen gedeihen sie am leichtesten. 10−20 cm. III-IV pruhoniciana (Helenae). Herrlicher Bastard von Primula Juliae und Primula acaulis mit großen illaroten Blumen Blüten auf Stene weitschel von Primula Juliae und Primula acaulis mit großen illaroten Blumen Blüten eine Siehe Neuheiten Arno von Oheimb. Samig dunkelpurpur O.50 — E. R. Janes. Siehe Neuheiten O.80 — Edelstein. Leuchtend purpur O.50 — Frühlingszauber. Lilarot Gartenprimel, in Delden auf kurzens Stielen stehen Gartenprimel, in Delden auf kurzens Stielen stehen Gartenprimel, in Delden auf kurzens Große, länglich-varke Blätter und große Blüten- delen im zeigsten Frühjahn. Hervorragende Schattenpflanze, dien fetens klätter O.50 — Verpreikssen, Daiktende violett, sehe reichblihend O.50 — Großen Blüten, reichblimend O.50 — Großen Blüten auf festen Stielen O.50 — Großen Blüten auf Gesten Stielen O.50 — Verpreikssen, Daikten der jedoch die Leucht purpuroten Blüten, reichblimend O.50 — Großen Blüten Blüten, reichblimend O.50 — Großen Blüten Blüten ver eichblimend O.50 — Großen Blüten Blüten ver eichblimend O.50 — Großen Blüten Blüten ver eichblimend	und zartnankinggelb 0.50	— Miss Nelly Barnard. Gefranste, leucht. rote Blumen 0.60
hybriden. Mischung feinster Farben	Burmanica. Karmin mit orange Auge 0.60	
— iaponica, Herdilches Farbopiel von rot bis rosa u. weiß o.50 pulverulenta. Ähnileh Pr. japanica mit leucht. roten Blumen auf stark weißmehig bepuderten Stengeln 0.50 — Red Hugh, Leuchtend scharlachrote Blumen 0.60 — Silva Tarcucana. Kupfreigen 0.50 3. Kissenprimel 0 ≅ △ Sie entstammen meist einer Kreuzung von Brimula Juliae mit unserer groß- blumigen Gartenprinel. Das besonders frischgrüne Laub, welches im zeitigen Frühlahr unter einem Blumenkissen verschwindet, macht diese Art be- sonders wertvoll. Von allen Primela gedehen sie am leichtesten, 10−20 cm III-IV pruhoniciana (felenae). Herricher Bastard von Frimula Juliae und Primula acaulis mit großen Frimula Juliae und Primula acaulis mit großen Blaukissen. Von hellveilchenblauer Farbe 0.50 — E. R. Janes. Siehe Neuheiten 0.40 — Gardenglück. Karminrosa mit hellviolett 0.50 — Gardenglück. Reminrosa mit hellviolett 0.50 — Magerial Tiefdunkles, sammetarfiges karmoisinrot 0.50 — Magerial Tiefdunkles, sammetarfiges karmoisinrot 0.50 — Magerial Tiefdunkles, sammetarfiges karmoisinrot 0.50 — Weißer Schwan. Langegetätelt, große-weiße Blum. 0.40 — Goldelse, Tiefdunkles, en metartiges karmoisinrot 0.50 — Weißer Schwan. Langegetätelt, große-weiße Blum. 0.40 — Goldelse, Tiefdunkles, en metartiges karmoisinrot 0.50 — Weißer Schwan. Langegetätelt, große-weiße Blum. 0.40 — Goldelse, Tiefdunkles, en metartiges karmoisinrot 0.50 — Weißer Schwan. Langegetätelt, große-weiße Blum. 0.40 — Goldelse, Tiefdunkles, en metartiges karmoisinrot 0.50 — Weißer Schwan. Langegetätelt, große mit langen, spatelförmigen, abgerundeten 0.50 — Goldelse, Tiefdunklesen, Schwiger Blum. 0.40 — Goldelse, Tiefdunklesen, Schwiger Blum. 0.40 — Goldelse, Tiefdunklesen, Blüten, weiße 10 — Goldelse, Tiefdunklesen, Blüten, weiße 10 — Goldelse, Tiefdunkles, en metartiges karmoisinrot 0.50 — Mageria Itefunkles, ammetartiges karmoisinrot 0.50 — Mageria Itefunkles, ammetartiges karmoisinrot 0.50 — Garbenglück, Karminroros mit helviolet 0.50 — Goldelse, Tiefdunklesen, Blüten, großen Blüten, großen Blüten, gr	kupferorangefarbenen Blitten 050	— hybriden. Mischung feinster Farben 0.50
Blumen auf stark weißmehlig bepuderten Stengel 0.50 Red Hugh. Leuchtend scharlachrote Blumen 0.60 3. Kissenprimel ⊕ ≧ △ Sie cutstammen meist einer Kreuzung von Primula Juliae mit unserer großblumigen Gartenprimel. Das besonders friesbgüne Laub, welches im zeitigen Frühjahr unter einem Blumenkinsen verschwindet, macht diese Art besonders wertvoll. Von allen Primel gedeihen sie am leichtesten. 10−20 cm III-IV pruhoniciana (Helenae). Herrlicher Bastard von Primula Juliae und Primula acaulis mit großen Haroten Blaumen 0.40 Arno von Oheimb. Santig dunkelpurpur 0.50 Blaukissen. Von hellveilchenblauer Farbe 0.50 Gartenglück. Karminrots mit hellviolett 0.55 Gartenglück. Karminrots mit selber Mitte 0.55 Lebensfreude. Karminrots mit hellviolett 0.55 Magenta. Tiefdunkles, sammetartiges karmoisinrot 0.55 Marianne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurvten Blitten, wie bei den bekannten Gartenprimel). in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 Schneekissen. Von reinweißer Farbe 0.50 Schneekissen. Samtig dunkelpurgun 0.50 Miss Mac Gilavry. Lidet Illaross 0.50 Purpukkissen. Didtes Blumenkissen, karminpurpur 0.55 Schneekissen. Von reinweißer Farbe 0.50 Schleien Siehe Neuheiten 0.50 Schneekissen. Von reinweißer Farbe 0.50 Sch	- Japonica. Herrliches Farbspiel von rot bis rosa u. weiß 0.50	— lichiangensis. Kräft. behaart m. violettrot. Blütendold. 0.70
- Red Hugh. Leuchtend scharlachrote Blumen 0.65 Silva Taroucana. Kupferigot 0.00 3. Kissenprimel ⊕ ≥ Δ Sie entstammen meist einer Kreuzung von Primula Juliae mit unserer großblumigen Gartenprimel. Das besonders frieschgrüne Laub, welches im zeitigen Frühighr unter einem Blumenkissen verschwindet, macht diese Art besonders wertvoll. Von allen Primeln gedeihen sie am leichtesten. 10-20 cm III-IV pruhoniciana (Helenae). Herrlicher Bastard von Primula Juliae und Primula acaulis mit großen lilaroten Blumen 0.50 Arno von Oheimb, Samtig dunkelpurpur 0.50 Blaukissen. Von hellveilchenblauer Farbe 0.50 E. R. Janes. Siehe Neuheiten 0.80 Gorfenglück. Karminora mit gelber Mitte 0.55 Juwel. Leuchtend purpur 0.55 Grafenglück. Karminora mit gelber Mitte 0.55 Juwel. Leuchtend purpur 0.550 Marianne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimel, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 Marianne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimel, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 Marianne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimel, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 Marianne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimel, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 Marianne. Eine Kissenprimel bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimel, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 Marianne. Eine Kissenprimel bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten 0.50 Marianne. Eine Kissenprimel bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten 0.50 Marianne. Eine Kissenprimel bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten 0.50 Marianne. Eine Kissenprimel bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten 0.50 Marianne. Eine Kissenprimel bei der jedoch die leucht. purpur den Blüten 0.50 Marianne. Eine Kissenprimel bei der jedoch die leucht. purpur den Blüten 0.50 Marian 20 Marianne. E	pulverulenta. Ahnlich Pr. japonica mit leucht. roten	und leuchtend purpurrosa Blittendolden 060
Silva Taroucana. Kupferignot 3. Kissenprimel Ø ≅ Δ Sie entstammen meist einer Kreuzung von Primula Juliae mit unserer großblumigen Gartenprimel. Das besonders frischsgrüne Laub, welches im zeitigen Frühjahr unter einem Blumenkissen versehvindet, macht diese Art besonders wertvoll. Von allen Primulen gedelnen sie am leichteaten. 10−20 cm . III-IV prubniciona (Helenae). Herrlicher Bastard von Primula Juliae und Primula acaulis mit großen lilaroten Blumen . 0.40 — Arno von Oheimb. Samtig dunkelpurpur 0.50 — Blaukissen. Von hellveilchenblauer Farbe 0.50 — E. R. Janes. Siehe Neuheiten 0.80 — Frühlingszauber. Lilarot 0.50 — Gartenglück. Karminora mit gelber Mitte 0.50 — Juwel. Leuchtend röflich magenta 0.50 — Marjanne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht, purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimel, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 — Walfer Schwan. Langsgestielte, große weiße Blum 0.40 — Ostergust, Amarantrot, sehe großhumig 0.50 — Purpukissen. Dichtes Blumenkissen, karminpurpur 0.50 — Schleesensen, Dichtes Blumenkissen, karminpurpur 0.50 — Schlesierkind, Leuchtend violett, sehr reichblühend 0.50 — Schlesierkind, Leuchtend violett, sehr reichblühend 0.50 — Juliae. Mit saftigfrisdgrüner Belaubung und großen feuurigupruprrossafzhenen Blüter. erichblühend 0.50 — Juliae. Mit saftigfrisdgrüner Belaubung und großen feuurigupruprrossafzhenen Blüter, erichblühend 0.50 — Juliae. Mit saftigfrisdgrüner Belaubung und großen feuurigupruprrossafzhenen Blüter, erichblühend 0.50 — Juliae. Mit saftigfrisdgrüner Belaubung und großen feuurigupruprrossafzhenen Blüter, erichblühend 0.50 — Juliae. Mit saftigfrisdgrüner Belaubung und großen feuurigupruprrossafzhenen Blüten, erichblühend 0.50 — Juliae. Mit saftigfrisdgrüner Belaubung und großen feuurigupruprrossafzhenen Blüten preichblühend 0.50 — Juliae. Mit saftigfrisdgrüner Belaubung und großen feuurigupruprrossafzhenen Blüten 25 cm 0.50 — Gloria. Siehe Neuheiten 0.50 — Gloria. Siehe Neuheiten 0.50 — Gloria. Siehe Neuheiten 0.50 — Glo	Red Hugh. Leuchtend scharlachrote Blumen 0.60	— Ville de Nancy. Rosarote, an den Rändern ge-
3. Kissenprimel	— Silva Taroucana. Kupferigrot 0.60	schlitzte Blüten 0.60
blumigen Cartenprimel. Das besonders frischgrüne Laub, welches im zeitigen Frilijahr unter einem Blumenkissen verschwindet, macht diese Art be- sonders wertvoll. Von allen Primeln gedeihen sie am leichtesten. 10-20 cm. III-IV pruhoniciana (Helenae). Herrlicher Bastard von Primula Juliae und Primula acaulis mit großen lilaroten Blumen. Arno von Oheimb. Samtig dunkelpurpur 0.50 E. R. Janes. Siehe Neuheiten 0.80 E. R. Janes. Siehe Neuheiten 0.80 E. Gelstein. Leuchtend purpur 0.50 Gartenglück. Karminrot mit gelber Mitte 0.50 Juwel. Leuchtend füllich magenta 0.50 Marjanne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimeln, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 Ostergruß, Amarantrot, sehr großblumig 0.50 Rubin. Siehe Neuheiten 0.80 Purpurkissen. Osten Sehren 1.80 Santikissen. Samtig dunkelrote Blüten 0.50 Santikissen. Samtig dunkelrote Blüten 0.50 Juwel. Leuchtend völlich magenta 0.50 Ostergruß, Amarantrot, sehr großblumig 0.50 Purple Splendour. Siehe Neuheiten 0.80 Purpurkissen. Osten Neuheiten 0.50 Santikissen. Samtig dunkelrote Blüten 0.50 Schlesiserkind. Leuchtend violett, sehr großblumig 0.50 Juliae, Mit satitigrisakgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, wie ohn 11.1V 0.50 Schlesiserkind. Leuchtend violet, sehr erichblühend 0.50 Juliae, Mit satitigrisakgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, vie ohn 11.1V 0.50 delicata. Reinhellitens, sehr sciebliihend 0.50 Juliae, Mit satitigrisakgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, vie ohn 11.1V 0.40 denticulata. Hellia bis dunkellila 0.50 Juliae, Mit satitigrisakgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend 0.50 Juliae, Mit satitigrisakgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, eichblühend 0.50 Juliae, Mit satitigrisakgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, eichblühend 0.50 Juliae, Mit satitigrisakgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, vie ohn 11.1V 0.40 0.50 0.50 0.	3. Kissenprimel → ≅ △ Sie entstammen meist einer	6. Großblumige Gartenprimel () \cong # Sie sind
Laub, welches im zeitigen Frühjahr unter einem Blumenkissen versehwindet, macht diese Art besondera wertvoll. Von allen Primeln gedeihen sie am leichtesten. 10-20 cm. III-IV pruInoniciana (Helenae). Herrlicher Bastard von Primula Juliae und Primula acaulis mit großen Blaroten Blumen. 0.40 — Arno von Oheimb. Samtig dunkelpurpur 0.50 — Blaukissen. Von hellveilchenblauer Farbe 0.50 — E. R. Janes. Siehe Neuheiten 0.80 — Edelstein, Leuchtend purpur 0.50 — Frühlingszauber. Lilarot 0.50 — Gartenglück. Karminrot mit gelber Mitte 0.50 — Juwel. Leuchtend rötlich magenta 0.50 — Magenta. Tiefdunkles, sammetartiges karmoisinrot 0.50 — Marianne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht, purpurroten Blitten, wie bei den bekannten Gartenprimeln, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 — Miss Mac Gilavy. Lidt illarosa 0.50 — Purpue Splendour. Siehe Neuheiten 0.80 — Purpurkissen. Didtes Blumenkissen, karminpurpur 0.50 — Samlkissen. Von reinweißer Farbe 0.50 — Schneekissen. Von reinweißer Farbe 0.50 — Juliae, Mit saftigfräsdyrürer Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blütten, reichblühend uvon langer Blüten; etchted in the mit langen, spatelförmigen, abgerundeten Blätern ungroßen Blütenber der vorigen. 30,40 — Gloria. Siehe Neuheiten 0.40 — Gloria. Siehe Neuheiten 0.50 — Juliae, Mit saftigfräsdyrürer Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend uvon langer Blüten; etchte blüten 0.50 — Gertengen der	Kreuzung von Primula Juliae mit unserer groß-	meistens Züchtungen von unserem Wiesenhimmels-
Blumenkissen versehwindet, macht diese Art besonders wertvoll. Von allen Primeln gedeihen sie am leichtesten. 10−20 cm III-IV pruhoniciana (Helenae). Herrlicher Bastard von Primula Juliae und Primula acaulis mit großen lilaroten Blumen 0.40 Arno von Oheimb. Samtig dunkelpurpur 0.50 Blaukissen. Von hellveilchenblauer Farbe 0.50 E. R. Janes. Siehe Neubeiten 0.80 Edelstein. Leuchtend purpur 0.50 Frühlingszauber. Lilarot 0.50 Gartenglück. Karminrot mit gelber Mitte 0.50 Juwel. Leuchtend röflich magenta 0.50 Marjanne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht, purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimeln, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 Miss Mac Gilavry. Lidat lilarosa 0.50 Miss Mac Gilavry. Lidat lilarosa 0.50 Morgenta Tiefdunkles, sammetartiges karmoisinrot 0.50 Morgenta Missens midellivolet		schlüssel und eignen sich sowohl zum Bepflanzen
am leichtesten. 10—20 cm . III-IV pruhoniciana (Helenae). Herrlicher Bastard von Primula Juliae und Primula Juliae und Primula acaulis mit großen lilaroten Blumen . 0.40 Arno von Oheimb. Samtig dunkelpurpur . 0.50 Blaukissen. Von hellveilehenblauer Farbe . 0.50 E. R. Janes. Siche Neuheiten . 0.80 E. R. Janes. Siche Neuheiten . 0.50 Frühlingszauber. Lilarot . 0.50 Garlenglück. Karminrot mit gelber Mitte . 0.50 Juwel. Leuchtend pripur . 0.50 Marjanne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimeln, in Dolden auf kurzen Stielen stehen . 0.50 Miss Mac Gilavry. Lidat Illarosa . 0.50 Miss Mac Gilavry. Lidat Illarosa . 0.50 Miss Mac Gilavry. Lidat Illarosa . 0.50 Schlesferikind. Leuchtend profiblumig . 0.50 Purpuk Kissen. Didtes Blümenskissen, karminpurpur 0.50 Rubin. Siche Neuheiten . 0.60 Samtkissen. Samtig dunkelrote Blüten, methblühend uvon langer Blütezeit . 0.40 Gloria. Siche Neuheiten . 0.50 Juliae, Mit saftigfrischgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend uvon langer Blütezeit . 0.40 Gloria. Siche Neuheiten . 0.50 Juliae, Mit saftigfrischgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend uvon langer Blütezeit . 0.40 Gloria. Siche Neuheiten . 0.50 delicata. Reinhellrosa, sehr reichblühend . 0.50 Juliae, Mit saftigfrischgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend uvon langer Blütezeit . 0.40 Gloria. Siche Neuheiten . 0.50 delicata. Reinhellrosa, sehr reichblühend . 0.50 Juliae, Mit saftigfrischgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend uvon langer Blütezeit . 0.40 Gloria. Siche Neuheiten . 0.50 Marjanne Leuchtend hellila Blütenkugeln, 8−10 cm in Durchmesser, auf festen, diken Stielen Aud zum langsam. Treib. gut geeignet. 20.30 cm III-V denticultat. Hellia bis dunkellila . 0.40 alba. Weißblühende Art . 0.550 delicata. Reinhellrosa, sehr reichblühend . 0.50 Juno. Leuchtend hellila Blütenkugeln, 8−10 cm im Durchmess	Blumenkissen verschwindet, macht diese Art be-	20-30 cm IV-V
Priuhoniciana (Helenae). Herrlicher Bastard von Primula Juliae und Primula acaulis mit größen lilaroten Blumen	sonders wertvoll. Von allen Primeln gedeihen sie	— auricula hybr. Siehe pubescens.
Primula Juliae und Primula acaulis mit großen lilaroten Blumen . 0.40 — Arno von Oheimb. Samtig dunkelpurpur . 0.50 — Blaukissen. Von hellveilchenblauer Farbe . 0.50 — E. R. Janes. Siehe Neuheiten . 0.80 — Edelstein. Leuchtend purpur . 0.50 — Frühlingszauber. Lilarot . 0.50 — Garlenglück. Karminrot mit gelber Mitte . 0.50 — Juwel. Leuchtend röltich magenta . 0.50 — Lebensfreude. Karminrot mit gelber Mitte . 0.50 — Marjanne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimela, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 — Ostergruß. Amarantrot, sehr großblumig . 0.50 — Purple Splendour. Siehe Neuheiten . 0.80 — Purpurkissen. Dichtes Blumenkissen, karminpurpur . 0.50 — Schneekissen. Von reinweißer Farbe . 0.50 — Schneekissen. Von reinweißer Farbe . 0.50 — Schneekissen. Von reinweißer Farbe . 0.50 — Schneekissen. Won reinweißer Farbe . 0.50 — Wanda. Fast reinblau, sehr schön . 0.50 — Union. Euchtend hellite auf festen Stielen. Auch zum langsam. Treib. gut geeignet. 20-30 cm III-V — denticulata. Hellila bis dunkellila . 0.40 — alba. Weißblishende Art . 0.50 — delicata. Reinhellrosa, sehr reichblühend . 0.50 — delicata. Reinhellros	pruhoniciana (Helenae). Herrlicher Bastard von	— elatior aurea granditl. "Vierländer Primel". Leuch-
Arno von Oheimb. Samtig dunkelpurpur — Blaukissen. Von hellevilchenblauer Farbe — C.50 — E. R. Janes. Siehe Neuheiten — 0.50 — Frühlingszauber. Lilarot — 0.50 — Frühlingszauber. Lilarot — 0.50 — Gartenglück. Karminrot mit gelber Mitte — 0.50 — Juwel. Leuchtend rölich magenta — 0.50 — Lebensfreude. Karminrosa mit hellvolett — 0.50 — Magenta. Tiefdunkles, sammetartiges karmoisinrot 0.50 — Marianne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten — Gartenprimeln, in Dolden auf kurzen Stielen stehen — Gartenprimeln, in Dolden auf kurzen Stielen stehen — O.50 — Ostergruß. Amarantot, sehr großblumig — 0.50 — Purple Splendour. Siehe Neuheiten — 0.60 — Rubin. Siehe Neuheiten — 0.60 — Samtkissen. Samtig dunkelrote Blüten — Schlesierkind. Leuchtend violett, sehr reichblühend 0.50 — Wanda. Fast reinblau, sehr schön — 0.50 — Urola. Siehe Neuheiten — 0.60 — Gloria. Siehe Neuheiten — 0.70 4. Kugelprimel A Sehr widerstandsfähige Arten — mit langen, spatelförmigen, abgerundeten Blättern — u.großen Blütenzier — mit langen, spatelförmigen, abgerundeten Blättern — u.großen Blütenzier — 0.40 — alba. Weißblühende Art — 0.50 — delicata. Reinhellrosa, sehr reichblühend — 0.50 — delicata. R	Primula Juliae und Primula acaulis mit großen	- carpathica. Unserer gewöhnlichen Wiesenprimel
 Blaukissen. Von hellveilchenblauer Farbe 0.50 E. Janes. Siche Neuheiten 0.50 Edelstein. Leuchtend purpur 0.50 Frühlingszauber. Lilarot 0.50 Gartenglück. Karminrot mit gelber Mitte 0.50 Juwel. Leuchtend röflich magenta 0.50 Lebensfreude. Karminrosa mit hellviolett 0.50 Magenfa. Tiefdunkles, sammetartiges karmoisinrot 0.50 Marianne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimeln, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 Miss Mac Gilavry. Licht Illarosa 0.50 Ostergruß. Amarantrot, sehr großplumig 0.50 Purple Splendour. Siehe Neuheiten 0.50 Schneekissen. Samtig dunkelrote Blüten 0.50 Schneekissen. Von reinweißer Farbe 0.50 Schneekissen. Von reinweißer Farbe 0.50 Juliae. Mit saftigfrisdgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend 0.50 Juliae. Mit saftigfrisdgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend 0.50 Juliae. Mit saftigfrisdgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten. 20.30 denficulata. Hellila bis dunkellila 0.40 alba. Weißblishende Ahrt 0.50 denficulata. Hellila bis dunkellila 0.40 denficulata. Hellila bis dunkellila 0.40 denficulata. Hellila bis dunkellila 0.50 Juno. Leuchtend hellila Blütenkugeln, 8-10 cm im Durchmesser, auf festen, dicken Stüelen 0.50 delicata. Reinhellrosa, sehr reichblühend 0.50	- Arno von Oheimh Samtig dunkelpurpur 0.50	ahnlich, jedoch bedeutend reicher blühend 0.40
 E. R. Janes. Siehe Neuheiten Edelstein. Leuchtend purpur 5.50 Frühlingszauber. Lilarot 5.50 Juwel. Leuchtend rötlich magenta 5.50 Lebensfreude. Karminrosa mit hellviolet 5.50 Magenta. Tiefdunkles, sammetartiges karmoisinrot 0.50 Marianne. Eine Kissenprinel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimeln, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 Miss Mac Gilavry. Licht lilarosa O.50 Purple Splendour. Siehe Neuheiten Schensekissen. Samtig dunkelrote Blüten Schneekissen. Samtig dunkelrote Blüten Schneekissen. Samtig dunkelrote Blüten Goldelse, Lungenkraut, Borraginaceae ○ △ Schneekissen. Von reinweißer Farbe Schlesierkind. Leuchtend violett, sehr reichblühend Goldelse, Siehe Neuheiten Schlesierkind sehren Blüten, reichblühend Goldelse, Mit saftigfrisdngrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend un von langer Blütezeit Goloria. Siehe Neuheiten Goloria. Siehe Neu	- Blaukissen. Von hellveilchenblauer Farbe 0.50	— coerulea. Großblumig, hell oder duukelblau 0.50
Frühlingszauber. Lilarot	- E. R. Janes. Siehe Neuheiten	blumen oft über 4 cm Durchmesser haben, in den
- Garfenglück. Karminrot mit gelber Mitte 0.50	- Edelstein, Leuchtend purpur 0.50 - Frühlingszauber Lilaret 0.50	Farben weiß, gelb und rot aller Schattierungen . 0.40
 Juwel. Leuchtend rölich magenta 0.50 Lebensfreude. Karminrosa mit hellviolett 0.50 Magenta. Tierdunkles, sammetartiges karmoisinrot 0.50 Marianne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimeln, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 Ostergruß. Amarantrot, sehr großblumig 0.50 Purple Splendour. Siehe Neuheiten 0.80 Purpurkissen. Didtes Blumenkissen, karminpurpur 0.50 Rubin. Siehe Neuheiten 0.50 Schneekissen. Von reinweißer Farbe 0.50 Schneekissen. Von reinweißer Farbe 0.50 Juliae. Mit saftigfrischgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reinblühend von langer Blütezeit 0.40 Gloria. Siehe Neuheiten 0.70 4. Kugelprimel Φ Δ ≅ Schr widerstandsfähige Arten mit langen, apatelförmigen, abgerundeten Blättern u. großen Blütenbällen auf festen Stielen. Auch zum langsam. Treib. gut geeignet. 20-30 cm III-V denficuldat. Hellila bis dunkelila 0.40 alba. Weißblühende Art 0.50 Juno. Leuchtend hellila Blütenkugeln, 8-10 cm im Durchmesser, auf festen, dicken Stielen 0.60 Juno. Leuchtend hellila Blütenkugeln, 8-10 cm im Durchmesser, auf festen, dicken Stielen 0.50 Veriffer Schwan. Langegestielte, große, weiße Blätten duftende Blüten altheten der unterchende Planze, deren duftende Blüten in reichsten Farbenspiel in hübsch. Dolden stehen 0.40 Perocephalus, Alpenskabiose, Dipsacaceae 0 Δ Parnassii. Kriechende Pflanze mit grauer Belaubung u. prächt, rosafarb. Skabiosenblüt. 20 cm VII-1X 0.50 Pulmonaria, Lungenkraut, Borraginer Belaubung und großen gedeiht	- Gartenglück. Karminrot mit gelber Mitte 0.50	- Goldelse. Tiefdottergelbe Blütenfarbe mit orange-
- Magenfa Tiefdunkles, sammetartiges karmoisinrot 0.50 - Marianne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimeln, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 - Miss Mac Gilavry. Licht lilarosa 0.50 - Ostergruß, Amarantrot, sehr großblumig 0.50 - Purple Splendour. Siehe Neuheiten 0.80 - Purpurkissen. Dichtes Blumenkissen, karminpurpur 0.50 - Rubin. Siehe Neuheiten 0.60 - Samtkissen. Samtig dunkelrote Blüten 0.50 - Schneekissen. Von reinweißer Farbe 0.50 - Schlesierkind. Leuchtend violett, sehr reichblühend 0.50 - Wanda. Fast reinblau, sehr schön 0.50 - Juliae. Mit saftigfrischgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend u. von langer Blütezeit 0.40 - Gloria. Siehe Neuheiten 0.40 - Gloria. Siehe Neuheiten 0.40 - Akugelprimel → Δ ≅ Schr widerstandsfähige Arten mit langen, spatelförmigen, abgerundeten Blättern u.großen Blütenbällen auf festen Stielen. Auch zum langsam. Treib. gut geeignet. 20-30 cm III-V - denficulata. Hellila bis dunkellila 0.40 - alba. Weißblühende Art 0.50 - Juno. Leuchtend hellila Blütenkugeln, 8-10 cm im Durchmesser, auf festen, dicken Stielen 0.60 - Juno. Leuchtend hellila Blütenkugeln, 8-10 cm im Durchmesser, auf festen, dicken Stielen 0.60 - Purpuksison. Dichtes Blumenkissen, karminpurpur 0.50 - Schneekissen. Von reinweißer Farbe 0.50 - Schlesierkind. Leuchtend violett, sehr reichblühend 0.50 - Wanda. Fast reinblau, sehr schön 0.50 - Juno. Leuchtend D Δ ≅ Schr widerstandsfähige Arten mit langen, spatelförmigen, abgerundeten Blättern u.großen silberweißen Flecken. Blüten. Schönes Gegenstüchten stützen. 20-50 - Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, jedoch Blüten leuchtend rot. 30 cm 0.50 - Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, jedoch Blüten leuchtend rot. 30 cm 0.50 - Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, jedoch Blüten leuchtend rot. 30 cm 0.50 - Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, jedoch densum. Weißfilzige, samtartige Blätt	- Juwel. Leuchtend rötlich magenta 0.50	- Weißer Schwan. Langgestielte, große, weiße Blum. 0.40
— Marianne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimeln, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 — Miss Mac Gilavry. Lidt Illarosa	— Magenta, Tiefdunkles, sammetartiges karmoisinrot 0.50	– pubescens (auricula hybriden). Gartenaurikel.
Frocephalus, Alpenskabiose, Dipsacaceae ○ △ Gartenprimeln, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50 Miss Mac Gilavry. Licht lilarosa 0.50 Ostergrufs. Amarantrot, schr großblumig . 0.50 Purple Splendour. Siche Neuheiten 0.80 Purpurkissen. Dichtes Blumenkissen, karminpurpur 0.50 Rubin. Siehe Neuheiten 0.60 Samtkissen. Samtig dunkelrote Blüten 0.50 Schneekissen. Von reinweißer Farbe . 0.50 Schneekissen. Von reinweißer Farbe . 0.50 Schlesierkind. Leuchtend violett, schr reichblühend 0.50 Wanda. Fast reinblau, schr schön 0.50 Juliae. Mit saftigfrischgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend u. von langer Blütezeit 0.40 Gloria. Siehe Neuheiten 0.70 4. Kugelprimel ♠ △ ≅ Schr widerstandsfähige Arten mit langen, spatelförmigen, abgerundeten Blättern u. großen Blütenbällen auf festen Stielen. Auch zum langsam. Treib. gut geeignet. 20-30 cm III-V denticulata. Hellila bis dunkellila 0.40 — alba. Weißblühende Art 0.50 Juno. Leuchtend hellila Blütenkugeln, 8-10 cm im Durchmesser, auf festen, dicken Stielen 0.60 — Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, jedoch Blüten leuchtend rot. 30 cm 0.50 Parnassil. Kriechende Pflanze mit grauer Belaubung u. prächt., rosafarb. Skabiosenblüt. 20 cm VII-IX 0.50 Große, länglich-ovale Blätter und große Blüten-dolden im zeitigsten Frühjahr. Hervorragende Schattenpflanze, die in feuchten Lagen auch in der Sonne gedeiht III-IV — angustifolia azurea. Eine der frühesten von allen Stauden mit großen, tiefenzianblauen Blum. 30 cm 0.50 — avernensis. Gedrungen wachsende, schmalblättrige Art mit purpurblauen Blüten. 25 cm 0.50 — wernensis. Gedrungen wachsende, schmalblättrige Art mit purpurblauen Blüten. 25 cm 0.50 — alba. Schneeweiß blühende Abart d. vorig. 25 cm 0.50 — mit langen, spatelförmigen, abgerundeten Blättern ungerößen, weißen silverweißen Flecken. Blüten blüten bluz. 25 cm . 0.40 — argentea picta. Die derben Blätter sind mit besonders großen, weißen Flecken gezeichn	— Marianne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die	Altbeliebte Gartenpflanze, deren duftende Blüten im reichsten Farhenspiel in hübsch Dolden stehen 0.40
— Miss Mac Gilavry. Licht lilarosa	leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten	Pterocephalus, Alpenskabiose, Dipsacaceae O 🛆
 Ostergruß. Amarantrot, sehr großblumig Purple Splendour. Siehe Neuheiten O.80 Purpurkissen. Dichtes Blumenkissen, karminpurpur 0.50 Rubin. Siehe Neuheiten O.60 Samtkissen. Samtig dunkelrote Blüten O.50 Schneekissen. Von reinweißer Farbe O.50 Wanda. Fast reinblau, sehr schön O.50 Juliae. Mit saftigfrischgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend uvon langer Blützeit Gloria. Siehe Neuheiten O.70 Kugelprimel	- Miss Mac Gilavry, Light lilarosa 0.50	- Parnassii. Kriechende Pflanze mit grauer Belaubung u.
— Purpurkissen. Dichtes Blumenkissen, karminpurpur 0.50 — Rubin. Siehe Neuheiten 0.60 — Samtkissen. Samtig dunkelrote Blüten 0.50 — Schneekissen. Von reinweißer Farbe 0.50 — Schlesierkind. Leuchtend violett, schr reichblühend 0.50 — Wanda. Fast reinblau, sehr schön 0.50 Juliae. Mit saftigfrischgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend u. von langer Blütezeit 0.40 — Gloria. Siehe Neuheiten 0.70 4. Kugelprimel △ ≃ Schr widerstandsfähige Arten mit langen, spatelförmigen, abgerundeten Blättern u	- Ostergruß. Amarantrot, sehr großblumig 0.50	Pulmonaria, Lungenkraut, Borraginaceae O- \(\text{\text{\$\sigma}}\)
— Rubin. Siehe Neuheiten	Purpur Splendour. Siehe Neuheiten 0.80	Große, länglich-ovale Blätter und große Blüten-
— Samtkissen. Samtig dunkelrote Blüten	- Rubin. Siehe Neuheiten 0.60	dolden im zeitigsten Frühjahr. Hervorragende
— Schlesierkind. Leuchtend violett, sehr reichblühend 0.50 — Wanda. Fast reinblau, sehr schön 0.50 — Juliae. Mit saftigfrischgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend u. von langer Blütezeit 0.40 — Gloria. Siehe Neuheiten 0.70 4. Kugelprimel ♠ △ ≅ Sehr widerstandsfähige Arten mit langen, spatelförmigen, abgerundeten Blättern u. großen Blütenbällen auf festen Stielen. Auch zum langsam. Treib. gut geeignet. 20-30 cm III-V — denticulata. Hellila bis dunkellila 0.40 — alba. Weißblühende Art 0.50 — delicata. Reinhellrosa, sehr reichblühend 0.50 — Juno. Leuchtend hellila Blütenkugeln, 8-10 cm im Durchmesser, auf festen, dicken Stielen 0.60 — Oschlesierkind. Leuchtend on Stauden mit großen, tiefenzianblauen Blum. 30 cm 0.50 — avernensis. Gedrungen wachsende, schmalblättrige Art mit purpurblauen Blüten. 25 cm 0.50 — alba. Schneeweiß blühende Abart d. vorig. 25 cm 0.50 — officinalis. Heimische Art mit rotvioletten Blüt. 30 cm 0.40 — saccharata. Blätter dunkelgrün mit unregelmäßigen, großen silberweißen Flecken. Blüten blau. 25 cm . 0.40 — argentea picta. Die derben Blätter sind mit besonders großen, weißen Flecken gezeichnet. 30 cm 0.50 — Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, jedoch Blüten leuchtend rot. 30 cm 0.50 Pyrethrum, Zwergmarguerite, Compositae ○ △ — densum. Weißfilzige, samtartige Blättchen, weiße	— Samtkissen. Samtig dunkelrote Blüten 0.50	Sonne gedeiht III-IV
— Wanda. Fast reinblau, sehr schön 0.50 Juliae. Mit saftigfrischgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend u. von langer Blütezeit 0.40 — Gloria. Siehe Neuheiten 0.70 4. Kugelprimel ♠ △ ≅ Schr widerstandsfähige Arten mit langen, spatelförmigen, abgerundeten Blättern u. großen Blütenbällen auf festen Stielen. Auch zum langsam. Treib. gut geeignet. 20-30 cm III-V — denticulata. Hellila bis dunkellila 0.40 — alba. Weißblühende Art 0.50 — delicata. Reinhellrosa, sehr reichblühend 0.50 — Juno. Leuchtend hellila Blütenkugeln, 8-10 cm im Durchmesser, auf festen, dicken Stielen 0.60 — overnensis. Gedrungen wachsende, schmalblättrige Art mit purpurblauen Blüten. 25 cm 0.50 — alba. Schneeweiß blühende Abart d. vorig. 25 cm 0.50 — officinalis. Heimische Art mit rotvioletten Blüt. 30 cm 0.40 — rubra. Leuchtend mennigrote Blüten. Schönes Gegenstück zu P. angustifolia. 30 cm 0.40 — argentea picta. Die derben Blätter sind mit besonders großen, weißen Flecken gezeichnet. 30 cm 0.50 — Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, jedoch Blüten leuchtend rot. 30 cm 0.50 — Pyrethrum, Zwergmarguerite, Compositae ⊙ △ — densum. Weißfilzige, samtartige Blättchen, weiße	- Schlesierkind Leightend violett sehr reichblijhand 0.50	— angustifolia azurea. Eine der frühesten von allen
Fuliae. Mit saftigfrischgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend u. von langer Blütezeit	— Wanda. Fast reinblau, sehr schön 0.50	Stauden mit großen, tiefenzianblauen Blum. 30 cm 0.50
von langer Blütezeit	Juliae. Mit saftigfrischgrüner Belaubung und großen	Art mit purpurblauen Blüten. 25 cm 0.50
 Gloria. Siehe Neuheiten	von langer Blütezeit	— alba. Schneeweiß blühende Abart d. vorig. 25 cm 0.50
4. Kugelprimel ♠ △ ≅ Sehr widerstandsfähige Arten mit langen, spatelförmigen, abgerundeten Blättern u.großen Blütenbällen auf festen Stielen. Auch zum langsam. Treib. gut geeignet. 20-30 cm III-V — denticulata. Hellila bis dunkellila 0.40 — alba. Weißblühende Art 0.50 — delicata. Reinhellrosa, sehr reichblühend 0.50 — Juno. Leuchtend hellila Blütenkugeln, 8-10 cm im Durchmesser, auf festen, dicken Stielen 0.60 4. Kugelprimel ♠ △ ≅ Sehr widerstandsfähige Arten stück zu P. angustifolia. 30 cm 0.40 — saccharata. Blätter dunkelgrün mit unregelmäßigen, großen silberweißen Flecken. Blüten blau. 25 cm . 0.40 — argentea picta. Die derben Blätter sind mit besonders großen, weißen Flecken gezeichnet. 30 cm 0.50 — Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, jedoch Blüten leuchtend rot. 30 cm 0.50 Pyrethrum, Zwergmarguerite, Compositae ○ △ — densum. Weißfilzige, samtartige Blättchen, weiße	- Gloria. Siehe Neuheiten 0.70	— officinalis. Heimische Art mit rotvioletten Blüt. 30 cm 0.40
mit langen, spatelformigen, abgerundeten Blättern u. großen Blütenbällen auf festen Stielen. Auch zum langsam. Treib. gut geeignet. 20-30 cm III-V denticulata. Hellila bis dunkellila	4. Kugelprimel () △ ≅ Sehr widerstandsfähige Arten	stück zu P. angustifolia. 30 cm 0.40
langsam. Treib. gut geeignet. 20-30 cm III-V — denticulata. Hellila bis dunkellila	mit langen, spatelförmigen, abgerundeten Blättern	- saccharata. Blätter dunkelgrün mit unregelmäßigen,
— denticulata. Hellila bis dunkellila	langsam. Treib. gut geeignet. 20-30 cm. III-V	großen silberweißen Flecken. Blüten blau. 25 cm. 0.40
— alba. Weißblühende Art	denticulata. Hellila bis dunkellila 0.40	sonders großen, weißen Flecken gezeichnet. 30 cm 0.50
— Juno. Leuchtend hellila Blütenkugeln, 8–10 cm im Durchmesser, auf festen, dicken Stielen 0.60 Pyrethrum, Zwergmarguerite, Compositae ○ △ — densum. Weißfilzige, samtartige Blättchen, weiße	- alba. Weißblühende Art	— Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, jedoch
im Durchmesser, auf festen, dicken Stielen 0.60 — densum. Weißfilzige, samtartige Blättchen, weiße	Juno. Leuchtend hellila Blittenkurgeln 8-10 cm	Pyrethrum, 7wergmarguarita Composito (A)
	im Durchmesser, auf festen, dicken Stielen 0.60	— densum. Weißfilzige, samtartige Blättchen, weiße



Physalis Franchetii



Helleborus niger macranthus

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Santolina (Fortsetzung)
Pyrethrum (Fortsetzung)	— tomentosa. Dichte silbergraue Belaubung, gelbe Blü-
	tenköpfe. 30 cm
— sericeum. Wollig silbrige Blattbüschel, weiße Blüten.	- virescens. Gefiederte Belaubung, gelbe Blütenköpfe . 0.40
20 cm V-VI 0.80 — Tschihatschewii. Siehe Matricaria.	Saponaria, Seifenkraut, Caryophyllaceae ○ △ II
	— Boisseri. Schöne rote Blütenp. 20 cm. Selten VI-VII 1.—
Ramondia, Ramondie, Gesneriaceae → → △ ≃	— caespitosa. Dichte Polster linealer Blättchen, Blüte
- Heldreichil. Silberweißfilzige Laubrosette, Blüten vier-	lebhaftrosa. 10 cm VI-VII 0.60
lappig, hellilablau. 10 cm VI-VII 2.—	— lutea. Dichte, lebhaftgrüne Polster und strohgelbe
— myconi (pyrenaica). Aus den breiten, flachen Rosetten	Blüten. 5 cm VI-VII 0.60
dunkelgrüner, braunbehaarter Blätter erscheinen	- ocymoides. Kräftig wachsende kriechende Pflanze mit
die prächtigen, dunkelvioletten, großen Blumen.	einer Fülle v. karminroten Blüt. 10 cm VI-VII 0.40
Eine der schönsten Alpenpflanzen für feuchte	alba. Weißblumig. 10 cm VI-VII 0.50
schattige Felsen. 10 cm VI-VII 1.—	— splendens. Mit leucht. rot. Blüt. 10 cm VI-VII 0.50
— alba. Abart m. edl., reinw. Blüt. 10 cm VI-VII 1.50	— pulvinaris. Schöne, rote, dichte Zwergpolster.
— rosea. Blüt.v.ganz zartrosa Farbe. 10cm VI-VII 1.50	10 cm VI-VII 1.—
Ranunculus, Zwerghahnenfuß, Ranunculaceae O A	- Wiemanniana. Rosabl. Zwergsorte. 10 cm VI-VII 1.—
Teils grasartige, teils kleine handförmige, einge-	
schnittene od. geschlitzte Belaubung u. anemonen-	Satureia, Bohnenkraut, Bergminze, Labiatae O A
artige Blüten. Liebt feuchte sonnige oder halb-	- alpina (Calamintha). Die lockere Polster bildende
schattige Lage. 10-30 cm V-VI	Pflanze bringt eine Fülle kleiner, blauer Lippen-
- alpestris. Herrliche Alpine mit frischgrüner Belaubung	blütchen. 10 cm V-VIII 0.40
und weißen, anemonenartigen Blüten. 10 cm 0.80	- alba. Wie vorige, jedoch weißbl. 15 cm V-VIII 0.60
- amplexicaulis. Schöne Art mit prachtvollen, großen,	— grandiflora. Purpurrosa Blüt. in lockeren Ständen.
blendendweißen Blumen, in denen die goldgelben	10 cm V-VIII 0.50
Staubfäden schön hervortreten. 25 cm 0.70	- amoena. Schöne, niedliche Büsche bildend. Blüten
- Arendsii. Siehe Neuheiten	lilarot. 15 cm V-VIII 0.50
— garganicus. Gekrauste Blättch., goldgelbe Blüt. 10 cm 0.60	— Baumgartenii. Besonders feine Art mit großen weißen
- gramineus. Aus schmallanzettlicher, grasartiger Be-	Blüten. 20 cm VI-VIII 0.80
laubung erscheinen verzweigte Blütenstiele mit	- intermedia. Zierlicher im Wuchs wie S. montana.
ziemlich großen, goldgelben Blumen. 30 cm 0.50	20 cm VI-VIII 0.40
- millefoliatus. Stark gekrauste Blättch., gelbe Blüt. 10 cm 0.60	— montana. Halbstrauchig aromatische Pflanze mit einer
- psilostachys (nyssanus). Handförmig eingeschnittene	Fülle weißer od. zartlila Lippenbl. 30 cm VI-VIII 0.40
Blätter und große, leuchtend hellgelbe Blumen . 0.50	- pygmaea. Niedr. Art, m. lila Blütch. 10 cm VI-VIII 0.40
Raoulia, Schafsteppich, Compositae 🔾 🗠 🛆 🕰	— atroviolacea. Niedere Form mit dunkelvioletten
- australis. Kleiner Rasenbildner mit moosartig-dichter,	Blüten. 20 cm VI-VIII 0.50
silbriggrauer Belaubung; verlangt sonnigen Stand-	Saxifraga, Steinbrech, Saxifragaceae O-0 🛆 : : 🕮
ort. 3 cm VII-VIII 0.70	Die Saxifragen gehören unbedingt zu den Edel-
Roscoea, Ingwerorchidee, Zingiberaceae O A	steinen unserer Felsenpflanzen. Was hier die Natur
- alpina. Eine Zwergform vom Himalaya stammend mit	geschaffen hat, gehört zu den wunderbarsten Ge-
rosaroten Blüten. 20 cm. Sehr selten! VII-VIII 1.50	bilden der alpinen Pflanzenwelt. Blüten in allen
- cautleoides August Beauty. Siehe Neuheiten 2.—	Formen und Farben vom zeitigsten Frühling bis in
- purpurea. Irisartige Staude mit fleischigknolligem	den Hochsommer hinein. Aber auch ohne diese
Wurzelstock, lineal-lanzettlicher Belaubung, und	wirken die Pflanzen das ganze Jahr über durch die
orchideenartigen, rosapurpurnen Helmblüten. 30 cm.	Vielgestaltigkeit in der Blatt- und Rosettenbildung
	und sind auch so noch eine besondere Zierde für
Sehr selten! VII-VIII 1.50 Ruta, Raute, Rutaceae ○ △	den Garten. Wer sie auf unseren Kulturbeeten
	sieht, wird sozusagen von ihnen zum Anpflanzen
— pałavina. Blätter dreizählig sitzend, schöne goldgelbe Blütendolden. 20 cm VI-VII 0.70	aufgefordert. In Anbetracht der vielen Formen und
	Arten, haben wir unser großes Sortiment in 4 Ab-
graveolens. Siehe mittelhohe Stauden.	teilungen gegliedert.
Sagina, Sternmoos, Cariophyllaceae O-1 a	1. Moosartige Saxifragen ① ∴ : △ Lieben entweder
- subulata. Moosartige, feine Bodendeckungspflanze, die	einen absonnigen oder halbschattigen Standort und
als Rasenersatz prachtvolle Teppiche bildet und	eignen sich auch zum Begrünen ganzer Flächen
mit unzähligen, weißen Sternblütchen besetzt ist.	u. für Einfassungen. An genügend feuchten Stellen
3 cm VI-VII 0.25	gedeihen sie aber auch in voller Sonne. V-VI
- aurea. Goldgelbblättrige Form der vorigen.	- bronchialis (Stelleriana). Ziemlich spätblühend, weiß 0.40
3 cm VI-VII 0.35	— Camposii. Großblumig, weiß. 30 cm 0.40
Sanguinaria, Blutwurz, Papaveraceae 🕽 – 🗈 🛆	— canaliculata. Große Polster bildend, weiß. 30 cm 0.40
- canadensis major. Die ziemlich großen, wurzelstän-	— ceratophylla. Siehe S. trifurcata.
digen Blätter sind herz-nierenförmig, blaugrün; die	- cuneata. Starkgeschlitztes Laubwerk, weiße Blüten 0.40
anemonenartigen Blumen weiß. 30 cm IV-V 1.50	— caespitosa lutescens (decipiens). Mit gelben Blü-
Santolina, Heiligenblume, Compositae O-∞ A:	ten. 20 cm
Bilden rundliche, immergrüne Büsche mit zypressen-	— Sternbergii. Kleinblumig, weiß. 20 cm 0.40
ähnlicher aromatischer Belaubung und runden	— — villosa. Etwas wollige Blätter, weiße Blüten. 10 cm 0.40
Blütenköpsen. 20-30 cm VII-VIII	- hybr. Astrild. Siehe Neuheiten 0.80
- caespitosa. Aschgrau belaubte, selt. Zwergsorte. 20 cm 0.80	— — Bees Pink. Siehe Neuheiten 0.80
- chamaecyparissus. Immergrüne, silbergraue Belaub.	— — Blütenteppich. Bildet dichte Polster, die den
und gelbe Blütenköpfe. 30 cm	Eindruck eines blumigen Teppichs machen, leuch-
— lindavica. Mit sattgelben Blumen, 30 cm 0.60	tend karminrosa. 10 cm
- pinnata: Feingefiederte, grüne Belaubung, schwesel-	— — grandiflora alba. Große, edle Blumen von
gelbe Blütenköpfe. 30 cm 0.40	reinweißer Färbung. 20 cm 0.40
— — alba. Weiße Blumen. 30 cm	Juwel. Farbe wie "splendens", aber um etwa
- Sündermannii, Silbergr., ganz niedrig bleib, Art. 20 cm 0.80	14 Tage später blühend. 20 cm 0.50

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Saxifraga (Fortsetzung) 1St.
Saxifraga caespitosa hybr. (Fortsetzung)	— cotyledon hortensis (pyramidalis). Bildet große, AM
— — magnifica. Kräftig und robust wachsend, sehr	bis 25 cm Durchmesser haltende Rosetten. Weiß
reichblühend, von schöner, frischer hellrosa Fär-	geränderte Blätter, pyramidale Blütenrispen von
	weißer Farbe. 30 cm 0.50
bung. 20 cm	vera. Mit mehr rundlichen Blättern wie die vor-
Purpurmantel. Große Blumen von einer ganz	otahanda Farm 20 am
eigenartig schönen karminrosa Färbung mit pur-	stehende Form. 20 cm 0.40
purnem Schein. 20 cm	- crustata. Dichte Rosetten weißkrustiger Blätter. Weiße
— — Rosakönigin. Diese späteste von allen moos-	Blütenrispen. 20 cm
artigen Saxifragasorten fällt durch kräftigen Wuchs	- Engleri. Weißberandete Blättchen, weiße Blüten 0.50
und klare, leuchtend rosa Farbe auf. 20 cm 0.50	- Grisebachii. Seltene Art aus Macedonien. Silbrig be-
rosea superba. Reichblühend, frisch karmin-	reifte Blattrosetten, rosa Blüten. 20 cm 1.—
rosa Blumen. 20 cm 0.40	- Hostii. Große silbergraue Rosetten, weißblühend. 30 cm 0.50
— — Schneeteppich. Die großen, edlen Blumen sind	— rnaetica. Rahmweiße Blüten. 20 cm
von reinweißer Farbe und sitzen auf den reichver-	- lingulata (Portae). Kleine, krustige Rosetten, weiße
zweigten Stielen so dicht gedrängt, daß während	Bluten. 10 cm
der Blütezeit die Belaub. völlig verschwindet. 20 cm 0.40	- lantoscana. Schmallaubige, weiß gerandete Ro-
Schöne von Ronsdorf. Großblumig, dunkel-	setten, weiße Bluten. 30 cm
rosa. 20 cm	- longitolia. Rosetten schmallanzettlicher, weiß bereiften
Schwefelblüte. Zeichnet sich durch eine matt-	Blatter und langer, reichverzweigter Risne weißer
schwefelgelbe Blütenfarbe aus. 15 cm 0.40	Bluten. 50 cm
splendens. Reichverzweigt, dunkelkarminrot.	- paradoxa. Silberig überkrustete Rosetten mit weißen
15 cm	Blütenrispen. 20 cm
— — Teppichkönigin. Zierliche Blumen frischrosa	- pectinata. Feine Rosettchen, Blättchen stark weiß
gefärbt, die niedrigste von allen caesp. Hybriden 0.50	berandet und gezahnt, weiße Blumen 10 am
T' D' Di'' Calaist air laught dumbles	- spathulata. Rundlich spatelförmige Blätter, Blüten
karmin, das im Verblühen nicht hell wird. 15 cm 0.50	weißlich. 25 cm
— groenlandica. Dunkelgrüne Belaub. mit weiß. Blüten 0.40	- robusta. Starkwüchsige Form der vorigen. 30 cm 0.50
	- Zimmeteri. Reizender Bastard mit kleinen Rosetten
- hypnoides angustifolia. Schmale, moosartige Belau-	und weißen Rispen 20 am
bung. Blüten weiß. 15 cm 0.40	und weißen Rispen. 20 cm 0.60
- densa. Weißblühend, rasenbildend, eine der	3. Polsterbildende Saxifragen ○- ● △ Sie bilden
besten Arten. 3 cm 0.40	graugrüne bis silbergraue, starke, feste Polster und
- muscosa. Feine moosartige Belaub., weiße Blüten 0.40	gehören zu den ersten Frühlingsboten. Ostlage, wo
- pulchella. Niedliche Form. Frischgrüne Belaubung,	sie die Morgensonne genie fan L''
weiße Blüten. 15 cm 0.40	sie die Morgensonne genießen können, sagt ihnen am
- pedatifida. Die unempfindlichste moosartige Saxi-	meisten zu. Bei genüg. Bodenfeuchtigkeit gedeihen
fraga. Frischgrünes Laub, weiße Blüten in großer	sie aber auch in voller Sonne. 5-10 cm. III-IV
Zahl. 20 cm 0.40	— apiculata. Dichte Polster kleiner, blaugrüner Blatt-
- Rhei. Leuchtend rosa Blüten. 10 cm 0.40	rosetten mit schönen, hellgelben Blüten 0.50
— — superba. Größer als vorige, sehr schön. 20 cm . 0.40	— Borisii. Hellgelb
- trifurcata. Kräftig wachsend mit einer Fülle weißer	- Boydii, Hijhsche gelbblijhende Halis
Blütchen. 20 cm	— Boydii. Hübsche gelbblühende Hybride 0.60
	— alba. Weißblühende Abart der vorigen 0.60
2. Rosettenbildende, krustige Saxifragen 🔾 🕸	— Burseriana. Kleine, dichte, graugrüne Polster, große
Sie bilden dachwurzähnliche Rosetten und	Diendendweiße Diumen
zeichnen sich durch ornamentales, meist silber-	indjoi. In anch Tellen etwas grober wie die
graues Laubwerk, sowie ziemlich große Blüten-	nergenende
stände aus. Sie vertragen, wenn erst einmal festge-	- Ellsdoellide. Mit hellschwetelgelben Bluman
wachsen, große Trockenheit V-VII	l'elamatiai Cobardi. Diente grangrine Poletan
- aizoon. Silbergraue Rosetten, weiße Blüten. 20 cm 0.40	gelben Blütchen 0.70
- alpicola. Prächtige Rosetten, gelblichweiße Blü-	- Haaqii, Zahlreiche, leuchtend gell, Dir.
ten. 20 cm	— Haagii. Zahlreiche, leuchtend gelbe Blüten 0.60 — hybr. L. G. Godseff. Dichte Polster mit großen
— atropurpurea. Mit dunkelroten Blüten. 20 cm 0.50	gelben Blüten
— balcana. Weißblühend. 20 cm 0.40	gelben Blüten
— elongata. Langgestreckte Blättch., weiß. Blüt. 20 cm 0.40	1 — Wirs. Leng. Hubscher Bastard mit well Div.
— erecta. Aufrecht wachs. Form. Weiße Blüt. 20 cm 0.50	NOIDII. W CIMUIUICIU, ZIEFIICII
— lutea. Gelbblühend. 20 cm 0.50	- Noiscivi. Gelobiunende Zwergsorta
— marginata. Sehr zierlich, stark krustig, weißblü-	Indigital Carria Girlara (DOLVI), Silbricare 11.
hend. 10 cm	1 dister, weiße Diutchen
	- Roulelland. Meine teste Polster weißlin
— minor. Sehr schöne Zwergform, weißblüh. 10 cm 0.40	1 Odiloloddd, 11chgerbe Dillren
— robusta. Besond. große Rosetten, weiße Blüt. 20 cm 0.40	Depositional dans incur, Affects, mit purpose plus
— rosea. Rosablühend. 20 cm	
— rosularis. Rosenförmige Rosett., Blüt. weiß. 20 cm 0.40	— latina. Reichblühende Form, mit purpurnen Blüten 0.76
- sturmiana. Niedliche Zwergform, zierlich bekrustet,	—— splendens. Niedrige Polster mit level (*)
weiße Blüten. 10 cm	spicifically in the state of th
- altissima. Ähnlich S. Hostii, Blätter spitz gesägt,	Totel Didten
Blüten weiß. 20 cm	- Superpa. Großblumige, dunkelrete Al
- Andrewsii. Saftiggrüne Blattrosetten, weiße Blüten 0.40	
- catalonica. Schön bekrustete spanische Art mit weißen	period attention of the the plant of the pla
Blüten. 20 cm	
- cochlearis. Kleine löffelförmige Blätter und weiße	- sancta. Harte Sorte mit stachelig spitzen, dunkel-
Blüten. 10 cm	grunen i bistern u. leucht, gelben Blütensträufen 06
minor Zwergform der vorigen, 5 cm 0.60	- scardica. Großblumig, weiß

	Sodum album (Fontsotzung) 1St.
4. Verschiedenblättrige Saxifragen ① △ : 1St. R.M.	Seduli dibuli (Fortsetzung)
Sie bilden meist immergrüne, kräftige, lockere	— micranthum. Frischgrüne, sehr zierliche Blättchen, weiße Blüten. 5 cm
Polster und bringen lockere Blütenstände. Bevor-	— murale. Mit dunkelroten Blättern u. rosa Blüten.
zugen halbschattigen Standort od. sonnige, feuchte Lagen V-VI	10 cm
Saxifraga apennina. Immergrüne, lederartige Belaubung	— anacampseros. Blaugrüne Blätter u. purpurne Blum.
und rosaweiße Blüten. 25 cm 0.50	20 cm
- cordifolia und crassifolia. Siehe unter Bergenia.	— anglicum. Sehr kleine, dickliche Blättchen und rosa Blütchen. 5 cm
- Fortunei. Siebenlappige gezähnte, auf der Unterseite	- corsicum (dasyphyllum). Sehr niedliche, bläulichgrüne
schön rot gefärbte Blätter und schleierkrautartige	Zwergform. 5 cm
Blütenstände. 30 cm	- Forsterianum. Rötlichgraue Belaub., gelbe Blum. 20 cm 0.40
weiß, immergrün. 25 cm	— gracile. Niedliches Pflänzchen mit bläulichgrüner Be-
- hirsuta. Rundliche, behaarte Blättchen, rosaweiße	laubung und weißen Blütchen. 5 cm 0.40 — Hildebrandii, Sehr zierliche Polster bildend. 5 cm 0.40
Blütchen, immergrün. 20 cm	- laconicum. Dicke, runde Blätter, weiße Blüten. 10 cm 0.30
granulata fl. pl. Knollenbildende Art mit weißgefüllten	— minor. Sehr zierlich. 10 cm 0.40
Blumen, ähnlich kleinen gefüllten Levkojen 0.50 — heucheriloba. Heucheraähnliche, rote Blüten, immer-	- lydium. Grüne Polster, im Winter rot. 5 cm 0.30
grün. 20 cm	— — aureum. Laub gelbbläulich. 5 cm 0.40
— — alba. Weißblühende Form. 20 cm 0.50	— glaucum. Blaugrüne Polster. 5 cm 0.30
- rotundifolia. Herzförmig rundliche Blätter und weiße	- nicaeense (ochroleucum). Schlangenmoosähnliche Belaubung, gelbe Blüten. 20 cm
Blütenrispen. 30 cm 0.40	- reflexum. Blaugrüne, spitzpfriemliche Blätter u. gelbe
— umbrosa. Immergrüne Blattrosetten mit weißen Blüten- ständen. 25 cm 0.30	Blüten. 20 cm
— — aurea punctata. Mit gelb punktiert. Belaub. 20 cm 0.40	- monstrosum. Starkwüchsige Form mit gedrehten
— — — robusta. Eine in allen Teilen starkwüch-	Trieben, dunkelgrüne Blattfarbe. 20 cm 0.30
sigere Form, Blätter gelb punktiert. 30 cm 0.40	— virescens. Saftiggrüne Belaub., gelbe Blüt. 15 cm 0.30 — rupestre. Ähnlich vorigem, aber nicht ganz so kräftig
- Elliott's var. Reizende Spielart des bekannten Por-	wachsend. 10 cm
zellan- oder Jesusblümchens mit kleinen leuchtend rosa Blütchen. 20 cm 0.50	- sarmentosum. Blaßgelbe Belaubung. 5 cm 0.40
— primuloides. Mit primelartigen Blüten. 20 cm . 0.40	- saxangulare. Rasenbild., f. trockene Lagen, mit feiner,
Scabiosa, Zwergskabiose, Dipsacaceae O A	grüner Belaub., übersät mit hellgelben Blüt. 5 cm 0.25
— lucida. Zierliche Alpenpflanze mit dunkelgrünen Blatt-	— spurium. Rosablühend, im Schatten sowohl wie in der grellsten Sonne gut gedeihend. 10 cm 0.25
rosetten und lilablauen Blütchen. 15 cm VII-VIII 0.40	— album. Weißblühend. 10 cm
— graminifolia. Silbergraue, grasartige Belaubung und	— — superbum. Siehe Neuheiten 0.50
hellblaue Blüten. 30 cm VII-VIII 0.50 — Parnassii. Siehe Pterocephalus.	roseum superbum. Großblumigste aller spurium
— silenifolia. Rundblättrige Blattpolster, blaue Blüten.	Sorten. Die Blüten sind reinrosa. 10 cm 0.50
20 cm. Selten VII-VIII 0.60	— salmoneum. Blüten leucht. rot mit lachsfarbigem Schein. 10 cm
- vestina. Schmales Laub, blaue Blüt. 20 cm VI-VIII 0.70	— Schorbusser Blut. Mit prächtig dunkelblutroten
Schivereckia, Entenkresse, Cruciferae O A	Bliiten, 10 cm
— podolica (Alyssum pod.). Zierliche, behaarte rosettige	— splendens. Dunkelrote Blumen, dunkelrote Frucht-
Polster mit kleinen weißen, arabisartigen Blüten. 15 cm V-VI 0.40	kapseln. 10 cm
Scutellaria, Schildkraut, Labiatae ○ △	— Stribny. Moosartige Belaubung, gelbe Blüten. 5 cm. 0.40
— alpina. Prächtige Zwerglabiate mit lilablauen Blüten-	— Sündermannii. Zwergige, blaugrüne Art mit weißen
ähren. 20 cm VII-VIII 0.40	Blüten. 5 cm 0.40
- alba. Weiße Form der vorigen. 20 cm VII-VIII 0.50	- turgidum. Kleine rotbraune Blättchen, weiße Blüten . 0.30
- rosea. Mit schönen lilarosa Blüten. 20 cm 0.50	— Verlotti. Kleine, nadelförmige Blättchen, gelbe Blüten 0.40
— amana. Sehr reichblühend, lilablau. 10 cm VII-VIII 0.50 — orientalis alpina. Herrliche, viele Sommermonate blü-	2. Buschige Sedum, Fettblatt ○ ∞ : △
hende Felsenpflanze von kriechendem Wuchs, silber-	Bilden meist rundliche Büsche mit gekerbten, dick-
grauer Belaubung und gelben Lippenblüten, die in	fleischigen Blättchen, welche im zeitigen Herbst
großer Menge erscheinen. 15 cm VI-VIII 0.50	eine herrliche Herbstfärbung annehmen. Sehr reichblühend VI-VIII
— pinnatifida. Stark gefiederte, wollige Belaubung.	— aizoon minor. Mit leuchtend gelben Blumen. 20 cm . 0.30
Blüten hellgelb. 15 cm VI-VIII 0.60 Sedum, Crassulaceae ○ ∞ △ : Überall sehr leicht	— cyaneum (Hayesii). Graugrüne Blattrosetten, ähnlich
wachsende, formenreiche, niedrig bleibende, dick-	Ewersii. 15 cm. Selten! 0.40
blättrige Pflanzen, die sämtlich große Trockenheit	— Ewersii. Rosa, sehr spätblühend. 10 cm 0.30
vertragen. Ihrer großen Anspruchslosigkeit wegen	— turkestanicum. Kräftiger als die Stammart, dunkel-
sind sie besonders für Trockenmauern wie ge-	rosa Blüten. 10 cm
schaffen. In Anbetracht unseres großen Sortiments haben wir zwei Abteilungen geschaffen, um so	ovalspatelige Blätter, gelbblühend. 15 cm 0.30
unserer Kundschaft die Auswahl zu erleichtern.	- floriferum. Gezackte Blättchen u. goldgelbe Blüt. 20 cm 0.30
1. Moosartige Sedum, Sonnenmoos ○ ○ △ △ □	— praecox. 14 Tage früher blühend als vorige. 20 cm 0.30
Kriechende, meist nadelartige, feste Polster bildende	— Hartmannii. Aufrechtwachsend, stumpfgraue Belaub.
Fettpflanzen, die sich zum Begrünen ganzer Flächen	Blumen weiß, 15 cm 0.30
eignen, gleichzeitig aber auch die geborenen Trocken-	 hybridum. Echt. Herrliche sich im Winter knallrot f\u00e4rbende Art mit goldgelben Bl\u00fcten. 20 cm 0.40
mauerstauden sind V-VII	- kamtschaticum. Gelb, rundl., gekerbte Blättch. 20 cm 0.30
— acre. Gelbblühender Mauerpfeffer. 5-15 cm 0.25 — elegans. Im Winter silberbunt. 5 cm 0.40	— fol. var. Buntblättrige Art. 20 cm 0.30
— album. Zierliche weißblühende Art. 20 cm 0.30	— Laggeri. Kräftig wachsende Art, gelbe Dolden. 25 cm 0.40

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Sempervivum (Fortsetzung)
Sedum (Fortsetzung)	— capaonicense. Große dunkelbraungrüne Rosetten u.
macrophyllum atropurpureum. Große, dickfleischige,	gelbe Blumen
dunkelrote Belaubung und gelbe Blüten. 30 cm . 0.40 — Middendorffianum. Blätter lineal lanzettlich, bräun-	Tunckii (dolollilliculli). Rosetten von frischeringen
lich, Blüten gelb. 25 cm 0.30	Farbe, Blumen rötlich 0.30 — glaucum. Blaugrüne Rosetten, hellrote Blüten 0.30 — bybr Alpha Rosetten
— diffusum. Lichtgelbe Blüten und grüne, schmale	- hybr. Alpha. Rosetten von hellbräunlicher Farbe mit
Blätter. 25 cm	weiß behaarter Mitte. Blüten rosa 0.40
tenuifolium. Ganz fein belaubt, Blum. orangegelb 0.30	- Deld. Kurze, straffe braune Blätter, von denen sich
- obtusifolium. Eigenartig dicke, bräunlich schimmernde	der weiße Flaum gut abhebt. Blitten dunkelrage 040
Blätter, sehr schön. 10 cm 0.40	- Odiffild. Die Rosetten sind im Frijhling von fact
— virens. Grüne Belaubung, gelbe Blüten. 10 cm . 0.40	schwarzbrauner rarbe, in der Mitte weiß ihen
- populifolium. Pappelblättrig, weißblühend. 20 cm . 0.40	sponnen. Bluten purpurrosa
- Sieboldii. Niederliegend, blaugraue Belaubung, Blüten	- Rdulliell, Siene Neuheiten
rot. Sehr spätblühend. 20 cm 0.40	— metallicum giganteum. Siehe Neuheiten
 fol. varieg. Herrliche buntblättrige Form. 20 cm 0.50 spathulifolium. Höchst interessante dickfleischige rote 	Reginde Amande. Großestig Blatter acht.
Belaubung, gelbblühend. 10 cm 0.50	mit braunen Spitzen. Blüten gelb 0.50 — ruthenicum. Rosetten weichgrün; die großen Blumen
- virens. Hellsaftiggrüne Belaub., gelbe Blüten. 10 cm 0.50	von leucht. grüngelber Farbe, m. gelb. Staubfäden 0.30
Selaginella, Mooskraut, Lycopodiaceae → • • • ·	- tectorum. Die gewöhnliche, auf Dächern vorkommende
Die harten Selaginellen sind auch im Winter frisch-	Art mit großen, dunkelgrunen Roseften und
grüne, moosartige Pflanzen, die unseren Gewächs-	Total Diuten
haus-Selaginellen täuschend ähneln. Sie lieben	Dicolor. Rosetten zwellarpig rot und base
feuchten, humosen Boden und halbschattige Lagen.	Dylicitatedin. Diwas Riciner wie die Cha-
- Douglasii. Bräunlich grün, mit zierlich. Blütenährchen.	braumen gerarbten Rosetten
3-5 cm VII-VIII 0.40	TOOGSTOTH, OTORIC ROSCITED mit and
— helvetica. Mit längeren Zweigen u. größeren Blüten-	
ährchen. 3–5 cm VII-VIII 0.40 — Underwoodii. Dunkelgrüne, moosartige Belaubung . 0.60	
Sempervivum, Dachwurz, Hauslauch, Crassulaceae	triste. Rötlichbraune Belaubung, dunkelrosa Blüten . 0.40 Senecio, Zwergkreuzkraut, Compositae ○ △
O ∞ Δ	— abrotanifolius. Große, dunkelgrüne, fein gefiederte
Anspruchslose Fettpflanzen mit dickblättrigen	Diatipolistici, geine Dillen /II om
Rosetten von hell- und graugrüner, silbergrauer,	adolitationas. Feingened., hellgrine Relaul 11.
brauner und rötlicher Farbe. Aus ihnen erheben	
sich die Stiele mit flachen gelben oder roten Blüten.	Cal particus. Grune Polster, orangerote Plan
10-20 cm VII-VIII	
Kleinrosettige Sorten.	Sieginiculi. Telli genederte, aschemana Di
- arachnoideum. Mit weißen Fäden übersponnene,	
bräunlichgrüne Rosetten. Blüten rosa 0.30 — minor. Zwergausgabe obiger 0.30	monorisis. Ochi Telli genederta Rista
- tomentosum. Rosetten schneeweiß übersponnen . 0.30	bigen Blütenköpfen. 30 cm VI-VII 0.60 Seseli, Steppenkraut, Umbelliferae 0 0 0
- arenarium. Saftig grün, mit gelben Blüten 0.30	in the state of th
	- Cdespilosuili, Blaugrane fair and 11'
- bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70	- Cdespilosuili, Blaugrane fair and 11'
- bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50
bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae (20 cm.)
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae galacifolia. Seltene Staude mit ledensetie.
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae 0.00000000000000000000000000000000000
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae O— △ — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae ○ ○ △ — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten.
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae O— △ — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae ○ ○ △ — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Utter
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen frübrot 0.30 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae O— △ — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae ○ ○ △ — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge.
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen Irübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae O— △ — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae ○ ○ △ — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge. 30 cm
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen frübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tiefbraun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae O— △ — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae ○ ○ △ — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge. 30 cm VII-VIII 0.50 Silene, Leimkraut, Caryophyllaceae ○— ○ △ — acaulis. Bildet dichte moosart. Polster, kleine, leuchtend rosar. Blüten auf 1 cm hohen Stielden.
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen frübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tief braun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae O— △ — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae ○ ○ △ — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge. 30 cm VII-VIII 0.50 Silene, Leimkraut, Caryophyllaceae ○ — ① △ — acaulis. Bildet dichte moosart. Polster, kleine, leuchtend rosar. Blüten auf 1 cm hohen Stielchen. IV-VIII 0.50 — alba. Weißblühende Art
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen frübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tief braun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten 0.30 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae → △ — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae ○ ○ △ — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge. 30 cm VII-VIII 0.50 — acaulis. Bildet dichte moosart. Polster, kleine, leuchtend rosar. Blüten auf 1 cm hohen Stielchen. IV-VIII 0.50 — alba. Weißblühende Art
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen frübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tief braun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten . 0.30 spinulifolium. Kleine, rosa Rosetten, rote Blüten 0.30 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae → △ — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae ○ ○ △ — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge. 30 cm VII-VIII 0.50 — acaulis. Bildet dichte moosart. Polster, kleine, leuchtend rosar. Blüten auf 1 cm hohen Stielchen. IV-VIII 0.50 — alba. Weißblühende Art
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen frübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tief braun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten . 0.30 spinulifolium. Kleine, rosa Rosetten, rote Blüten . 0.30 Mittelgroß- und großrosettige Sorten. 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae → △ — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae ○ ○ △ — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge. 30 cm VII-VIII 0.50 — acaulis. Bildet dichte moosart. Polster, kleine, leuchtend rosar. Blüten auf 1 cm hohen Stielchen. IV-VIII 0.50 — alba. Weißblühende Art
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen frübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tief braun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten . 0.30 spinulifolium. Kleine, rosa Rosetten, rote Blüten . 0.30 Mittelgroß- und großrosettige Sorten. alpinum. Bläulichgrüne, an der Basis rote Rosetten, 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten . 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen frübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tief braun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten . 0.30 spinulifolium. Kleine, rosa Rosetten, rote Blüten . 0.30 Mittelgroß- und großrosettige Sorten. alpinum. Bläulichgrüne, an der Basis rote Rosetten, Spitzen braun 0.30 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten . 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen frübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tief braun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten . 0.30 spinulifolium. Kleine, rosa Rosetten, rote Blüten . 0.30 Mittelgroß- und großrosettige Sorten. alpinum. Bläulichgrüne, an der Basis rote Rosetten, Spitzen braun 0.30 atropurpureum. Große violettrote Rosett., gelbe Blüt. 0.40 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae O— △ — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae ○ ∞ △ — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge. 30 cm. VII-VIII 0.50 — acaulis. Bildet dichte moosart. Polster, kleine, leuchtend rosar. Blüten auf 1 cm hohen Stielchen. IV-VIII 0.50 — alba. Weißblühende Art
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten . 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen frübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tiefbraun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten 0.30 spinulifolium. Kleine, rosa Rosetten, rote Blüten . 0.30 Mittelgroß- und großrosettige Sorten. alpinum. Bläulichgrüne, an der Basis rote Rosetten, Spitzen braun 0.30 atropurpureum. Große violettrote Rosett., gelbe Blüt. 0.40 atrosanguineum. Dunkelblutrote Rosetten 0.30 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten . 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen frübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tief braun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten . 0.30 spinulifolium. Kleine, rosa Rosetten, rote Blüten . 0.30 Mittelgroß- und großrosettige Sorten. alpinum. Bläulichgrüne, an der Basis rote Rosetten, Spitzen braun 0.30 atropurpureum. Große violettrote Rosett., gelbe Blüt. 0.40 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten . 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen frübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tief braun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten 0.30 spinulifolium. Kleine, rosa Rosetten, rote Blüten . 0.30 Mittelgroß- und großrosettige Sorten. alpinum. Bläulichgrüne, an der Basis rote Rosetten, Spitzen braun 0.30 atropurpureum. Große violettrote Rosett., gelbe Blüt. 0.40 atrosanguineum. Dunkelblutrote Rosetten 0.30 atroviolaceum. Sehr große Rosetten von herrlich braunvioletter Farbe. Blüten braunrot 0.40 blandum (rubicundum). Eigenartig schöne, bräunlich 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge. 30 cm. VII-VIII 0.50 — acaulis. Bildet dichte moosart. Polster, kleine, leuchtend rosar. Blüten auf 1 cm hohen Stielchen. IV-VIII 0.50 — alba. Weißblühende Art. IV-VIII 0.60 — excapa. Zierliche, feinblättrige Form, schöne Polster bildend. hellrosenrot. V-VIII 0.60 — ofl. pl. Gefüllt blühende Form. IV-VIII 0.70 — grandiflora. Lockerer Wuchs, große, rote Blüten. V-VIII 0.70 — alpestris. Reichblühend, Blumen zierlich gefranst, weiß. 15 cm. V-VII 0.40 — fl. pl. Hübsche, gefüllte Abart der vorigen. 15 cm. V-VII 0.50 — maritima plena. Niederliegende Büzel.
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten . 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen Irübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tief braun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten 0.30 spinulifolium. Kleine, rosa Rosetten, rote Blüten . 0.30 mittelgroß- und großrosettige Sorten. alpinum. Bläulichgrüne, an der Basis rote Rosetten, Spitzen braun 0.30 atropurpureum. Große violettrote Rosett., gelbe Blüt. 0.40 atrosanguineum. Dunkelblutrote Rosetten 0.30 atroviolaceum. Sehr große Rosetten von herrlich braunvioletter Farbe. Blüten braunrot 0.40 blandum (rubicundum). Eigenartig schöne, bräunlich glänzende Rosetten mit grünen Blattspitzen und 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge. 30 cm. VII-VIII 0.50 — acaulis. Bildet dichte moosart. Polster, kleine, leuchtend rosar. Blüten auf 1 cm hohen Stielchen. IV-VIII 0.50 — alba. Weißblühende Art. IV-VIII 0.60 — excapa. Zierliche, feinblättrige Form, schöne Polster bildend. hellrosenrot. V-VIII 0.60 — ofl. pl. Gefüllt blühende Form. IV-VIII 0.70 — grandiflora. Lockerer Wuchs, große, rote Blüten. V-VIII 0.70 — alpestris. Reichblühend, Blumen zierlich gefranst, weiß. 15 cm. V-VII 0.40 — fl. pl. Hübsche, gefüllte Abart der vorigen. V-VII 0.50 — maritima plena. Niederliegende Büsche mit Nadelförmiger Belaubung, weiße dichte Gille int Nadelförmiger Belaubung, weiße dichte Gille.
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten . 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen trübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tief braun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten . 0.30 spinulifolium. Kleine, rosa Rosetten, rote Blüten . 0.30 Mittelgroß- und großrosettige Sorten. alpinum. Bläulichgrüne, an der Basis rote Rosetten, Spitzen braun 0.30 atropurpureum. Große violettrote Rosett., gelbe Blüt. 0.40 atrosanguineum. Dunkelblutrote Rosetten 0.30 atroviolaceum. Sehr große Rosetten von herrlich braunvioletter Farbe. Blüten braunrot 0.40 blandum (rubicundum). Eigenartig schöne, bräunlich glänzende Rosetten mit grünen Blattspitzen und -Rändern, Blüte rötlich 0.40 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae — △ galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae ○ ∞ △ — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge. 30 cm. VII-VIII 0.50 — acaulis. Bildet dichte moosart. Polster, kleine, leuchtend rosar. Blüten auf 1 cm hohen Stielchen. IV-VIII 0.50 — alba. Weißblühende Art. IV-VIII 0.60 — excapa. Zierliche, feinblättrige Form, schöne Polster bildend. hellrosenrot. V-VIII 0.60 — fl. pl. Gefüllt blühende Form. IV-VIII 0.70 — grandiflora. Lockerer Wuchs, große, rote Blüten. V-VIII 0.70 — alpestris. Reichblühend, Blumen zierlich gefranst, weiß. 15 cm. V-VII 0.40 — fl. pl. Hübsche, gefüllte Abart der vorigen. — maritima plena. Niederliegende Büsche mit Nadelförmiger Belaubung, weiße, dichtgefüllte Blüten von nelkenähnlicher Form. 15 cm.
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten . 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen frübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tief braun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten 0.30 spinulifolium. Kleine, rosa Rosetten, rote Blüten . 0.30 spinulifolium. Bläulichgrüne, an der Basis rote Rosetten, Spitzen braun 0.30 atropurpureum. Große violettrote Rosett., gelbe Blüt. 0.40 atrosanguineum. Dunkelblutrote Rosetten 0.30 atroviolaceum. Sehr große Rosetten von herrlich braunvioletter Farbe. Blüten braunrot 0.40 blandum (rubicundum). Eigenartig schöne, bräunlich glänzende Rosetten mit grünen Blattspitzen und -Rändern, Blüte rötlich 0.40 giganteum. Große Rosett., Spitzen rot, Blum. gelb 0.40 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge. 30 cm. VII-VIII 0.50 — acaulis. Bildet dichte moosart. Polster, kleine, leuchtend rosar. Blüten auf 1 cm hohen Stielchen. IV-VIII 0.50 — alba. Weißblühende Art IV-VII 0.60 — excapa. Zierliche, feinblättrige Form, schöne Polster bildend. hellrosenrot V-VIII 0.60 — fl. pl. Gefüllt blühende Form IV-VIII 0.70 — grandiflora. Lockerer Wuchs, große, rote Blüten
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen trübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tiefbraun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten 0.30 spinulifolium. Kleine, rosa Rosetten, rote Blüten 0.30 spinulifolium. Bläulichgrüne, an der Basis rote Rosetten, Spitzen braun 0.30 atropurpureum. Große violettrote Rosett., gelbe Blüt. 0.40 atrosanguineum. Dunkelblutrote Rosetten 0.30 atroviolaceum. Sehr große Rosetten von herrlich braunvioletter Farbe. Blüten braunrot 0.40 blandum (rubicundum). Eigenartig schöne, bräunlich glänzende Rosetten mit grünen Blattspitzen und -Rändern, Blüte rötlich 0.40 Boissieri. Grünlaubig, mit roten Blüten 0.30 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae → △ — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae ○ ○ △ — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge. 30 cm VII-VIII 0.50 — acaulis. Bildet dichte moosart. Polster, kleine, leuchtend rosar. Blüten auf 1 cm hohen Stielchen. IV-VIII 0.50 — alba. Weißblühende Art IV-VII 0.60 — excapa. Zierliche, feinblättrige Form, schöne Polster bildend. hellrosenrot V-VIII 0.60 — fl. pl. Gefüllt blühende Form IV-VIII 0.70 — grandiflora. Lockerer Wuchs, große, rote Blüten V-VIII 0.70 — alpestris. Reichblühend, Blumen zierlich gefranst, weiß. 15 cm V-VII 0.40 — fl. pl. Hübsche, gefüllte Abart der vorigen. 15 cm V-VII 0.50 — maritima plena. Niederliegende Büsche mit Nadelförmiger Belaubung, weiße, dichtgefüllte Blüten von nelkenähnlicher Form. 15 cm VI-VIII 0.60 — rosea. Einfachblühend, großblumig, zartrosa.
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten. 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.50 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen Irübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tiefbraun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten . 0.30 spinulifolium. Kleine, rosa Rosetten, rote Blüten . 0.30 Mittelgroß- und großrosettige Sorten. alpinum. Bläulichgrüne, an der Basis rote Rosetten, Spitzen braun 0.30 atropurpureum. Große violettrote Rosett., gelbe Blüt. 0.40 atrosanguineum. Dunkelblutrote Rosetten von herrlich braunvioletter Farbe. Blüten braunrot 0.40 blandum (rubicundum). Eigenartig schöne, bräunlich glänzende Rosetten mit grünen Blattspitzen und -Rändern, Blüte rötlich 0.40 Boissieri. Grünlaubig, mit roten Blüten 0.30 Borisii. Siehe Neuheiten 0.80 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae → △ — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae ○ ○ △ — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge. 30 cm. VII-VIII 0.50 — acaulis. Bildet dichte moosart. Polster, kleine, leuchtend rosar. Blüten auf 1 cm hohen Stielchen. IV-VIII 0.50 — alba. Weißblühende Art IV-VIII 0.60 — excapa. Zierliche, feinblättrige Form, schöne Polster bildend. hellrosenrot V-VIII 0.60 — ofl. pl. Gefüllt blühende Form IV-VIII 0.70 — grandiflora. Lockerer Wuchs, große, rote Blüten V-VIII 0.70 — alpestris. Reichblühend, Blumen zierlich gefranst, weiß. 15 cm. V-VII 0.40 — fl. pl. Hübsche, gefüllte Abart der vorigen. 15 cm. V-VII 0.50 — maritima plena. Niederliegende Büsche mit Nadelförmiger Belaubung, weiße, dichtgefüllte Blüten von nelkenähnlicher Form. 15 cm. VI-VIII 0.60 — rosea. Einfachblühend, großblumig, zartrosa. 15 cm. VI-VIII 0.60 — rosea. Einfachblühend, großblumig, zartrosa. 15 cm. VI-VIII 0.60 — pusilla. Kleine dichte Polsterchen und weiße. Plizzen.
 bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70 Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30 fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30 globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30 Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30 montanum. Rosetten grün, Blumen trübrot 0.30 penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30 Pittonii. Tiefbraun, schwarzbraune Spitzen 0.30 pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30 soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten 0.30 spinulifolium. Kleine, rosa Rosetten, rote Blüten 0.30 spinulifolium. Bläulichgrüne, an der Basis rote Rosetten, Spitzen braun 0.30 atropurpureum. Große violettrote Rosett., gelbe Blüt. 0.40 atrosanguineum. Dunkelblutrote Rosetten 0.30 atroviolaceum. Sehr große Rosetten von herrlich braunvioletter Farbe. Blüten braunrot 0.40 blandum (rubicundum). Eigenartig schöne, bräunlich glänzende Rosetten mit grünen Blattspitzen und -Rändern, Blüte rötlich 0.40 Boissieri. Grünlaubig, mit roten Blüten 0.30 	kleinen, weißen Blütendolden. 20 cm. VI-VII 0.50 Sesleria. Siehe unter Ziergräser. Shortia, Schortie, Diapensiaceae — galacifolia. Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blätt. u. weißen Blüten. 15 cm VI-VIII 4.— Sideritis, Gliedkraut, Labiatae — euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien und Hänge. 30 cm. VII-VIII 0.50 — acaulis. Bildet dichte moosart. Polster, kleine, leuchtend rosar. Blüten auf 1 cm hohen Stielchen. IV-VIII 0.50 — alba. Weißblühende Art IV-VII 0.60 — excapa. Zierliche, feinblättrige Form, schöne Polster bildend. hellrosenrot V-VIII 0.60 — fl. pl. Gefüllt blühende Form IV-VIII 0.70 — grandiflora. Lockerer Wuchs, große, rote Blüten

Silene (Fortsetzung)	Synthyris, Frühlingsschelle, Scrophulariaceae 1 - 1 St. R.M.
- rhomodantha. Kleine, lanzettliche Blättchen, weiße	— reniformis. An Wulfenia erinnernd, mit lederartigen,
Blütenpolster. 10 cm VI-VII 0.50	kerbzähnigen Blättern u. violetten Ährentrauben.
- saxifraga. Schöne weißliche Blütenkissen.	15 cm IV-V 0.70
20 cm VII-VIII 0.50	Tanacetum, Compositae ○ △
- Schaffa. Lockere rasenbildende Art mit leuchtend rosa-	— argenteum. Niedere, silberblättrige Büsche und gelbe
farbenen Blumen. 10 cm VII-VIII 0.40	Blüten. 20 cm. Selten V-VI 0.80
Thomassinii. Lockere Rasen mit weiß. Blütchen. 10 cm 0.60	Teucrium, Gamander, Labiatae O
Sisyrinchium, Binsenlille, Iridaceae O- A	— chamaedrys O : Niedriges immergrünes Sträuchlein
— anceps. Binsenlilie. Niedliche kleine Iridee mit gras- ähnlicher Belaubung und dunkelvioletten Blütchen.	mit rosa Lippenbl. im Sommer. Schöne Einfassungs- pflanze. Bester Buchsbaumersatz. 20 cm VII-VIII 0.25
20 cm V-VI 0.40	— cinereum ○ △ Weißlichgrau, kurz behaart, nadelart.
- bermudianum. Eine herrliche, den ganzen Sommer	Blättchen, weiße Blüten 10 cm VIII-IX 0.60
blühende amerikanische Zwergbinsenlilie mit leuch-	Thlaspi, Täschelkraut, Cruciferae ○ - ● △
tend blauen Blüten und grasartiger Belaubung.	- alpinum. Niedere Polster bildend, weiße Rispen.
25 cm VI-VIII 0.50	20 cm V-VI 0.50
— californicum. Ahnlich der vorigen, mit goldgelben Blüten. 20 cm VI-VIII 0.70	— montanum. Dichte Träubchen weißer Kreuzblüten. 8–10 cm V-VI 0.40
- chiloense. Grasartige Belaubung und gelbe Blüten.	Thymus, Thymian, Labiatae ○ △ ⊕ Ganz niedrige, krie-
20 cm VI-VIII 0.70	chende Polster oder kleine, rundliche Büsche bil-
— convolutum. Mit hellgelben Blüten. 20 cm VI-VIII 0.70	dende Gewächse mit sehr zierlichem, aromatisch
Soldanella, Alpenglöckchen, Primulaceae → △ △ ≃	duftenden Laubwerk, das während der Blütezeit
Höchst interessante Alpenpflanze mit lederartigen,	unter den zahlreichen Blüten fast verschwindet.
immergrünen, rundlichen Blättchen und zierlich ge-	Die kriechenden Arten eignen sich auch sehr gut
franste, nickende Blütenglöckchen. Verlangt moorig.	zum Bepflanzen ganzer Flächen VI-VIII — angustifolius. Schmallanzettliche Blättchen, rosa Blüt-
Boden und feuchte Lage, 5—10 cm . IV-V — alpina. Büschel kleiner, rundlich nierenförm. Blätter,	chen. 10 cm
aus denen sich gleich nach der Schneeschmelze	— azoricus. Moosgrüne Belaubung, rosa Blüten. 5 cm . 0.50
zahlreiche Blütenstiele mit Dolden zierlich ge-	— citriodorus argent. Silver-Queen. Weißbunte Art
franster, hängender, lila Glöckehen erheben 0.60	mit Zitronenduft. 20 cm
— minima. Ganz kleines Pflänzchen mit blauen Blütchen 0.60	— — aureis fol. var. Ahnlich T. citr. Silver Queen, je- doch mit goldbunter Belaubung und herrlichem
— montana. In allen Teilen derber und größer wie die vorhergehende und in Gärten leichter gedeihend . 0.70	Zitronenduft. 20 cm
— pindicola. Die großen, herzförmigen Blätter sind	— dalmaticus. Mit dicht., kurzen, lila Blütentraub. 10 cm 0.40
oberseits dunkelgrün, unterseits weißfilzig behaart.	— Doerfleri. Grau behaarte dichte Polster, rosa Blüten 0.50
Die hängenden, stark gefransten Blütenglöckehen	- Golden Duwarski. Kleine, rundliche Büsche bildend,
sind rosalila	gelbbuntblättrige Belaub., weißlila Blütchen. 10 cm 0.50 — herba barona. Kräftigwachsende und stark duftende
— pusilla. Niedliches Pflänzchen, m. weiß. Blütenglöckeh. 0.60	Art mit lilarosa Blüten. 15 cm
Solidago, Zwerggoldraute, Compositae ○ △ — brachystachya. Niedliche Büsche bildend, gelbe	— hirsutus. Behaarte, längliche Blättchen, rosa Blüt. 10 cm 0.50
Blütenrispen. 20 cm VII-IX 0.50	- hybr. Golden Dwarf. Goldgelbe Büsche bildend. 10 cm 0.50
— — robusta. Siehe Neuheiten 1.—	— Golden Fleece. Rundliche, goldgelbe Belaubung,
- multiradiata. Breitblättrige, nordamerikanische Art,	Blüten lilaweiß. 10 cm
mit goldgelben Rispen. 20 cm. Selten. VIII-IX 0.50	Marschallianus. Zierliche Ränkchen und schöne rote
Spergula pilifera. Siche Sagina subulata.	Blütchen. 5 cm
Stachys, Ziest, Labiatae O A	— membranaceus. Siehe Neuheiten
— corsica ∧ \(\text{\Omega} \) Graugr\(\text{ine} \) Graugr\(\text{ine} \) hellilafarbige Lippenbl\(\text{itchen.} \) 10 cm \(\text{cm} \) VII-VIII \(\text{0.50} \)	— Neicoffii. Grau behaarte kräftige Ranken, rosablühend 0.50
— discolor (nivea). Fingerl., aschgraue gesägte Blätter	— rotundifol. Purpurteppich. Siehe Neuheiten 0.60 — serpyllum albus. Dichte, frischgrüne Polster mit rein-
u. rahmweiße Lippenblüt. 20 cm. Selten VI-VII 0.60	weißen Lippenblümchen. 5 cm
- lanata : Kräftig wachsende Einfassungspflanze mit	— — aureus var. Mit goldbunter Belaub., rosa Blüt. 5 cm 0.50
schön., weißwoll., lanzettl. Blätt. 30 cm VI-VII 0.30	— carneus. Leuchtend rosa. 5 cm
Statice, Zwergstrandflieder, Plumbaginaceae O A	— coccineus. Die Blütchen sind von lebhafter roter
- auriculaefolia. Niedrige Blattrosetten mit reichver-	Färbung. 5 cm
zweigten rosalila Blütenständen. 20 cm VII-IX 0.50 — globulariaefolia. Rund, spatelblättrig, lilablühend.	Art mit rosafarbenen Blüten. 5 cm 0.40
20 cm VII-IX 0.50	splendens. Leuchtend rote Blüten. 5 cm 0.40
- incana pygmaea. Niedere Art mit großen, weißen	- Annie Hall. Dichte Polster mit zart fleischfarbig-
Blütenschirmen. 20 cm VII-IX 0.40	rosa Blüten. 5 cm
Symphiandra, Steinglocke, Campanulaceae O A	— zygus. Sehr starkwüchsig, frischgrün belaubt, Blüten rosa. 10 cm
— pendula. Langgestielte Wurzelblätter und große,	Tiarella, Schaumblüte, Saxifragaceae → → △
weiße, nickende Glockenblumen. 20 cm VII-VIII 0.70	- cordifolia. Steinbrechart mit herzförmigen Blättern
ymphytum, Beinheil, Borraginaceae ○ ≅ ①-●	und zierlichen, weißen Blüten in lockeren Rispen.
granditlorum. Eine überaus wertvolle Schattenstaude,	20 cm
die leider bisher noch wenig bekannt sein dürfte. Die frischgrünen Blätter überdecken mit Leichtig-	— americana. Rot und grün marmoriertes Blattwerk, im Frühjahr besonders schön. 30 cm 0.40
keit den Boden durch den kriechenden Wuchs der	Trachelium, Campanulaceae ○ △
Pflanze. Im Frühjahr erscheinen die gelblichweißen	- rumelicum. Auf niedlichen Trieben, mit dunkelgrünen,
Blüten in solcher Menge, daß sie das Laub voll-	glänzenden, ovalen Blättchen geschmückt, stehen
ständig überdecken u. als ein großer Blütenteppich	die hellblauen Röhrenblütchen in doldigen Köpfen.
erscheinen. 20 cm IV-V 0.40	10 cm , , , VII-VIII 0.80

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Veronica incana (Fortsetzung) 1 St.
Trifolium, Glücksklee, Leguminosae 🔾 🕮	— — rosea. Siehe Neuheiten
repens quadrifolium atropurpureum. Rein vier-	— Idillolla Konigsbiau. Rein enzianfarbene Bliten-
blätteriger Steinklee von dunkelblutroter Färbung.	rispen. 50 cm V-VI 040
Junge Pflanzen, in kleine Töpfe gebracht, lassen	— Die Perle, Leucht, amethystblau, 30 cm V-VII 0.60
sich sehr vorteilhaft als Glücksklee verkaufen. 10 cm V-VI 0.40	- Shirley blue. Leuchtend blaue, wüchsige Form.
Trillium, Waldlilie, Liliaceae () — () 🛆	- Irehane. Kriechende Art mit goldgelber Relau
- erectum. In Trachtu. Blütenreichtum wie Tr. grandifl.,	bung und blauen, blattwinkelständigen Blitten-
jedoch mit bräunlichroten Blüten. 30 cm.	traubchen. 15 cm V_VI 0.40
Selten V-VI 0.70	orientalis. Schöne blaue Blütenpolst. 10 cm V-VII 0.40
grandiflorum. Auf kräftigem Stiel sitzen endständig	repens. Kriechende, rasenbildende Art mit weißen Blütchen. 5 cm V-VI 0.30
quirlig, drei breiteiförmig zugespitzte Blätter, aus	- rnodopea. Sehr schönes, dunkelgrijnes rundliches
deren Mitte sich die schöne, große, dreiteilige weiße Blume entwickelt. 30 cm V-VII 0.80	Laubwerk, Blumen weiklich 5 cm Wil Will 250
Trollius, Trollblume, Ranunculaceae $\bigcirc - \bigcirc \triangle \cong$	spicala diplila. Zwergiorm mit blauen Blitenrienen
Siehe auch mittelhohe Stauden.	TO CIII
- pumilus. Niedliche Büsche bildend, mit geschlitztem	— Blauer Zwerg. Siehe Neuheiten
Laub und gelben Blumen. 30 cm V-VI 0.60	Dittemispe. Betten
Tunica, Felsennelke, Caryophyllaceae ○ ∞ △ II	losed Lind. Desonders tietdunkalnosa E:-1
- saxifraga. Zierliches, den ganzen Sommer blühendes	von lein glaubt man eine rosa Erika zu ach
Felsenpflänzchen mit kleinen, rosaweißen Blütchen. 30 cm VI-VIII 0.30	OU CIII
— alba plena. Siehe Neuheiten 0.80	— rubra. Siehe Neuheiten
- robusta fl. pl. Die Blüte ist bedeutend größer	tradoch. 20 cm
als die der Stammform und ist sehr gut gefüllt.	prostidia, Mit dunkelblauen Bliff 10 W WW.
Blütenfarbe zartrosa. Feines, nadelförmiges Laub.	- dlpd. Weikbluhend 10-15
20 cm VI-VIII 0.60 — superba plena. Siehe Neuheiten 0.80	coelestina. Lichtblau. 10-15 cm V-VII 0.40 coerulea. Leucht. blau. 10-15 cm V-VII 0.40
Tussilago. Siehe mittelhohe Stauden.	Dalling, Figenartic blank 1 'C
Umbilicus. Siehe Cotyledon.	Loudon blue. Siehe Nauhaitan
Uvularia, Zäpfchenkraut, Liliaceae → - • △	i de la
— grandiflora. Herrliche, seltene Staude mit nickenden	mit icucit. amethystolatien Rhit 15 Trarr
goldgelb., wachsartig. Blumen. 30 cm. V-VI 1.50	— — alba. Siehe Neuheiten
Valeriana, Zwergbaldrian, Valerianaceae ○ △ ≅	Waldstollia. Filt dunkelblauen Blitenfranken
- apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten.	50 cm V-VI 0.30
20 cm V-VI 0.50	Neu-Seeländ, Veronica A Sämflich Island
— arizonica. Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und niedlicher Belaubung. 5 cm	Transstraudici mit nijoschen Eriko al-1 1 Div.
- montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50	Tispen, Die verlangen geschutzten gen C. 1
— montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40	und eignen sich sehr gut zur Bendensten
 montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blüten- 	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit I.
 montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter
— montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 (— supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blüten- döldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter
— montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 — supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter Armsfrongii. Siehe Neuheiten Bidwilliae lilacina. Mit grohmustlagii. 1.50
— montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 — supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter — Armstrongii. Siehe Neuheiten — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm
— montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 — supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter — Armstrongii. Siehe Neuheiten — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm — Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm — Duxifolia. Niedere Form mit huvartisse Bl.
— montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 — supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter
 montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter — Armsfrongii. Siehe Neuheiten — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm — Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm — O.60 — buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung u. weißen Blüten. 30 cm — qlauca. Mit blauschimmernden B. L. L. 2000.
— montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 — supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter — Armsfrongii. Siehe Neuheiten — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm — 0.60 — Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm — 0.60 — buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung und weißen Blüten. 30 cm — glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm — 0.60 — carnosula. Zwergausgabe von V
— montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 — supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm 0.50 Veratrum. Siehe mittelhohe Stauden. Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae ○ △ : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter. VII-VIII — Armstrongii. Siehe Neuheiten. 1.50 — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm. 0.60 — buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung und weißen Blüten. 30 cm. 0.60 — carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm. 0.70 — coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm. 0.70
— montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 — supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter VII-VIII — Armstrongii. Siehe Neuheiten
— montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 — supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter VII-VIII — Armstrongii. Siehe Neuheiten
montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm 0.50 Veratrum. Siehe mittelhohe Stauden. Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae ○ △ :	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter
montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter
montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm 0.50 Veratrum. Siehe mittelhohe Stauden. Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae ○ △ ::	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter VII-VIII — Armstrongii. Siehe Neuheiten 1.50 — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm 0.60 — Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm 0.60 — buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung und weißen Blüten. 30 cm 0.60 — carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm 0.60 — coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm 0.60 — cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressenähnliche Belaubung. 40 cm 0.60 — glauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm 0.60 — epacridea. Mit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm 0.70 — Hectori. Mit zartrosa Blüten. 40 cm 0.70
montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter VII-VIII — Armsfrongii. Siehe Neuheiten VII-VIII — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm 0.60 — Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm 0.60 — buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung uweißen Blüten. 30 cm 0.60 — carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm 0.70 — coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm 0.60 — cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressenähnliche Belaubung. 40 cm 0.60 — glauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm 0.60 — depacridea. Mit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm 0.60 — Hectori. Mit zartrosa Blüten. 40 cm 0.60 — loganoides. Ähnlich nachgenannter, von noch graziöserem Aussehen. 20 cm 0.60
montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm 0.50 Veratrum. Siehe mittelhohe Stauden. Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae ○ △ :: □ Lockere Rasen oder aufrecht wachsende, niedrige Büsche bildende Dauergewächse von großer Widerstandsfähigkeit gegen Dürre mit end- oder blattwinkelständigen Blütentrauben. — Allionii. Kriech. Art, weiße Blüte. 5 cm. VI-VII 0.40 — armena. Nadelförmiges Laub, tiefblaue Blüten. 5 cm VI-VII 0.60 austriaca (Prenja). Schr starkwachs. Ehrenpreisart mit klarblauen Blumen. 30 cm V-VI 0.40 — caespitosa (saxatilis). Kleine, rundliche Blättchen und blaue Blüten. 5 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter
montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm 0.50 Veratrum. Siehe mittelhohe Stauden. Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae ○ △ ::	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter
montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter
montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter
montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter. VII-VIII — Armstrongii. Siehe Neuheiten. 1.50 — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm. 0.60 — Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm. 0.60 — buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung unweißen Blüten. 30 cm. 0.60 — carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm. 0.70 — coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm. 0.60 — cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressenähnliche Belaubung. 40 cm. 0.60 — glauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm. 0.60 — epacridea. Mit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm. 0.70 — Hectori. Mit zartrosa Blüten. 40 cm. 0.60 — loganoides. Ähnlich nachgenannter, von noch graziöserem Aussehen. 20 cm. 0.60 — lycopodioides. Grob moosartiger Wuchs und Belaubung. Blüten blau. 20 cm. 0.60 — monticola. Ähnlich pinguifolia. jedoch mit kleinerem Blattwerk. Blüten weißlichlila. 40 cm. 0.60 — pinguifolia. Blättch. kaum 12 mm lg. Blüten. 0.60 — pinguifolia. Blättch. kaum 12 mm lg. Blüten. 0.60 — pinguifolia. Blättch. kaum 12 mm lg. Blüten. 0.60
montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter — Armstrongii. Siehe Neuheiten — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm — 0.60 — Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm — 0.60 — buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung und weißen Blüten. 30 cm — 0.60 — carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm — 0.70 — coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm — 0.60 — cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressenähnliche Belaubung. 40 cm — 0.60 — glauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm — 0.60 — loganoides. Ähnlich nachgenannter, von noch graziöserem Aussehen. 20 cm — 1.060 — lycopodioides. Grob moosartiger Wuchs und Belaubung. Blüten blau. 20 cm — 0.60 — monticola. Ähnlich pinguifolia. jedoch mit kleinerem Blattwerk. Blüten weißlichlila. 40 cm — 0.60 — pinguifolia. Blättch. kaum 12 mm lg., Blüt. weiß. 40 cm — 0.60 — Iraversii. Blättchen 4 reihig, Blüten weiß, sehr zart.
montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter
montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm	und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter — Armstrongii. Siehe Neuheiten — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm — 0.60 — Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm — 0.60 — buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung und weißen Blüten. 30 cm — 0.60 — glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm — 0.60 — carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm — 0.70 — coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm — 0.60 — cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressenähnliche Belaubung. 40 cm — 0.60 — glauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm — 0.80 — epacridea. Mit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm — 0.70 — Hectori. Mit zartrosa Blüten. 40 cm — 0.60 — loganoides. Ähnlich nachgenannter, von noch graziöserem Aussehen. 20 cm — 0.60 — lycopodioides. Grob moosartiger Wuchs und Belaubung. Blüten blau. 20 cm — 0.60 — monticola. Ähnlich pinguifolia. jedoch mit kleinerem Blattwerk. Blüten weißlichlila. 40 cm — 0.60 — pinguifolia. Blättch. kaum 12 mm lg., Blüt. weiß. 40 cm — 0.60 — Iraversii. Blättchen 4 reihig. Blüten.

Vicia, Wicke, Leguminosae → △ 1St.	Viola (Fortsetzung) 1St.
— oroboides (lathyroides). Tiefdunkelblaue Blüten.	Verschiedene wertvolle Arten:
30 cm VI-VII 0.50 Vinca, Immergrün, Apocynaceae → ⊕ ⊕ Das bekannte	— Bertolinii. Schöne blaublühende Polster bildend. 15 cm.
immergrüne Gewächs unserer Wälder und seine	Selten IV-V 0.70
Abarten mit lederartiger Belaubung und bunten	biflora. Stumpf nierenförmige Blätter u. sehr zierliche, kleine, goldgelbe Blüten. 3 cm V-VI 0.50
Blüten im zeitigen Frühjahr. Herrliche Boden- bedeckungspflanze für schattige Lagen, wächst aber	- floraviensis. Hybride aus V. cornuta und V. rotho-
bei genügender Feuchtigkeit ebensogut an sonnigem	magensis mit weiß und blau gesprengelten Blüten. 10 cm V-VIII 0.50
Standort V-VI	— papilionacea (cucullata grandiflora). Pfingstveil-
— minor. Blaublühend. 10 cm	chen. Langgestielte, prächtig dunkelblaue Blüten.
— coerulea pl. Blaublühend, gefüllt. 10 cm 0.70	20 cm V-VI 0.30
— fl. alba. Weißblühend. 10 cm 0.40	— alba. Mit weißen Blumen. 20 cm V-VI 0.30 — purpurea. Prächtig purpurviolett, sehr großblumig.
— fol. aurea var. Goldbuntblättrig. 10 cm 0.40 — argenteis. Silberbuntblättrig. 10 cm 0.40	20 cm V-VI 0.40
— rotunditolia. Mit rundlichem Blattwerk. 10 cm . 0.40	Vilmorinii. Goldgelb blühend. 15 cm V-VI 0.50
— rubra. Rotblühend, einfach. 10 cm 0.40	Viola odorata, Wohlriechendes Veilchen, Violaceae
— — plena. Rotblühend, gefüllt. 10 cm 0.40 — major. Großblättrig, dunkelgrün, sehr üppiger Wuchs,	Sämtliche angeführten Sorten eignen sich auch
großblumig blau. 20 cm 0.40	vorzüglich zum Treiben III-IV und VIII-IX
— — acutiloba. Siehe Neuheiten	- Admiral Avellan. Purpurviolett, auf langen Stie-
— fol. variegatis. Weißbuntblättrig, blaublühend,	len. 20 cm
verlangt schwache Fichtenreiserdecke. 20 cm 0.40	form. 20 cm
Viola cornuta, Hornveilchen, Violaceae O: A Rasen-	— Deutsche Kaiserin. Blaugefüllt. 15 cm 0.60
artige, frischgrüne Büsche bildend m. groß. Veilchen- blumen während des ganzen Sommers. Sie verlangen	— — Donau. Große tiefblaue Blüten auf 16-18 cm hohen Stielen
zum guten Gedeihen nahrhaften Boden V-IX	— fl. alba. Weiß, großblumig. 15 cm
- Altona. Farbe cremegelb, in Wuchs und Blüh-	— Frau Schwarz. Sehr langstielig und großblumig, schwarzblau. 20 cm
willigkeit wie die bekannte Sorte "Hansa" 0.40 — alba. Mit schneeweißen Blumen den ganzen Sommer	— Hedwig Bernock. Außerordentlich reichblühend,
bedeckt. 15 cm 0.40	von tiefdunkelblauer Farbe
— G. Wermig. Die Blumen sind von wunderbarer	— Kaiser Friedrich. Großblumiges Treibveilchen, hellblau. 20 cm
veilchenblauer Farbe, so daß sie als Ersatz für Veilchenblumen vorzüglich zu verwenden sind 0.30	— Königin Charlotte. Kleinblumiges Veilchen. Reich-
- Hansa. Auf 15 cm langen Stielen sitzen große, in-	blütig und leicht treibbar. 15 cm
tensiv blaue Blumen in reicher Fülle 0.30 Irmgard Langer. Mit helleren Blüten. Sehr reich-	auf kräftigen Stielen. 20 cm
blühend. 20 cm	- Noelie. Außerordentlich reichblühend, blau. 20 cm 0.30
— Jackanapes. Siehe die Verbesserung "Spaßvogel" — Johanna Langer. Ähnlich V. c. Gustav Wermig,	— Princesse de Galles. Großblumig, samtblau. 20 cm 0.30 — Riese von Botnang. Großblumig und langstielig,
mit dunkelblauen Blumen. 15 cm 0.40	dunkelblau. 15 cm
— Spafyvogel. Siehe Neuheiten 0.80	— Rose Perle. Herrlich leuchtendes Rosa, ein Kleinod unter den Frühlingsblumen. 15 cm 0.40
— W. H. Woodgate. Verbesserung des altbekannten Wermigveilchens. Der Wuchs ist viel kompakter	- rubra fl. pl. Gefülltes rotes. 15 cm 0.50
und die Farbe intensiver blau. 15 cm 0.30	— — Schwabenmädchen. Vorzügliche Verbesserung
Viola cornuta hybr. grandiflora O & Großblumiges	von Königin Charlotte, mit längeren Stielen, Blumen doppelt so groß und tiefdunkelblau. 15 cm. 0.30
Hornveilchen V-IX — Ada. Riesenblum. Form mit violettblauen Blüten.	— — sulphurea. Das erste gelbe, wohlriechende Veil-
15 cm	chen, stark duftend. 15 cm
Agnes Kay. Großblumig, 6-7 cm Durchmesser,	— Triumpf. SieheNeuheiten
zarthellila. 15 cm	— alpina. Schmallanzettliche, grüne Blättchen und tief-
dankbar blühende Sorte mit dunkel veilchenblauen,	rosa Blüten. 10 cm IV-V 0.40
zahlreichen Blumen. 15 cm 0.40	Waldsteinia, Ungarwurz, Rosaceae → → △
Ardwell Gem. Gelb mit schwarzer Zeichnung	— geoides. Gelbblühende, fingerkrautartige Pflanze mit
in der Mitte. 15 cm	immergrünem, lederartig. Laub. 30 cm IV-V 0.30 — trifolia. Mit dreizähligen Blättern und gelben Blüten.
— — Maggie Mott. Zartlila Blumen. 15 cm 0.40	25 cm IV-V 0.40
Seagull. Große, schneeweiße Blumen, 15 cm . 0.40	Wulfenia, Kuhtritt, Scrophulariaceae → - • △
— grācilis Clarence Elliot. Weißblüh. m. verwaschenem blauen Rand. 15 cm IV-VIII 0.40	— Baldaccii major. Großblumig, blaublühende, seltene Art. 20 cm
— — Alabaster. Siehe Neuheiten 0.60	— carinthiaca. Mit blauen Blütenrispen u. immergrüner,
— Juwel von Eisenach. Etwas größere Blumen wie die	primelartiger Belaubung. 20 cm V-VI 0.60
Stammart, von gleicher samtig dunkelvioletter Farbe 0.40	— — alba. Weißblühende Art. 20 cm. Selten V-VI 1.—
- Lord Nelson. Außerordentlich früh- und reich-	Zauschneria, Kolibriblume, Oenotheraceae ○ △ ∧
blühend, Blumen tiefpurpurviolett. 15 cm 0.40 — lutea. Varietät mit goldgelben Blumen. 15 cm 0.40	— arizonica. Siehe Neuheiten
- Strolch Sighe Neuheiten 080	— californica. Frischgrüne Büsche mit leuchtend schar-

Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt

für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solitär

Kein Garten ohne Farbenfreudigkeit, keine Farbenfreudigkeit ohne Stauden! Es gibt wohl auch keine Pflanzengruppe von so großer Vielgestaltigkeit und allgemeiner Verwendbarkeit. Dabei handelt es sich bei Stauden nicht etwa um Luxuspflanzen kostspieliger oder schwieriger Kultur, sondern um bescheidene Wesen von höchstem Persönlichkeitswert. Es bedarf nur einer einmaligen Anschaffung und allergeringstem Aufwand für Pflege, um sich jahrzehntelang an dem herrlichsten Blütenflor erfreuen zu können.

Um unseren Kunden die Auswahl zu erleichtern, haben wir zu Beginn des Kataloges Sortimente unserer Wahl angeboten, die die besten und erprobtesten Sorten enthalten und keine alten, längst überholten, wie dies unsere Kunden in jedem Jahre von neuem bestätigen. Weiter stellen wir Ihnen auch unsere jahrzehntelange Erfahrung zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne und unverbindlich über alle Fragen der Gartengestaltung, Sortenwahl usw.

Sämtliche Pflanzen werden mit Namenschildern geliefert.

Acanthus, Bärenklau, Acanthaceae O L 1 St. — longifolius. Schönes, gezähntes Blattwerk, Blüten purpurrosa, eine lange Ähre bildend. 60 cm VI-VIII 0.50	Actaea (Fortsetzung) — spicata. Weiße Blütenrispen, schwarze Beeren. 60 cm V-VI — rubra Blüten meiß B	
Achillea, Schafgarbe, Compositae O D D & Anspruchslose Dauerstauden mit kleiner lanzett- licher oder starkgesiederter, dunkelgrüner oder silbergrauer Belaubung u. prächtigen Blütendolden.	Adenophora, Becherglocke, Campanulaceae O-D Bulleyana. Hübsche glockenblumenartige Staude aus China, die an stark verzweigten Scholler	70
— filipendulina Parkers Var. Flach gewölbte, leuchtend goldg. Dold., graugrüne Belaub. 100 cm VII-IX 0.50 — holosericea. Siehe Neuheiten 1.—	- Farreri. Eiförmige, grob gezähnte Blätter, tiefblaue	
- hybr. Schwefelblüte. Siehe Neuheiten 0.80 - micrantha. Siehe Neuheiten 0.60	Glodenblumen. 40 cm VII-VIII 0.8 — polymorpha. Zahlreiche, dunkelblaue, mittelgroße, häng. Glodenbl. an groß. Risp. 80 cm VII-IX 0.6 — Potaninii Reichvergueich III 0.6	
— millefol. Crimson Beauty. Große, dunkelpurpurrote Blütendolden die nicht verblassen. 50 cm VI-VIII 0.40 — Kelwayi. Dunkelgrüne stark gesiederte Belaubung,	50 cm VII-VIII 0.6	
Blütenfarbe dunkelrot u.konstant. 50 cm VI-VIII 0.40 — ptarmica fl. pl. Boule de Neige. Nadelförmige, ge- kerbte Belaubung, Blumen gefüllt, große weiße Sträuße blühend. 60 cm VII-X 0.40	mit weiß marmorierten Blättern. 30 cm 0.4 Aetheopappus. Siehe Centaurea pulcherrima	10
— Perry's Weiße. Gutgefüllte aus breiten Petalen bestehende schneeweiße Blumen. 80 cm VII-X 0.40	Allium. Siehe niedere Stauden.	
- sibirica Ebba Kjerulf. Ahnlich A. ptarmica mit großen, reinweißen, einfachen Blumen. 60 cm. VII-IX 0.40 - taygetea. Siehe Neuheiten	Alstroemeria, Inkalilie, Amaryllidaceae ○ □ △ — aurantiaca. Dichtbeblätterte Stengel, an denen dunkel- orangegelbe, trichterförmige Blumen erscheinen. 40 cm VI-VIII 0.6	
Aconitum, Eisenhut, Ranunculaceae O- Uralte, stattliche Dauerstauden mit glänzender, rittersporn-	— ficifolia. Gut ausdauernde Malva mit mallica p	50
ähnlicher Belaubung und großen Blütenrispen. — Fischeri. Tiefblaue Art. 80 cm VIII-IX 0.80 — var. Wilsonii. Lange Rispen hellblauer Blumen. Spätblühendste Sorte. 150 cm VIII-X 0.60	Farben. 200 cm	10
 lycoct. pyrenaicum. Gelbblüh. Art. 80 cm VII-VIII 0.50 napellus. Blaue, bekannte Art. 120 cm . VII-IX 0.40 album. Mit weißen Blütenrispen. 120cm VII-VIII 0.50 	gefüllt. 200 cm VII-IX 0.4	40
— bicolor. Blau und weißfarbig. 150 cm VII-VIII 0.50 — carneum. Fleischfarbigrosa. 100 cm. VII-VIII 0.50 — praecox. Dunkelblau. Frühblüh.120 cm. VII-VIII 0.50	latifolia. Einfache Triebe mit wechselständigen Blättern. Bläuliche Blum. i. endständ. Dold. 70 cm VI-VIII 0.6 salicifolia. Weidenbl. Art d. vorigen. 70 cm VI-VIII 0.6	
paniculatum nanum. Niedrig bleibende Varietät mit leucht. blauviolett. Blütenrispen. 60 cm VII-VIII 0.60 rostratum coerul. Leuchtend blau. 120 cm VII-IX 0.50	Anaphalis, Perlpfötchen, Compositae O o x — margaritacea. Weißliche Belanhung	
— Spark's Var. Dunkelste all. blauen. 150 cm VII-IX 0.50 — Stoerkianum. Ähnlich A. napellus. Blumen violett. 120 cm VII-VIII 0.50 — volubile. Riesige Rispen, dunkellavendelblau.	Anchusa, Ochsenzunge, Borraginaceae O-D - italica Dropmore. Anschnliche, buschige Staude mit	40
150 cm VIII-IX 0.60 Actaea, Christophskraut, Ranunculaceae ○-① ≅ □ Robuste Schmuckstauden mit zwei- bis dreifach ge-	zungenförmiger Belaubung, pyramidale Rispen, leuchtend enzianblau. 120 cm VI-VIII 0.4 — Opal. Mit schön., himmelbl. Blüt. 120 cm VI-VIII 0.5 — Morning Glory. Straffe, verweigte Stiele m. großen	22
fiedertem Blattwerk und prächtig weißen Blüten- ähren, ähnlich Cimicifuga, aber früchtebringend. — alba. Echt. Mit scharf eingeschnitt. Blätt., Beeren weiß,	— Picotée. Nied., hellbl. Art. 100 cm VI-VIII O.S. — myosofidiflora. Kaukasusvergismeinnisht. VI	
auf verdickt., rot. Stiel. Selten. 100 cm VII-IX 1.50	förmige Blätter und tiefblaue, vergißmeinnicht- artige Blumen. 50 cm IV-V	50

Anemone, Japanische Herbst - Anemone, Ranuncu- 1St.	Aquilegia, Akelei, Ranunculaceae O - D - & Wert- 1 St.
laceae O-D X Nom zeitigen Herbst bis in den RM	volle harte elegante Staude mit doppelt dreizähliger RM
Frost hinein blühend. Die Blumen gleichen großen,	Belaubung und interessant geformten Blüten in
feingeformten Wildrosen mit goldgelben Staub-	schönen Farbtönen V-VI
gefäßen. Im Winter 15 cm Laub- oder Torf-	- chrysantha. Goldgelb mit besond. langem Sporn. 70 cm 0.40
beschüttung nötig VIII-IX	— — alba. Reinweiß. 60 cm
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in	- coerulea. Blüten innen reinweiß, außen blau. 70 cm 0.40
10 feinsten Sorten unserer Wahl zu RM 40.—	- hybr. (haylodgensis). Hybriden in feinsten Tönen,
	sehr langstielig und langgespornt. 70 cm 0.40
25 Stück zum 100 Preis.	— rosea. Zartrosablühend. 70 cm
— japonica Brillant. Hellmagentarot. 50 cm 0.50	
- Bühler Kind. Siehe Neuheiten 0.80	— formosa. Rote, aufrechtstehende gefüllte Blüten. 50 cm 0.40
- Honor. Jobert. Schneeweiß, bes. dauerhaft, 80 cm 0.50	— hybr. atroviolacea. Dunkelblaue Blüten. 70 cm 0.40
	— — Crimson Star. Siehe Neuheiten 0.80
- hupehensis. Leuchtend malvenrosa, früh- und	— Kupferkönigin. Mit kupferfarbigen Blüten. 60 cm 0.50
reichblühend, 70 cm 0.50	— oxysepala. Weißlichgelb mit blau. 60 cm 0.50
Herzblut. Siehe Neuheiten	Skinneri. Langspornige Blumen. Rot mit gelb. 70 cm 0.40
— — praecox. Siehe Neuheiten	
superba. Kreuzung der Anemone hupehensis	- vulgaris hybr. Großblumige Varietäten, feinstes Far-
mit japonica, große Blüten, dunkelrosa. 80 cm 0.60	benspiel. 60 cm
— — splendens. Leucht. rot u. äußerst reichbl. 80 cm 0.60	— fl. pl. Mit dichtgefüllten Blüten. 40 cm 0.40
	— nivea grandiflora. Reinweiße Blumen. 50 cm 0.40
- Klein Rottraut. Siehe Neuheiten	— — Siehe auch niedere Stauden.
— Königin Charlotte. Zartrosa, großblumig. 80 cm. 0.50	
- Kriemhild. Halbgefüllt v. weinrötl. Farbe. 80 cm 0.60	Aralia, Aralie, Araliaceae ○ ⊥
— Le nein Rose. Kompakte Form, rosa gefüllt. 40 cm 0.60	— cachemirica. Sehr dekorative hohe Blattstaude mit
— — Loreley. Halbgefüllte, zartrosa Blumen. 50 cm . 0.50	weiß. Blüt. u. schwarz. Beeren. 100 cm VII-VIII 0.80
— — Luise Ühink (Schneekönigin). Schneeweiße, edel-	- californica. In allen Teilen robuster als vorige. Selten.
	120 cm VII-IX 1.—
geformte, vielblättrige Blumen. 80 cm 0.60	
— Margarete. Siehe Neuheiten	Argemone, Stachelmohn, Papaveraceae O O D
— — Max Vogel. Dunkelrosa, großblumig, halbgefüllt 0.60	- platyceras. Ähnlich einer Romneya coulteri. Blau-
— — Mont rose. Rosa gefüllt. 60 cm	grüne, papaverähnliche Belaubung. Fruchtkapsel
— Prinz Heinrich. Großblumig, dunkelrot. 60 cm . 0.60	und Stengel bestachelt. Sehr großblumig, weiß.
- Rich. Ahrens. Rahmweiß, mit lila Schein, groß-	40 cm VII-VIII 0.70
blumig. 80 cm 0.60	
Schwarzwälderin C (11	Arnica, Wohlverleih, Compositae O – 1 🗆
— Schwarzwälderin. Großbl., ganz zartrosa. 80 cm 0.60	— amplexicaulis. Schmalblättrige Belaubung, gelbe Blü-
- Stuttgardia. Lebhaft dunkelrosafarbig, mit großen,	ten in großer Zahl. 50 cm VI-VIII 0.50
edelgeformt., stark halbgefüllten Blüten, kompakter	- longifolia. Siehe Neuheiten
Wuchs. 80 cm	— Siehe auch niedere Stauden.
- Weißer Riese. Sehr große, weiße Blumen auf	Siene audi medere Standen.
	4 1 1 1 1 1 6 11
	Artemisia, Edelraute, Compositae ○ □ ¾ ⊥
festen, hohen Stielen. 80 cm	Artemisia, Edelraute, Compositae ○ □ ¾ ⊥ — vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark
	- vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50	vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen,
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O - D - &	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O - D - X — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belau-	 vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O-D = & — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spät-	 vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O-D = & — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spätblühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50	 vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O - D = & — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spätblühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50 — Levillei. Reich verzweigte Blütenstiele, auf denen die	 vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O-D = & — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spätblühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50	 vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O - D = & — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spätblühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50 — Levillei. Reich verzweigte Blütenstiele, auf denen die großen weißen Blüten sitzen. 40 cm . VI-VII 0.60	 vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae ○ - ① ⊥ ≅ silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O - D A — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spätblühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50 — Levillei. Reich verzweigte Blütenstiele, auf denen die großen weißen Blüten sitzen. 40 cm . VI-VII 0.60 — polyanthes. In Tracht wie A. rivularis. Blätter 5 bis	 vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ⊥ ≅ silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen.
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O - D = & — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spätblühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50 — Levillei. Reich verzweigte Blütenstiele, auf denen die großen weißen Blüten sitzen. 40 cm . VI-VII 0.60 — polyanthes. In Tracht wie A. rivularis. Blätter 5 bis 7 lappig, Blumen bläulichweiß. 40 cm VI-VII 0.70	 vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ⊥ ≅ silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O - D A — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spätblühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50 — Levillei. Reich verzweigte Blütenstiele, auf denen die großen weißen Blüten sitzen. 40 cm . VI-VII 0.60 — polyanthes. In Tracht wie A. rivularis. Blätter 5 bis 7 lappig, Blumen bläulichweiß. 40 cm VI-VII 0.70 — rivularis. Dreiteiliges Blattwerk, weiße Blüten, mit	 vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ⊥ ≅ silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen.
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O - D = & — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spätblühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50 — Levillei. Reich verzweigte Blütenstiele, auf denen die großen weißen Blüten sitzen. 40 cm . VI-VII 0.60 — polyanthes. In Tracht wie A. rivularis. Blätter 5 bis 7 lappig, Blumen bläulichweiß. 40 cm VI-VII 0.70	 vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O - D A — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spätblühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50 — Levillei. Reich verzweigte Blütenstiele, auf denen die großen weißen Blüten sitzen. 40 cm . VI-VII 0.60 — polyanthes. In Tracht wie A. rivularis. Blätter 5 bis 7 lappig, Blumen bläulichweiß. 40 cm VI-VII 0.70 — rivularis. Dreiteiliges Blattwerk, weiße Blüten, mit	 vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ⊥ ≅ silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O D D X — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spätblühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50 — Levillei. Reich verzweigte Blütenstiele, auf denen die großen weißen Blüten sitzen. 40 cm . VI-VII 0.60 — polyanthes. In Tracht wie A. rivularis. Blätter 5 bis 7 lappig, Blumen bläulichweiß. 40 cm VI-VII 0.70 — rivularis. Dreiteiliges Blattwerk, weiße Blüten, mit blauen Staubfäden. 50 cm VI-VIII 0.50 — silvestris. Reinweiß, ähnlich der Anemone japonica.	 vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O D D X — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spätblühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50 — Levillei. Reich verzweigte Blütenstiele, auf denen die großen weißen Blüten sitzen. 40 cm . VI-VII 0.60 — polyanthes. In Tracht wie A. rivularis. Blätter 5 bis 7 lappig, Blumen bläulichweiß. 40 cm VI-VII 0.70 — rivularis. Dreiteiliges Blattwerk, weiße Blüten, mit blauen Staubfäden. 50 cm VI-VIII 0.50 — silvestris. Reinweiß, ähnlich der Anemone japonica. 40 cm	 vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ⊥ ≅ silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O—D □ & — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spätblühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50 — Levillei. Reich verzweigte Blütenstiele, auf denen die großen weißen Blüten sitzen. 40 cm . VI-VII 0.60 — polyanthes. In Tracht wie A. rivularis. Blätter 5 bis 7 lappig, Blumen bläulichweiß. 40 cm VI-VII 0.70 — rivularis. Dreiteiliges Blattwerk, weiße Blüten, mit blauen Staubfäden. 50 cm VI-VIII 0.50 — silvestris. Reinweiß, ähnlich der Anemone japonica. 40 cm V-VI 0.40 — Frühlingszauber. Glockenförmige große Blume.	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ± ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae ⊙ ⊥ □
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O—D □ & — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spätblühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50 — Levillei. Reich verzweigte Blütenstiele, auf denen die großen weißen Blüten sitzen. 40 cm . VI-VII 0.60 — polyanthes. In Tracht wie A. rivularis. Blätter 5 bis 7 lappig, Blumen bläulichweiß. 40 cm VI-VII 0.70 — rivularis. Dreiteiliges Blattwerk, weiße Blüten, mit blauen Staubfäden. 50 cm VI-VIII 0.50 — silvestris. Reinweiß, ähnlich der Anemone japonica. 40 cm V-VI 0.40 — Frühlingszauber. Glockenförmige große Blume. 40 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ± ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae → ± □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O—O □ & — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spätblühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50 — Levillei. Reich verzweigte Blütenstiele, auf denen die großen weißen Blüten sitzen. 40 cm VI-VII 0.60 — polyanthes. In Tracht wie A. rivularis. Blätter 5 bis 7 lappig, Blumen bläulichweiß. 40 cm VI-VII 0.70 — rivularis. Dreiteiliges Blattwerk, weiße Blüten, mit blauen Staubfäden. 50 cm VI-VIII 0.50 — silvestris. Reinweiß, ähnlich der Anemone japonica. 40 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ± ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae ⊙ ⊥ □
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50 Anemone, verschiedene: O—D □ & — canadensis (pennsylvanica). Stark gesiederte Belaubung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spätblühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50 — Levillei. Reich verzweigte Blütenstiele, auf denen die großen weißen Blüten sitzen. 40 cm . VI-VII 0.60 — polyanthes. In Tracht wie A. rivularis. Blätter 5 bis 7 lappig, Blumen bläulichweiß. 40 cm VI-VII 0.70 — rivularis. Dreiteiliges Blattwerk, weiße Blüten, mit blauen Staubfäden. 50 cm VI-VIII 0.50 — silvestris. Reinweiß, ähnlich der Anemone japonica. 40 cm V-VI 0.40 — Frühlingszauber. Glockenförmige große Blume. 40 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ⊥ ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae ⊙ ⊥ □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60
festen, hohen Stielen. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ± ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae → ± □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orange-
festen, hohen Stielen. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ± ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae → ± □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ★ ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae → ↓ □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae → ↓ ↓ X
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ± ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae → ± □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ± ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae → ↓ □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae → ↓ ↓ X — filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, voll-
festen, hohen Stielen. 80 cm 0.60 — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ↓ ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae → ↓ □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae → ↓ ↓ X — filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen
festen, hohen Stielen. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → ↓ ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae → ↓ □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae → ↓ ↓ X — filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Ge-
festen, hohen Stielen. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ↓ ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae → ↓ □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae → ↓ ↓ — filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher
festen, hohen Stielen. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gesiederter Belaubung u. milchweißen, sederartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → ↓ ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreisach gesiederte Belaubung u. sederbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig sein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpslanze, Asclepiadaceae → ↓ □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae → ↓ ↓ X — filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert.
festen, hohen Stielen. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gesiederter Belaubung u. milchweißen, sederartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → ↓ ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreisach gesiederte Belaubung u. sederbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig sein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae → ↓ □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae → ↓ ↓ — filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm
festen, hohen Stielen. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gesiederter Belaubung u. milchweißen, sederartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → ↓ ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreisach gesiederte Belaubung u. sederbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig sein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae → ↓ □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae → ↓ ↓ & — filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm
festen, hohen Stielen. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gesiederter Belaubung u. milchweißen, sederartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → ↓ ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreisach gesiederte Belaubung u. sederbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig sein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae → ↓ □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae → ↓ ↓ — filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm
festen, hohen Stielen. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gesiederter Belaubung u. milchweißen, sederartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → ↓ ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreisach gesiederte Belaubung u. sederbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig sein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae → ↓ □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae → ↓ ↓ & — filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm
festen, hohen Stielen. 80 cm	 vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gesiederter Belaubung u. milchweißen, sederartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → ↓ ≅ silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gesiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 Kneiffii. Farnartig sein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae → ↓ □ purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae → ↓ ↓ & filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm 1.— pseudoscaber, Eine mit unserem Küchenspargel verwandte Art, jedoch in allen Teilen viel graziöser und vornehmer. 100 cm 1.50
festen, hohen Stielen. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gefiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae
festen, hohen Stielen. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gesiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ← ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae ○ ← → ≟ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gesiederte Belaubung u. sederbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae ○ ↓ □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ ← ∮ ↓ ¾ — filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm 1.— — pseudoscaber, Eine mit unserem Küchenspargel verwandte Art, jedoch in allen Teilen viel graziöser und vornehmer. 100 cm 1.50 Asphodeline, Junkerlilie, Liliaceae ○ □ ↓ — liburnica. Siehe Neuheiten 2.—
festen, hohen Stielen. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gesiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae → → ± ≅ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gesiederte Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpsslanze, Asclepiadaceae → ± □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae → ± ½ — filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm
festen, hohen Stielen. 80 cm	— vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark gesiederter Belaubung u. milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm VIII-X 0.50 Arum, Aronstab, Araceae → ← ≅ — italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70 Aruncus, Geißbart, Rosaceae ○ ← → ≟ — silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gesiederte Belaubung u. sederbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50 — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70 — sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70 Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae ○ ↓ □ — purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60 — tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ ← ∮ ↓ ¾ — filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm 1.— — pseudoscaber, Eine mit unserem Küchenspargel verwandte Art, jedoch in allen Teilen viel graziöser und vornehmer. 100 cm 1.50 Asphodeline, Junkerlilie, Liliaceae ○ □ ↓ — liburnica. Siehe Neuheiten 2.—

Aster novi-belgii (Fortsetzung)	Astilbe Arendsii (Fortsetzung) 1St.
— Perrys Pink Improved. Rein leuchtend rosa. 100 cm 0.40	— - Bergkristall. Lange schmale, gut verzweigte Blüten-
— Perrys Weiße. Sehr reichblühend, reinweiß. 100 cm 0.50 — Pink Nymph. Siehe Neuheiten 0.80	rispen von schneeweiß. Farbe; später als A. Diamant 0.50
— Queen of Colwall. Halbgerüllte, rießengroße,	— Brautschleier. Über frischgrüner Belaubung er- heben sich die zierlich überhängenden, schneeweißen
malvenfarbige Blumen. 100 cm 0.50	Blütenrispen. 60 cm
- Rachel Ballard. Rosa, gefüllt, sehr reichblüh. 120cm 0.50	— — Diamant. Aufrechte Rispen von schneeweißer Farbe 0.50
— Red Rover. Siehe Neuheiten	- Else Schluck. Dichte, gut verzweigte Rispen in
- Rosalinde. Leuchtend rosarot. 80 cm 0.40	leuchtend karminroter Farbe. 70 cm 0.60
- Royal blue. Tiefblaue Blumen, die im Aufblühen gefüllt erscheinen. 120 cm 0.50	- Erna Dick. Schlanke fedrige Rispen von zartlila
— Sam Banham. Aufrechtwachs., weiße Blum. 120 cm 0.40	Färbung mit lachs Schein. 80 cm
Saturn. Lockere Rispen, hellila, unempfindl. Blumen 0.40	— Frieda Klapp. Aufrecht. Wuchs, karminpurp. 60 cm 0.60
— Schön Rottraut. Kleinblum., leucht. rosarot. 50 cm 0.40	- Gertrud Brix. Mit leuchtenden, dunkelkarmin-
- Snowdrift. Große, schneeweiße, halbgefüllte Blum. 0.50	purpurnen Blüten. 70 cm 0.60
— Stuttgarter Dunkelblaue. Großblumig, dunkelblau 0.40	— Gloria. Die niederen Büsche bringen dichte, federige
— Thora Perry. Zartlavendelrosa, gefüllte Blumen in dichten Sträußen. 120 cm 0.50	Blütenrispen. Farbe leuchtend dunkelrosa. 40 cm 0.50
— Weiße Climax. Riesenblumig, reinweiß. 150 cm 0.40	— Gloria purpurea. Mit dunkelroter Belaubung und leuchtend roten Blüten, 40 cm
Aster novae-angliae. Blätter u. Stengel stark behaart.	— Granat. Farbe leuchtend dunkelkarmin. 90 cm 0.60
Sehr großblumig und reichblühend IX-XI	- Grete Bücher. Leucht. dunkles lachskarmin. 70 cm 0.60
- Barr's Pink. Große, leuchtend dunkelrosa Blüten in	— — Grete Püngel. Kräftiger Wuchs, gesunde Belau-
riesigen Büscheln. 150 cm	bung. Blüten hellrosa. 70 cm
— Kate Blomfield. Große, dunkelkarminrote Blumen	— Gunther. Pyramidale Rispen leucht. hellreinrosa 0.40 — Hanna Stodt. Leuchtend karminrosa. 60 cm 0.60
mit bronzefarbener Mitte. 150 cm 0.60	— Hyazinth. Straffe dichte Rispen von leuchtender
— Lill Fardell. Festgetragenes Blütendach von leuch-	lilarosa Färbung. 80 cm 0.50
tend frischrosa Farbe. 180 cm 0.40	— — Ilse Haack. Schöne pyramidale Rispen von schneeig-
— Mrs. J. F. Raynor. Dunkelkarminrot. 180 cm 0.40	weißer Farbe. 90 cm 0.60
 Rycroff Pink. Blumen leuchtend rosarot. 150 cm. 0.50 Treasure. Auffallend dunkelviolettblaue Blumen. 0.40 	- Irene Rottsieper. Zierliche, reichverzweigte Rispen,
- W. Bowman. Mit großen violettblauen Blumen . 0.40	reinlachsrosa. 60 cm
Kleinblumige Herbstaster-Sorten IX-XI	— — Lachskönigin. Lachsrosa. 60 cm 0.50
Aster corditolius. Die eleganten dünnen Zweige bedecken	— — Lilli Goos. Große, locker pyramidal gebaute Rispen
sich dicht mit kleinen hellila Blüten. 100 cm 0.40	von leuchtend dunkellachskarmin Färbung. 80 cm 0.60
- elegans. Vornehme, graziöse Sorte, mit lichtlila Blüten. 120 cm	— Lydia Hagemann. Große, lachsrosa Rispen. 80 cm 0.60
— — Ideal. 100 cm hoch, äußerst zierlicher Wuchs, dicht	— Opal. Breite, federige Rispen von schöner licht- lila Farbe. 50 cm
besetzt mit kleinen lila Blüten 0.50	— Rubin. Kräftige Rispen, dunkelkarmin. 90 cm 0.50
— major. Robuste, großblumige Form. 120 cm 0.40	- Walkure. Von frischer hellrosa Farbe mit lachs-
— Vergißmeinnicht. Vergißmeinnichtblaue Blüten in großer Fülle. 100 cm	farbenem Schein. 50 cm
— Datschii Findelkind. Die spätest blühende, reinweiße	— Weiße Gloria. Ein Gegenstück der beliebten Gloria.
Aster. 100 cm	Réinrahmweiß. 40 cm 0.60
— Finale. Karminrosa, sehr spätblühend. 100 cm 0.40	Treib-Astilben, die sich aber ebensogut als Freiland-
— ericoides Caterham Gem. Übersät mit schneeweißen	pflanzen für feuchte od halbschattige Lagen eignen. 40-50 cm VI-VII
Blüten. 100 cm	Astilbe japonica hybrida Bonn. Von schön gedrungenem
hauchten Blüten. Ebenso reichblütig. 120 cm 0.40	Wuchs. Die gut geformten Rispen sind von leucht.
- Golden Spay. Kleinblumig, gelblichweiß. 120 cm 0.50	dunkelkarminrosa Färbung mit lachs Schein 0.60
— Schneetanne. Die kleinen an Aster Datschii er-	Bremen. Feingesiederte Belaub., zierliche, volle
innernden weiß. Blüt. erscheinen in solchen Massen,	Blütenrispen, leucht. dunkellachskarmin Färbung. 0.60
daß sämtliches Laubwerk darunter verschwindet 0.40 — Shortii. Mit lilablauen Sternblüten übersät. 100 cm 0.50	Deutschland. Gesunde Belaubung, kräftige,
Aster, verschiedene:	besond. schön geformte Blütenrispen von blendend
— dumosus Hybriden. Siehe Neuheiten.	weißer Farbe
— linariifolius. Siehe Neuheiten	herrlich lilarosa 0.60
- puniceus pulcher. Hohe, straffe Aster mit üppigen,	Europa. Die herrlichen, dichtfedrigen Rispen
lilienweißen Blumen. 180 cm IX-XI 0.50 - Robinsonii. Siehe Neuheiten 1.50	von pyramidaler Form haben reine, hellrosa Farbe 0.60
— Robinsonii. Siehe Neuheiten	Köln. Über kompaktem Laubbusch erheben sich
weiße Blütendolden. 200 cm VIII-IX 0.50	gedrungene, dichte Rispen von leuchtend dunkel-
- roseus. Rosablühende Form der vorigen.	scharlachkarmin Farbe
Astilba Prachtspiero Savifragascas O A ~ 7	— — Rheinland. In Wuchs u. Rispen unübertroffen, herrlich leuchtend rosakarmin
Astilbe, Prachtspiere, Saxifragaceae O-O \(\simeq \simeq \times \) Eine der schönsten und wertvollsten Stauden.	
Wegen ihres eleganten Wuchses, ihrer federigen,	Verschiedenartige Astilben.
äußerst dekorativen Blütenrispen, sollte sie in	Astilbe Davidii. Große Rispen mit zierlichen Blüten von
keinem Garten fehlen. Verlangt feuchten Boden	lilapurpurrosa Färbung. 150 cm VII-VIII 0.60
oder Halbschatten. Wir liefern ein feines Sortiment	- koraeensis. Siehe Neuheiten
von 100 Stück in 20 Sorten zu RM 40. — VII-VIII Astilbe Arendsii Anita Pfeifer. Aufrechte breite Rispen,	- Taquetti. Kleine unterirdische Ausläufer treibend. Die
laudtend la dance 70	aufrechten fedrigen Blütenstiele sind von leuchtend


Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1St.	Campanula (Fortsetzung) 1 St.
Astilbe Taquetti (Fortsetzung)	— glomerata dahurica. Herrlich dunkelviolette Blüten
— superba. Siehe Neuheiten 0.70	in end- u. seitenständigen dichtgedrängten Knäueln.
- Ihunbergii delicata. Große dunkelgrüne Belaubung,	40 cm VI-VII 050
schöne zartrosa gebogene Blütenrispen in großer	— superba. Straufglockenblume. Mit großen, run-
Zahl. 120 cm VII-VIII 0.50 — elegans. Blüten weiß, 120 cm VII-VIII 0.50	den Blutensträußen von festerer Haltung, schönerer
— — carnea. Schöne hellrosa Blütenfarbe.	Form u. dunklerer Färbung wie glomerata dahurica. 40 cm VI-VII 0.60
120 cm VII-VIII 0.50	— grandis (latiloba). Die hellblauen, großen, sternför-
— — rosea. Große, elegante, dunkelrosa Rispen.	migen Bluten sitzen dichtgedrängt an langen Abren
— Moerheimii. Lange nach unten gebog. Blütenrispe	/U cm VI VII 0 50
von schöner rahmweißer Farbe. 120 cm VII-VIII 0.50	— alba. Weißblühende Form. 70 cm VI-VII 0.50 — lactiflora. Verzw. mildweiße Bi- 60
Astilbe simplicifolia. Besonders auffallende Art mit	— lactiflora. Verzw., milchweiße Risp. 60 cm. VII-VIII 0.50 — coerulea. Blütenrispen mit zartblauen Blumen.
zierlicher Belaubung und sehr graziösen Blüten-	00 cm
rispen. 40 cm VIII-IX	- lamona macramina. Groke spitzeilängliche habeant
- alba. Zierliche, überhängende, weiße Rispen 0.60	Delaubung und große hellblaue Glodenbluman
— atrorosea. Siehe Neuheiten 0.70 — carnea. Fleischfarbigrosa 0.60	langen Rispen. 100 cm VI-VII 0.50 - alba. Weißblühende Form der vorigen.
— delicata. Aufr., reichverzw. Rispen, Farbe zartrosa 0.60	TOU CM
- elegans. Reich verzweigte, zierlich überhängende	persicional. Phrsichblattrice Standa mit 1-11
Rispen von leuchtend rosa Farbe in großer Fülle. 0.60	Ulduch Diumen an langen Kienen 50 Tit Titte
— erecta. Lockere Rispen von dunkelrosa Farbe 0.60 — praecox. Siehe Neuheiten 0.80	— Ackermannii. Siehe Neuheiten
- rosea. Besonders zierlich, frischrosa 0.60	blendendweigen Diuten, 80 cm
— salmonea. Fedrige Rispen, leuchtend lachsrosa . 0.60	Biddictifell. Große, leuchtend blave gof::114-
Astilbe hybr. crispa. Siehe niedrige Stauden.	Didmen. To em
Astrantia, Sterndolde, Umbelliferae O-0 \(\times \times \)	— coronata. Die Kelchblätter sind blumenblattartig ausgebildet und wie die Korolle leuchtend blau.
— carniolica rosea. Im Wuchs Astrantia major ähnlich, aber edlere Blütenstände, deren Hüllblätt. von einer	Joen VI-VIII OOO
leuchtend. altrosa Färbung sind. 50 cm VI-VIII 0.50	died. Weightunende Form der vorigen
— major. Sterndolde mit rosa geaderten Blütenhüllblätt-	ou cm VI VIII OSO
den. 40 cm VI-VIII 0.40	- Die Fee. Einfache, hellilafarbene Blütenglocken. 60 cm. VI-VIII 0.50
— rosea. Mit lilarosa Sternblüten. 40 cm VI-VIII 0.50	- Woerneimi. Weiße, halbgefüllte, haltham Blitte
Baptisia, Wilder Indigo, Leguminosae ○ ⊥ □ — australis. Lupinenähnliche Staude mit großen indigo-	aut lesten bliefen ou cm . VI VIII 060
blauen Blütenrispen. 60 cm VII-VIII 0.60	- Fillzell. Der vorigen ahnlich im Habitus 11-
Bergenia. Siehe niedere Stauden.	efüllt. 50 cm VI-VIII 0.60 - Pride of Exmouth. Großglockig, bellblau gefüllt.
Betonica. Siehe Stachys.	
Bocconia. Siehe Macleaya.	Ciliditi Deddiy, Herriich blane Bioser al
Boltonia. Siehe Aster umbellatus.	
Buphthalmum, Ochsenauge, Compositae O = &	indigoblaue Gloken, 50 cm
- salicifolium. Fingerlange lanzettliche Blätter u. breite goldgelbe Strahlenblüten. 50 cm VI-VIII 0.50	Cardamine Wiesenschauml 1. C. WI-VII 0.70
- speciosissimum (Telekia). Blätter breit, länglich	Cardamine, Wiesenschaumkraut, Cruciferae ○- ○ ≃ — pratensis fl. pl. Schöne Rispen dicht gefüllter zartlila Rliiten, 40 cm.
herzförmig, große, gelbe, feinstrahlige Blumen.	Didten. 10 cm
Calimeris Vogalacter Composito O.51 V	Jedochisis. Starkwamsende Art mit einfachen
Calimeris, Vogelaster, Compositae O A A integrifolia. Herbstastern-ähnliche weiße Blumen.	1 Didmen. 70 cm IV-V 060
100 cm VI-VIII 0.50	Centaurea, Kornblume, Compositae O Z & Buschige
Caltha, Dotterblume, Ranunculaceae ○ ≅	Stauden für jeden Gartenboden. Wegen ihrer Halt- barkeit besonders zum Schnitt geeignet.
- leptosepala. Rundliche Belaubung und weiße Blüten.	— dedibald. Graugrune, gefiederte Relaubur — 1
30 cm. Selten IV-V 0.80 — palustris flore pleno. Gefülltblühende Sumpfdotter-	
blume. 30 cm IV-V 0.50	Jicchipciuli, piene Neuhartan
monstr. pl. Noch großblumiger wie die vorige und	dicken, steifen Stielen, 90 cm
stärker gefüllt. 30 cm IV-V 0.60 — semiplena. Besonders große, halbgefüllte, gelbe	Juliani, Dumale, grantianes Divi
Blumen, sehr reichblühend. 40 cm IV-V 0.60	grounding, reducted blan, 40 cm W-Will
- polypetala. Sehr starkwüchsige, besond. großblättrige	diba, Reinweir, grobblimic 40 and 17 1777
u. großblumige, einfachblüh. Art. 40 cm. V-VI 0.60	40 cm
Calystegia, Bärwinde, Convolvulaceae ○ — hederacea fl. pl. Rankgewächs mit rosafarbenen,	103Cd. Großblumige, rosenrote Vanitus
windenartig., gefüllt. Blumen. 200 cm. VI-IX 0.50	70 cm
Campanula,	1 Globe rote Diuten, 40 cm W Will
Glockenblume, Campanulaceae ○- □ X	- sulphurea. Zartgelbe Schnittblume. 40 cm V-VII 0.40
Vorzügliche Gruppen-, Rabatten- u. Schnittstauden.	Parener Many 303- Complime D . 111
(Nicht zu verwechseln mit den nur 2 jährigen dieser	The state of the oroben near Divi
Art, z. B. C. medium, C. pyramidalis). — alliariaefolia. Herzförmige Belaubung und trichter-	
glockige, rahmweiße Blüten. 40 cm . VI-VIII 0.50	gebaut., fedr., schwefelgelb Blum 80 cm W WY
	0.60 v-VII 0.60

Centranthus, Sporenblume, Valerianaceae O 🗆 🗴 1 St.	Chrysanthemum indicum (Fortsetzung) 1 St.
- ruber. Die altbeliebte Sporenblume, welche für trockene, RM	R.M.
sonnige Lage fast unentbehrlich ist, karminrosa	— Idi. Goldbronzefarben. 60 cm. Früh 0.50
Blütenrispen. 60 cm VI-IX 0.40	— Mahnkes Rote. Weinrote, halbgefüllte Blumen.
- albus. Große Sträuße feiner weißer Blüten.	50 cm. Mittel
60 cm VI-IX 0.40	— — Mannheimer Markt. Reinweiße Blum. 100 cm. Spät 0.50
- coccineus. Gleich der vorigen, mit karminroten	— Nebelrose. Derbe, uralte silberrosa Sorte von
Blüten. 60 cm VI-IX 0.50	eigenartiger Form. 100 cm. Spät 0.50
	— Normandie. Edle, rosa Blumen. 80 cm. Mittel . 0.50
Cephalaria, Riesenskabiose Dipsacaceae ○ ⊥ ¾	— Novembersonne. Großbl., goldgelb. 80 m. Spät 0.50
- tatarica. Skabiosenartige, große, langstielige, zart-	- Petit Louis. Zwergsorte, großblumig, weinrot.
schwefelgelbe Blumen. 200 cm VI-VII 0.50	40 cm. Mittel
Ceratostigma, Bleiwurz, Plumbaginaceae O-0 1 0	Plui d'or I 1/1 11 100 M'// 1 0.50
- bybr Griffithii Ähal danas hatabanda it lang	- Plui d'or. Leuchtend goldgelb. 100 cm. Mittel 0.50
- hybr. Griffithii. Ähnl. der nachstehenden mit behaarten	— Pride of Ceston. Purpurrot. 70 cm. Mittel 0.50
Blättchen und hellblauen Blüten. 40 cm VIII-X 0.70	— Purpur. Mittelgroße, tiefpurpurrote Blumen. 80 cm 0.50
- Willmottiae. Schöne neuere Art, deren leuchtend	— Rosenball. Frischrosafarb. Blumen. 100 cm. Spät 0.50
ultramarinblaue Blütendolden von Spätsommer bis	— Ruby King. Samtig rotbraun. 80 cm. Mittel 0.50
Herbst erscheinen. 40 cm VIII-X 1.—	— — Spätgold. Stumpfgoldgelbe Blütenmass. 80 cm. Spät 0.50
Chelone, Schildblume, Scrophulariaceae O-D	— Spätherbstfeuer. Rotbr., sehr spätblühend. 50 cm 0.50
- barbata. Siehe Pentastemon barbatus.	— Source d'or. Orangefarb. mit Goldschattier. Mittel 0.50
	Touring Club Call 11 1 C C S 1 11 S 20 50
— obliqua (glabra). Mit dunkelrosa Blüten, sehr schön	- Touring-Club. Goldgelb m. kupferf. Schattier. Spät 0.50
und eigenartig. 50 cm VIII-X 0.50	— Weiße Nebelrose. Das beste, späte, weiße Garten-
- alba. Gleich der vorigen, mit weißen Blüten.	chrysanthemum. 80 cm
50 cm VIII-X 0.50	Chrysanthemum leucanthemum, Frühblühende
Charachelleria Ida i con as a con	Marguarita Campasitas O 7 V I 1' VI
	Marguerite, Compositae ○ □ ¾ In diese Klasse
Chrysanthemum indicum, japanische Winteraster,	fallen die frühest blühenden Sorten. Die weiß. Stern-
Compositae O D & Die volkstümlichste Staude	blüten erreichen bis 10 cm Durchmesser. V-VI
unserer Gärten. Äußerst dankbare Schnitt- und	Breslau. Blüte sehr groß; die Füllung derselben
Gruppenstaude IX-XI	ist so gut, daß nur eine kleine gelbe Mittelscheibe
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in	sichtbar ist. 50 cm 0.60
20 Sorten unserer Wahl zu RM 40.—	- Edelstein. Blüten dichtgefüllt, gleichen einem weiß
	gefüllten Practheum 40
Pomponsorten:	gefüllten Pyrethrum. 40 cm 0.50
Kompakter Wuchs, kugelige Blumenköpfe	- Lockenkopf. Riesenform der Sorte Breslau, mit
— Altgold. Goldbronzefarben 40 cm. Früh 0.50	eigenartig gekrausten Blumenblättern. 50 cm 0.60
- Anastasia. Dunkelkarmin, beim Aufblühen heller 0.50	— — Matador. Von schöner Bauart und kräftigstem
- Dr. Febbé. Hellbraun. 50 cm. Mittel 0.50	Wachstum. 40 cm
- Frau W. Klappdor Reinweiß 40 cm Mittel 050	— Rentpayer. Riesengroße, straffstielige Blum. 40 cm 0.50
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50	— Rentpayer. Riesengroße, straffstielige Blum. 40 cm 0.50
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 — Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly,	Chrysanthemum maximum,
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 — Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O 🗆 🐰
 Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50 Rehauge. Stumpfbraun. 90 cm. Spät 0.50 	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dank-
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 — Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50 — Rehauge. Stumpfbraun. 90 cm. Spät 0.50 — Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergeh. 90 cm. Mittel 0.50	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O A Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dank- bareres, als diese großblumigen weißen langstiel.
 Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50 Rehauge. Stumpfbraun. 90 cm. Spät 0.50 Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergeh. 90 cm. Mittel 0.50 Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O A Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dank- bareres, als diese großblumigen weißen langstiel.
 Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50 Rehauge. Stumpf braun. 90 cm. Spät 0.50 Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergeh. 90 cm. Mittel 0.50 Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabatten-
 Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50 Rehauge. Stumpf braun. 90 cm. Spät 0.50 Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergeh. 90 cm. Mittel 0.50 Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind VII-IX
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 — Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50 — Rehauge. Stumpfbraun. 90 cm. Spät 0.50 — Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergeh. 90 cm. Mittel 0.50 — Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 — Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50 — Rehauge. Stumpfbraun. 90 cm. Spät 0.50 — Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergeh. 90 cm. Mittel 0.50 — Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O D & Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dank- bareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabatten- stauden ebenso unentbehrlich sind VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 — Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50 — Rehauge. Stumpf braun. 90 cm. Spät 0.50 — Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergeh. 90 cm. Mittel 0.50 — Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O D & Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dank- bareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabatten- stauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — etl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 — Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50 — Rehauge. Stumpf braun. 90 cm. Spät 0.50 — Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergeh. 90 cm. Mittel 0.50 — Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 — White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O D & Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dank- bareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabatten- stauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — etl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50
 Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50 Rehauge. Stumpfbraun. 90 cm. Spät 0.50 Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergeh. 90 cm. Mittel 0.50 Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät . 0.50 Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O D & Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dank- bareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabatten- stauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen.
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 — Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50 — Rehauge. Stumpf braun. 90 cm. Spät 0.50 — Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergeh. 90 cm. Mittel 0.50 — Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät . 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 — White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende:	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O D & Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dank- bareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabatten- stauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 — Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50 — Rehauge. Stumpf braun. 90 cm. Spät 0.50 — Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergeh. 90 cm. Mittel 0.50 — Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät . 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 — White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O D & Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dank- bareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabatten- stauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 — Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50 — Rehauge. Stumpf braun. 90 cm. Spät 0.50 — Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergeh. 90 cm. Mittel 0.50 — Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät . 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 — White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 — Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten — A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät 0.50	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O D & Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dank- bareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabatten- stauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50 — Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh 0.50 — Rehauge. Stumpf braun. 90 cm. Spät 0.50 — Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergeh. 90 cm. Mittel 0.50 — Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät . 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 — White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 — Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten — A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät 0.50	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O D & Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reich-
 Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O D & Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten
 Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O D & Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumen-
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O D & Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm
 Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm
 Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm
 Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm
 Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O
- Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor. 60 cm 0.60 — Marian Collier. Sehr großblumig, die dreireihigen Blumenblätter sind stark gefranst. 70 cm 0.80 — Mayfield Giant. Riesengroße, edle Blumen auf starken, festen Stielen. 80 cm 0.60 — Non plus ultra. Siehe Neuheiten 0.70 — Ophelia. Die großen Blumen haben eine doppelte Reihe von Blumenblättern, deren Farße im Erblühen zartschwefelgelb ist. 60 cm 0.60 — Phänomen. Edelgeformte Riesenblum. auf straffen Stielen. 70 cm 0.60 — Phyllis Smith. Englische, großblumige Züchtung
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor. 60 cm 0.60 — Marian Collier. Sehr großblumig, die dreireihigen Blumenblätter sind stark gefranst. 70 cm 0.80 — Mayfield Giant. Riesengroße, edle Blumen auf starken, festen Stielen. 80 cm 0.60 — Non plus ultra. Siehe Neuheiten 0.70 — Ophelia. Die großen Blumen haben eine doppelte Reihe von Blumenblättern, deren Farße im Erblühen zartschweßelgelb ist. 60 cm 0.60 — Phänomen. Edelgeformte Riesenblum. auf straffen Stielen. 70 cm 0.60 — Phänomen. Edelgeformte Riesenblum. auf straffen Stielen. 70 cm 0.60 — Phyllis Smith. Englische, großblumige Züchtung mit stark geschlitzten Blumen. 40 cm 0.80
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor. 60 cm 0.60 — Marian Collier. Sehr großblumig, die dreireihigen Blumenblätter sind stark gefranst. 70 cm 0.80 — Mayfield Giant. Riesengroße, edle Blumen auf starken, festen Stielen. 80 cm 0.60 — Non plus ultra. Siehe Neuheiten 0.70 — Ophelia. Die großen Blumen haben eine doppelte Reihe von Blumenblättern, deren Farße im Erblühen zartschweselgelb ist. 60 cm 0.60 — Phänomen. Edelgeformte Riesenblum. auf straffen Stielen. 70 cm 0.60 — Phänomen. Edelgeformte Riesenblum. auf straffen Stielen. 70 cm 0.60 — Phyllis Smith. Englische, großblumige Züchtung mit stark geschlitzten Blumen. 40 cm 0.80
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor. 60 cm 0.60 — Marian Collier. Sehr großblumig, die dreireihigen Blumenblätter sind stark gefranst. 70 cm 0.80 — Mayfield Giant. Riesengroße, edle Blumen auf starken, festen Stielen. 80 cm 0.60 — Non plus ultra. Siehe Neuheiten 0.70 — Ophelia. Die großen Blumen haben eine doppelte Reihe von Blumenblättern, deren Far6e im Erblühen zartschwefelgelb ist. 60 cm 0.60 — Phänomen. Edelgeformte Riesenblum. auf straffen Stielen. 70 cm 0.60 — Phänomen. Edelgeformte Riesenblum. auf straffen Stielen. 70 cm 0.60 — Phyllis Smith. Englische, großblumige Züchtung mit stark geschlitzten Blumen. 40 cm 0.80 — Progress. Großblumige, festgebaute Art. 60 cm . 0.40
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel	Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite, Compositae O Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres, als diese großblumigen weißen langstiel. Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor. 60 cm 0.60 — Marian Collier. Sehr großblumig, die dreireihigen Blumenblätter sind stark gefranst. 70 cm 0.80 — Mayfield Giant. Riesengroße, edle Blumen auf starken, festen Stielen. 80 cm 0.60 — Non plus ultra. Siehe Neuheiten 0.70 — Ophelia. Die großen Blumen haben eine doppelte Reihe von Blumenblättern, deren Far6e im Erblühen zartschwefelgelb ist. 60 cm 0.60 — Phänomen. Edelgeformte Riesenblum. auf straffen Stielen. 70 cm 0.60 — Phänomen. Edelgeformte Riesenblum. auf straffen Stielen. 70 cm 0.60 — Phyllis Smith. Englische, großblumige Züchtung mit stark geschlitzten Blumen. 40 cm 0.80 — Progress. Großblumige, festgebaute Art. 60 cm . 0.40

Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1 St.	Delphinium cultorum,
Chrysanthemum, verschiedene: ○□ X	Delphinium cultorum, Rittersporn, Ranunculaceae O 🗆 🗴 👃 Eine be-
- koreanum. Über saftiggrüner Belaubung erscheinen	nebte Rabatten- und Schnittstaude. Die Blätter
die einfachen, weißen Blumen, die sich im Verblühen bläulich färben. 60 cm IX-X 0.70	sind dunkelgrun und ornamental gespalten, die
— hybr. in Sorten. Siehe Neuheiten 2.50	Blüten stehen in langen Schäften auf hohen Stielen und sind ein großartiges Schnitt- und Dekorations-
- uliginosum (Pyrethrum). Große weiße, herbstblühende	material. Das nachstehend aufgeführte Sortiment
Marguerite. 150 cm VIII-IX 0.50 — stellatum. Niedere Form der vorigen. 100 cm 0.60	enthält das Beste und Schönste, was es hierin gibt.
Cimicifuga, Silberkerze, Ranunculaceae $\bigcirc - \bigcirc \times \cong$	VII-IX
Prächtige ornamentale Staude mit gesiedertem Blatt-	Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten zu RM 60.— 25 Stück zum % Preis.
werk und kerzenartigen Blütenrispen. Ihrer späten	70 2 1013.
Blüte wegen sollten sie in keinem Garten fehlen.	- Artis. Sehr großblumig, dunkelblau mit weißem
Verlangen in sonniger Lage feuchten Boden. — acerina. Mit besonders glänzendem Laub, Blüte	Auge. 150 cm
weiß. 60 cm VIII-X 0.60	100 cm
- compacta. Siehe Neuheiten	balderslidge. Halbgefullt, leuchtend blau mit
— cordifolia (dahurica). Schlanke, kerzenartige, creme- weiße Blütenähren. 100 cm VII-IX 0.70	weißem Auge. 150 cm
- japonica. Frischgrüne Belaubung und kerzenartige	
weiße Blütenstände. 80 cm VIII-X 0.60	Carried Tellottop-rarbe, schaffiert mit vanagra
- simplex. Lange, überhängende Blütenähren. 100 cm VIII-IX 0.60	- Carl von Lange. Gefüllte Blumen in lila mit blaß-
- Armleuchter. Siehe Neuheiten	olad, lange Kispen, 150 cm
— serotina. Blüht 14 Tage später als die Stamm-	John Diddes Wullder, Diehe Neuborton
form. 100 cm VIII-X 0.70 — racemosa. Sehr zierl. Rispen, weiß. 120 cm VII-VIII 0.70	— Die Blonde. Große halbgefüllte Einzelblüten, deren äußerer Blütenkreis in lebhaft kobaltblauer
	and in gutem Nontrast zu dem inneren neren
Clematis, Staudenklematis, Ranunculaceae ○── — Davidiana. Hyazinthenblättrige, wohlriechende Art	ratorgen stent. 150 cm
mit hellblauen Blüten. 80 cm VII-VIII 0.80	Traingeruitt, nimmelplan grobe
integrifolia. Bringt schöne feste blaue Sternblüten.	— Mitte. 150 cm
40 cm VI-VII 0.60 — recta. Mit schönen weißen Blüten in dichten großen	outwarzem Ange. 150 cm
Dolden. 100 cm VII-VIII 0.60	Litzidillulli. Siene Neuheiten
Convallaria majalis. Siehe niedere Stauden.	- Fliederspeer. Siehe Neuheiten
— polygonatum. Siehe Polygonatum.	Geruit Enzianblau mit weißem Auge
Coreopsis, Mädchenauge, Compositae O 🗆 X	100 cm
— grandiflora. Dankbar blühende Staude, langstielige, schalenförm., goldgelbe Blumen. 50 cm. VII-X 0.40	mit weißem Auge, gefüllt 150 am
- lanceolata oculata. Der vorigen gleich an Reichblütig-	Oldisulei Waller Stabo Nambal
keit und Wuchs, ausgezeichnet durch einen braun-	O'O'I O'I III II O'I CHE I VEII NEITHEATEN
roten Ring. 60 cm VII-IX 0.50 - Golden Queen. Durchaus winterharte Art.	is the field is the field in the field is the field is the field in the field in the field is the field in th
Blumen goldgelb. 50 cm VII-X 0.50	- Himmelsauge. Die sehr schlanken Rispen sind mit großen, dichtgefüllten Rosettenblüten eng besetzt.
Perrys var. Feste drahtartige Blumenstiele, Blumen	150
tiefgoldgelb, halbgefüllt. 50 cm VII-X 0.60 — tripteris. Bläulich bereifte Stengel, Blätter dreiteilig	riodisonnier. Sehr spatblühende Sorte kräftig
gelappt, zahlreiche hellgelbe, dicke Blumenköpfe.	armin violett 150 cm 080
180 cm VII-IX 0.60	— Hohenstaufen. Blumen reinindigoblau mit violett. 150 cm
- verticillata. Reichverzweigte, festgestielte, hellgelbe Strahlenblüten, über zierlich schmalblättrig. Laub-	Reinhellblau, Mitte amethyetfankin
werk. Eine der besten Stauden überhaupt.	narogerant. 150 cm
60 cm VII-X 0.50	- King of Delphinium. Herrlich dunkelblau mit leuchtender weißer Mitte. 150 cm
— grandiflora. Siehe Neuheiten 0.80	Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Crambe, Riesenschleierkraut, Cruciferae O \(\perp\)	william Ville Hilling. Leucht, himmelblau ein f. 1
— cordifolia. Große herzförmige Blätter, unzählige kleine weiße Blütchen bilden eine riesige, luftige Blüten-	060
wolke. 150 cm VI-VII 0.70	- Leuchtturm. Siehe Neuheiten 2 Lord Landsdowne. Einfache Blumen von reindunkalblagen B. J.
Crinum, Freilang Amaryllis, Amaryllidaceae ○- ● ⊥ ¾	dunkerblader Farbe, reinweikes Auge 150 1
- Powellii. Mit großen lilienartigen rosa Blumen auf	DidCkillore. Carthan -11 c
starken Stielen; mehrere zusammengepflanzt von	did schwarzer Mitte 150 am 1 50
imposanter Wirkung. 60 cm VII-VIII 1.— — album. Weißblühende Art. 60 em VII-VIII 1.—	— Morgenstrahl. Siehe Neuheiten
	and a sent grouporuming, eintach 180 am
Cypripedium. Siehe unter niederen Stauden.	discondition. Stark getuilt duple-ill
Datisca, Scheinhanf, Datiscaceae ○ ⊥ — cannabina. Buschige Dekorationsstaude mit hanfar-	
tiger Belaubung und rispentraubigen gelblichen	— Nora Ferguson, Wundervoll
Blüten. 200 cm VII-VIII 0.80	Rispen, gesunde Belaubung. 140 cm 0.80
	0.80

Delphinium cultorum (Fortsetzung) 1 St.	Delphinium Belladonna-Hybriden (Fortsetzung) 1St.
— Pannonia. Halbgefüllt, kobaltblau mit weißem	— Tankred. Marineblaue Blumenblätter, rotviolett
Auge. 150 cm	getuscht, cremefarbene Hülle, sehr großblumig und
- Prinz Gustav. Halbgefüllt, violettblau, riesige	reichblühend. 120 cm
Rispen. 150 cm	blauen Blüten. 100 cm 0.70
— — Queen Mauve. Blumen zartviolett mit salvia-	— — Widukind, Reinblau m. cremefarbig. Mitte. 120 cm 0.60
blauem Schein. 150 cm	Delphinium, verschiedene: ○□ ¾ VI-VIII
— Rev. E. Lascelles. Großblumig, violettblau, großes	— atropurpureum. Der frühblühendste aller Rittersporn-
Auge blau und weiß. 120 cm	arten. Große Blumen, leuchtend purpurviolett mit
Rijnstroom. Zartlila mit weißem Auge. 150 cm . 0.80	schwarzer Mitte, 80 cm 0.80
 Rosenenzian. Siehe Neuheiten	— Phoenix. Dunkelviolette Rispen. Sehr reichblühend 1.—
- Rossel. Klarkobaltblau, mit reinweißer Mitte. 120 cm 0.60	— Parzival. Schlanke, dunkelblaue Rispen. 60 cm . 1.50 — Siegfried, Kompakte, hellviolette Rispen. 60 cm . 1.—
— Schwabenstreich. Sehr frühblühend, große Einzel-	— Siegfried. Kompakte, hellviolette Rispen. 60 cm . 1.— — Tannhäuser. Tiefviolette Rispen. 60 cm 1.—
blüten, zartlila, außen blaßblau. 150 cm 0.60	— Zwergriffer. Tiefviolette Blumen mit brauner Mitte 2.—
— — Staatspräsident. Großrispig, rein lila, hintere	— grandiflorum chinense. Stark geschlitzte Belaub. mit
Blumenblätter himmelblau. 150 cm 1.—	unzählichen, leuchtend blauen Blüten. 50 cm 0.40
Stuttgardia. Große Blütenrispen von einf. himmel-	cinerarea. Cinerarienblütig, sehr reichblühende
blauer Farbe und weißer Mitte. 150 cm 0.80 — Sven Ridder. Dunkelpurpurblau, mit einem großen	Form, leuchtend blau. 50 cm
Kranze weißer und blauer Staubfäden. 120 cm . 0.80	— — — Tom Thumb. Siehe niedere Stauden 0.40 — nudicaule. Siehe niedere Stauden 0.60
- The Alake. Halbgefüllt, außen blauviolett, innen	— sulphureum (Zalil). Knollenbildende Art mit großen
rötlichviolett. 200 cm	schwefelgelben Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.80
- Triumph. Violettblaum. sehr groß. weiß. Auge. 150cm 0.80	Dicentra (Dielytra), Tränendes Herz, Papaveraceae
- Tropennacht. Siehe Neuheiten	0-0-1
— Überwinder. Siehe Neuheiten	- spectabilis. Beliebte Frühlingsstaude m. schöngeformt.
— Van Veens Triumph. Schöne halbgefüllte Blumen, etwa 7 cm Durchmess., prächtig zartrosalila. 150 cm 0.80	Laub und gespornten rosa Blüten in graziösen
- Vergifmeinnicht. Leuchtend lieblich hellvergif-	Ahren. 60 cm V-VI 0.60
meinnichtblau, halbgefüllt. 150 cm 0.60	Dictamnus, Diptam, Rutaceae ○-① ≅ ⊥
- Wilhelm Storr, Himmelbl mit rosa, großbl. 150 cm 0.60	- caucausicus (giganteus). In allen Teilen größer als
- Württembergia. Tiefveilchenviolett mit weißer	die folgenden Sorten. 70 cm V-VII 0.70 — fraxinella. Schöne frischgrüne, eschenblätterige Staude
Mitte, sehr großblumig. 150 cm 1.—	mit rosaroten Blütenständen, denen ein ätherisches,
— Zuster Lughten. Blüten gefüllt, edle Form, Farbe dunkelblau. 150 cm 0.60	explosives Ol entströmt. 60 cm V-VII 0.70
— Zuidersee. Großblumig, lilablau, halbgefüllt mit	— albus. Mit weißen Blüten. 60 cm V-VII 0.70
schwarzer Mitte. 180 cm 0.60	Digitalis, Fingerhut, Scrophulariaceae O-1
- Hybridum. Aus Samen gezogener Rittersporn, ein	- ambigua. Blüt. hellgelb bräunl. gead. 80 cm VI-VII 0.50
feinstes Farbenspiel	— ferruginea. Große wintergrüne Blattrosetten, gelbe Blütenrispen. Zweijährig, sät sich aber an Ort
Delphinium Belladonna-Hybriden ○□¾ ⊥ Der nur	und Stelle selber aus, so daß sie mehrjährig wirkt.
mittelhohe Wuchs, das außerordentlich reiche Re-	50 cm VI-VII 0.40
montieren u. die schlanken zierlichen Rispen machen	— purpurea gloxiniaeflora. Die Blütenfarbe variiert
sie besonders wertvoll VII-IX	vom reinsten weiß bis dunkelrot. Die Blumen sind
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu RM 48.—	inwendig mit helleren und dunkleren Flecken und
	Punkten geziert. 100 cm VI-VII 0.40 Diplostephium amygdalinum. Siehe Aster umbellatus.
Ab 25 Stück zum ⁰ / ₀ Preis.	Doronicum, Gemswurz, Compositae ○-①□ %
— — Arnold Böcklin. Klar gentianenblau mit weißer Mitte. Eine vorzüglich leuchtende Farbe, reich und	— caucasicum. Wertvoller Frühlingsblüher für jeden
anhaltend blühend. 150 cm 0.60	Boden. Blumen goldgelb. 30 cm IV-V 0.40
— — Andenken an Aug. Koenemann. Leucht. lasur-	— magnificum. Blüte goldgelb, margueriten ähnl. 40 cm 0.40
kobaltblau, die Seitenblätter an den Spitzen rosa	- Clusii. Großblumig, wie plantagineum excelsum, aber
gefärbt, Mitte weiß, sehr großblumig. 120 cm 0.70	in gleichmäß. Höhe blüh., goldgelb. 50 cm IV-V 0.40 — cordifolium (Columnae). Blüht früh, wie caucasicum,
- Bayard. Hellasurblau mit rosa getuscht, in der	aber mit schöneren und größeren gelben Blüten,
Mitte cremefarben. 150 cm 0.60 — Berlichingen. Sehr frühblüh., dunkelviolettblau.	die alle in einer Höhe stehen. 40 cm. V-VI 0.40
150 cm	— — Mrs. Masson. Besonders großblumig, goldgelb.
Capri. Edelgeformte Blüten in reich verzweigten	Außerordentlich reichblühend. 40 cm. V-VI 0.50
Rispen, einfach, hellblau. 120 cm 0.70	— plantagineum excelsum. Schlanke Blütenstiele, große,
— — Dan Leno. Hellkobaltblau m. weiß. Mitte. 100 cm 0.60	edelgeformte, leichtgewellte, gelbe Scheibenblumen. 80 cm · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
— Lamartine. Einfach leuchtend dunkelblau. 100 cm 0.70	- — compactum. Niedere, geschlossene, gleich-
- Moerheimii. Reichverzweigte Rispen von rein-	mäßige Büsche bildend. Gelbblühend. 50 cm 0.60
weißer Farbe mit gelblichem Auge. 120 cm 0.50	Dracocephalum, Drachenkopf, Labiatae O A 🗆
- Mrs. Thomson. Lange Rispen, leuchtend blau mit	- Forresti. Blätter dreispaltig mit linealen Zipfeln. Blu-
weißer Mitte. 100 cm	men quirlig dicht, violettblau. 40 cm. VII-IX 0.60
donna gleich, zeichnet sich vor diesem durch doppelt	- Ruyschianum. Blätter schmallanzettlich, Blüten leuch-
so große hellblaue Blumen u. entsprechend starkem	tend blau, 40 cm VI-VII 0.40
Wuchs aus. 150 cm	— japonicum. In Tracht ähnlich der vorgenannten, jedoch mit noch größeren, leuchtend blauen Blumen.
Sky blue Lamartine. Prächtig himmelblau mit	60 cm VI-VII 0.50
dunklem Schein. 100 cm 0.70	- virgianum Siehe Physosterie

Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1St.	Euphorbia, Wolfsmilch, Euphorbiaceae O O A 1 St.
Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1 St. R.M. Echinops, Kugeldistel, Compositae O O D X	— epithymoides (polychroma). Wunderhübsche Art mit
Aufrechte, ornamentale Staude mit meist graugrün-	leuchtend gelben Blütensträußen. 40 cm V-VII 0.50 — Siehe auch niedere Stauden.
stacheliger Belaubung und runden Blütenköpfen. — bannaticus. Hellblaue Kugeldistel. 150 cm VIII-IX 0.50	
- bannaticus. Hellblaue Kugeldistel. 150 cm VIII-IX 0.50 humilis. Sehr schöne, intensiv dunkelblaue Kugel-	Filipendula (Spiraea) Spierstaude, Rosaceae ○-① ≅ ⊥ □ Üppig wachsende Pflanzen
blumen. Niedrigste Sorte. 100 cm VIII-IX 0.60	mit dekorativer Belaubung und federigen Blüten-
— niveus. Silberweiße Kugelblüten. 150 cm VIII-IX 0.50 — ritro. Hohe blaue, unverwüstliche Kugeldistel.	rispen VII-VIII — camtschatica gigantea. Die weißen Blumen erscheinen
150 cm VIII-IX 0.50	in großen flachen Dolden, sehr dekorativ. 180 cm 0.60
Epilobium , Weidenröschen, Oenotheraceae ○- • □ ≅	 rosea. Rosafarbige, prächtige Art. 200 cm 0.60 - hexapetala fl. pl. (Spiraea filip. fl. pl.). Mit feiner
Dodonaei. Rosmarinblättrige Staude mit lilapurpurnen Blütenrispen. 60 cm VII-VIII 0.60	Belaubung und dichtgefüllten, blendendweißen Blü-
Eremurus, Lilienschweif, Liliaceae O D \(\text{Lußer-} \)	ten in lockeren Sträußen. 40 cm
ordentlich starkwachsende, prächtige Solitärstaude, mit großen Blumen an langen Rispen V-VI	— palmata. Blüten leuchtend karminrot in hübschen Doldentrauben. 120 cm
— Bungei. Goldgelbe Blütenschäfte von hervorragender	— alba. Große, weiße Rispen. 120 cm 050
Wirkung. 100 cm	— elegans. Mit zartrosa Blüten. 120 cm 0.50 — rubra (lobata). Schöne, leuchtend rosarote Blüten-
— Elwesii. Kräftige Blütenstiele mit zartrosa Blumen.	rispen. 40 cm 0.60
— himalaicus. Mit weißen Blüten. 150 cm 4.—	 venusta. Mit hellrosa Blütensträußen. 100 cm 0.50 L'Innocense. Weiße Blüten mit rosaroten
— robustus. Schönste rosablühende Sorte. 200 cm 4.— Shelfordii. Kupferig- bis bräunlichrosa Blütenrispen.	Staubfäden. 150 cm 0.60
120 cm	— — magnifica. Mit prächtig rosenroten Blüten-
Erica. Siehe unter Heidekräuter.	sträußen. 120 cm
Erigeron, Berufkraut, Compositae O - & Unverwüstliche Dauerstaude mit asternähnlichen	- II. Pl. Mit dichtgefüllten Blüten von blendendweißer
Strahlenblüten VI-IX	Farbe und stark auffallender Wirkung. 80 cm 0.50 Funkia. Siehe Hosta.
— hybr. Asa Gray. Schöne aprikosenfarb. Blüten. 30 cm 0.50 — Hundsstern. Siehe Neuheiten	
— — Lasur. Großblumig, dunkellila. 40 cm 0.50	Gaillardia, Kokardenblume, Compositae O Außerordentlich reichblühende Staude mit stark
— Merstham Glory. Siehe Neuheiten 0.80 — Mrs. E. M. Beale. Siehe Neuheiten 0.80	behaarter Belaubung und großen margueritenähn-
— Quakeress. Edle, große, mattrosalila Blüten. 50 cm 0.50	lichen Blumen in feinstem Farbenspiel. VI-X — aristata Brunhilde. Sehr großblumig, weinrot mit hell-
— — Sommerneuschnee. Siehe Neuheiten 0.60	gelb. 40 cm
— mucronatus Moerheimii. Siehe Neuheiten 0.80 — speciosus roseus. Siehe Neuheiten 0.70	— Burgunder. Großblumig, einfarbig rot. 40 cm 0.50 — compacta. Niedrig bleibende Form. Blüten gelb
— Ronsdorf. Siehe Neuheiten 0.60	mit rot. 30 cm
— semiplenus. Lavendelblau, halbgefüllt. 50 cm . 0.50 — superbus grandiflorus. Großblumige, dunkelblaue	— Lady Rolleston. Sehr großblumig, einfach reingelb. 40 cm
Varietät mit gelber Scheibe. 50 cm 0.50	— Rossdorier Hybriden. Kirschrot mit hellgelbem
— Wuppertal, Siehe Neuheiten 0.70 Erodium, Siehe niedere Stauden.	Zentrum, sehr apartes Farbenspiel. 50 cm 0.40 — The Prince. Siehe Neuheiten
Eryngium, Edeldistel, Umbelliferae ○ ∞ □ ¾ Eignen	- regalls. Aufrechtwachsend mit sehr großen Blumen
sich besonders für leichten, auch steinigen Boden	auf starken Stielen. 50 cm
und sind sehr anspruchslos. Der stachelige Kelch und die gleichfalls stacheligen zerschlitzten Blätter	Galega, Geißraute, Leguminosae O-D officinalis Hartlandii. Lang blühende wickenähnliche
geben der Pflanze ein bizarres Aussehen VII-X	Staude mit weiß und lila Schmetterlingsblüten.
— alpinum superbum. Herrlich stahlblau gefärbte Blütenköpfe an langen Stielen. 60 cm 0.60	120 cm VI-VIII 0.50
- hybr. Juwel. Blüht 3 Wochen früher als alle anderen	Gentiana, Enzian, Gentianaceae ○-① ≅ □ ¾ — asclepiadea. Dunkelblauer Knäuel-Enzian mit schmal-
Sorten, Hüllblätter, Stiele und Köpfe dunkelstahlblau. 60 cm	lanzettlicher Belaubung. 50 cm VII-VIII 0.70
— Violetta. Ebenso früh wie die vorstehend genannte	- dibd. Weiße Form der vorigen, 50 cm VII-VIII 0.70
Varietät, prächt. violette Farbe d. Blütenst. 60 cm 0.60 — Oliverianum superbum. Sehr großblumige, intensive	— lutea. Goldenzian. Aufrechte Risp., goldgelb blühend. Belaubung lederig bläulichgrün. 150 cm VII-VIII 0.80
Blaufärbung. 70 cm	— Siehe auch niedere Stauden.
- planum. Blüht blau in zierlichen Blütenköpfen. 120 cm 0.40	Geranium. Siehe unter niedere Stauden.
— argenteum. Silberweiße Blütenköpfchen. 120 cm 0.40 — Blauer Zwerg. Sehr niedrig, leuchtend blau. 80 cm 0.50	Geum, Nelkenwurz, Rosaceae O - D Sehr empfeh- lenswerte Stauden mit immergrünen Blattrosetten
— yuccaefolium. Siehe Neuheiten	und zahlreichen großen, erdbeerartigen Blitten-
— Siehe auch niedere Stauden.	ständen. In größerer Zahl angepflanzt sind sie von sehr auffallender Wirkung.
Eupatorium, Dost, Compositae ○-① ≅ — ageratoides. Hübsche Staudenart mit großen Dolden	- Borisii. Im Wuchs viel Ahnlichkeit mit Geum coggingum
reinweißer Blumen. Erscheint wie ein riesiges	Die Bluten sind jedoch von viel leuchtenderer
Staudenageratum. 100 cm VII-X 0.50 — cannabinum fl. pl. Purpurrosa, halbgefüllt. 150 cm . 0.50	orangescharlach Farbe u. erscheinen ununterbrochen während mehrerer Monate. 40 cm V-VIII 0.6
- Fraseri, Ahnlich ageratoides, Wuchs u. Bluten jedoch	- bulgaricum. Große, remorangegelbe Blumen immer
graziöser, cremweiß blühend. 100 cm VIII-IX 0.50 — purpureum. Robuste Staude mit quirligen Blättern u.	— chiloense Mrs. Bradshaw. Große gefüllte Blitten von
großen, weinroten Blütendold. 120 cm VII-VIII 0.60	leuchtend scharlachroter Farbe. 40 cm. VI-VII 0.5






Lilium regale



Phiox paniculata Württembergia




Trollius hybr. Earliest of All


Heliopsis scabra (Fortsetzung)	Heuchera, Purpurglöckchen, Saxifragaceae O- 🕽 🗆 🗴 1 St.
— — major. Schöne edelgeformte Blumen von orange-	Ein Liebling jedes Staudenkenners. Die glocken- förmigen Blütchen vereinigen sich massenhaft an
gelber Farbe. 150 cm VIII-X 0.40 — zinniaeflora. Die Pflanze erreicht nur eine geringe	zierlichen Rispen. Sehr anmutige Pflanze im Stau-
Höhe. Farbe leuchtend goldgelb, fast ganz gefüllt-	dengarten VI-VIII
blühend. Besond. haltb. Schnittbl. 60 cm VII-IX 0.50	Wir liefern ein feines Sortiment 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu RM 40.—
Helleborus. Siehe niedere Stauden.	25 Stück zum ⁰ /o Preis.
Hemerocallis, Taglilie, Liliaceae ○ ≅ ─ □ □ ₺	- brizoides gracillima. Feinverzweigte Blütenrispen
Unverwüstliche, dauerhafte Schmuckstaude. Über den schilfartigen, meist überhängenden Blättern	von zartrosa Färbung. 40 cm
stehen auf eleganten Stielen die becherförmigen,	40 cm
liliengleichen Blüten in gelben und orangefarbenen	- hybr. convallaria nivea. Schneeweiße Blüten, in Form
Farbtönen. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in	und Größe an Maiglöcken erinnernd. 40 cm 0.50 — Edge Hall. Kräftigrosa Blumen auf straffen
20 Sorten zu RM 40.—. Ab 25 Stück Hundertpreis.	Stielen. 50 cm
— aurantiaca. Starkwüchsige Art mit orangefarbenen	— Feuerregen. Zahlreiche große Blumen von feuerroter Farbe. 40 cm
Blumen. 50 cm VII-VIII 0.60	— Feuerrispe. Großbl., feuerrot weithin leucht. 40 cm 0.60
— citrina. Echt. Im Habitus ganz verschieden von den andern, hellzitronengelb, 8–10 Wochen lang blühd.,	— Frühlicht. Zartrosa, früh- und reichblühend. 40 cm 0.50
vornehmste Art. 70 cm VII-IX 0.80	— Girandole. Abart der vorigen mit frischkarmin- rosa Blüten. 40 cm
- hybr. Baronii. Sehr große, zitronengelbe wohl-	— Kleeberger. Herrl. zinnoberrot. groß. Glöckch. 40 cm 0.60
riechende Blumen mit großen, schmalen Blumen- blättern. 100 cm VII-IX 0.80	— Panorama. Marmoriertes Laubwerk, karmoisin-
— Dumortieri (rutilans). Blumen chromgelb.	farbige Blüten. 40 cm
40 cm V-VI 0.50	 Titania. Rosenrote, enorm starkwüchs. Züchtg. 50 cm 0.60 multiflora robusta. Sehr reichblühend, Blume kräftig
flava. Gelbe, herrl. duftende Sorte. 40 cm VI-VII 0.40	rosa. 40 cm
— fulva (Kwanso). Sehr starkwüchsig. Orangegelb, ohne Geruch. 70 cm VII-VIII 0.50	- sanguinea splendens. Leuchtend rote Blüten auf
- fl. pl. Japanische Taglilienart von feiner orange-	festen straffen Stielen. 30 cm
roter Farbe, stark gefüllt. 100 cm VII-VIII 0.60	grünen Blattrosetten. 40 cm V-VI 0.50
— fol. var. Mit weiß gestreiften Blättern. 70 cm VII-VIII 0.70	— alba. Während der Blütezeit mit einer Menge rein-
— graminea (minor). Grasartig feine Belaubung, hell-	weißer Blumen übersät. 40 em V-VI 0.50 Hibiscus. Siehe Sumpfstauden.
gelbe Blüten. 40 cm VII-VIII 0.50	Hosta, Herzlilie (Funkie), Liliaceae ○≃-①: #:
— hybr. Apricot. Schön aprikosenfarbig, frühblühend. 50 cm VI-VII 0.40	Die Funkien gehören zu den vorzüglichsten Deko-
— — Aureola. Orangefarben, außen bräunlich.	rationspflanzen. Sie bilden Büsche mit schöner Be-
50 cm VII-VIII 0.50	laubung. Die meist lilafarbenen Blüten erscheinen in schlanken Rispen. Gute Blattstaude, auch an
— Gold Dust. Dunkelgelb, sehr reichblühend. 50 cm VI-VIII 0.40	Bassins u. Ufern sehr geeignet. 40-60 cm VII-VIII
- Margaret Perry. Siehe Neuheiten. 1.20	- Fortunei. Breitblättrig, graugrün, Blumen weißlichlila 0.60
— Orange Man. Orangegelb, großblumig.	— glaucescens. Breitblättr., graublau. Blumen hellila 0.60 — robusta. Stahlblaue, breite, große Blätter von
70 cm V-VII 0.40 — Souvereign. Hellorangegelbe, große, schöngeformte	schöner Wirkung, violette Blüten 0.60
Blumen. 80 cm VI-VII 0.50	— jap. lancifolia. Schmale Blätter, blaublühend 0.50
— Mülleri. Großblumig, zitronengelb, reichblühend.	— — angustifolia. Besonders schmale, hellgrüne Belaubung, Blumen violett
— Nilbio. Große flachtrichterförmige Blumen von	— — marginata. Kleine weißgeränderte Blätter,
herrlicher rotorange Färbung. 100 cm VII-VIII 0.60	Blüte hellila
— Queen of May. Früh- und reichblühend, orange- gelb. 50 cm V-VII 0.60	— minor alba. Kleinblättrige, schr reichblühende Art, weißblühend
— Viscountess Byng. Siehe Neuheiten. 1.50	— — undulata vittata. Weißbuntblättr., schön gewellte
— luteola. Der Blütenstand trägt nacheinander 6-9 große,	Form. Blumen violett
zitronengelbe Blumen. 70 cm VI-VII 0.40 — major. Besonders großblumig und reichblühend.	weiß, violettblaue Blüten, gute Treibsorte 0.50
70 cm VI-VIII 0.50	— ovata (coerulea). Große dunkelgrüne Blätter, klein-
— — pallens. Blumen mehr sternförmig, hellgelb.	blumig
50 cm VI-VII 0.50 — Middendorffii (Regeliana). Große Blüten von tief-	— aurea. Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün,
orangegelber Farbe, eine der schönsten.	hellblaue Blüten. Sehr gute, neuere Treibsorte . 0.50
40 cm VI-VIII 0.50	— superba. Großbl., lila, lilienart., Blätter dunkelgrün 0.60 — Sieboldii. Blätter sehr groß, blaugrün, blaublühend . 0.60
— ochroleuca. Mattgelb, großbl. 70 cm VII-VIII 0.50	— subcordata grdfl. Blum.weiß, wohlriech., Laub hellgrün 0.60
Thunbergii. Große reinschwefelgelbe Blumen.	Hyssopus, Ysop, Labiatae O A
Heracleum, Herkulesstaude, Umbelliferae ○ ⊥	officinalis. Schmalblättrig, aromatisch duftender Klein-
- villosum (giganteum). Sehr wirkungsvoll durch ihre	strauch mit leucht. blau. Blüten. 30 cm VI-VIII 0.50 — alba. Weißblühende Abart der vorigen. 30 cm . 0.50
großen, gezackten Blätter und ihre riesigen, weißen	Incarvillea, Freilandgloxinie, Bignoniaceae O A
Blütendolden. 2 m VII-VIII 0.70	- Delavayi. Knollenartige Staude mit großen, gefiederten
Hesperis, Nachtviole, Cruciferae O & — matronalis alba plena. Levkojenähnliche Staude,	Blättern und trompetenartigen, rosaroten Blumen.
weiß refüllthl wohlriechend 50 cm V VII 050	50 cm V-VII 0.50



Delphinium cultorum Purpurritter



Centaurea pulcherrima



Liatris spicata



Physostegia virginiana



Chrysaboltonia pulcherrima



Coreopsis lanceolata oculata



Lysimachia clethroides



Papaver orientale gracile Perkeo



Eryngium yuccaefolium

Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1St.	Iris germanica (Fortsetzung) 1St.
Inula, Alant, Compositae O 🗆 🗘	— Forsete. Einfarbig dunkellavendelblaue Blüten
- glandulosa. Auf kräftigen Stielen herrliche große,	sitzen an 120 cm stark verzweigten Blütenstielen 0.50
orangegelbe Strahlenblüten. 40 cm . VI-VII 0.50	— Fürstin Lonyay. 120 cm hohe, violettlilafarbene
— laciniata. Blüten fein geschlitzt, wodurch dieselben ein äußerst zierl. Aussehen erhalten . VI-VII 0.60	Domblätter und weinrote Hängeblätter, am Grund
— macrocephala. Dekorative hochwachsende Staude mit	stark weiß genetzt. 100 cm. Mittelfrüh 0.50
reichverzweigten Blütenständen und großen hell-	- Fylla. Hellgelber Dom, kastanienbraune, breit hell-
gelben Strahlenblumen. 150 cm VII-VIII 0.60	gelb gerandete Hängeblätter, hervorrag. Gruppensorte. 60 cm. Mittelfrüh
- Royleana. Prächtige seltene Staude aus dem Himalaya,	— Gajus. Dom der Blume reinlichtgelb, untere Blätter
mit großen gelben Blütenscheib. 70 cm VII-VIII 0.80	gelb mit scharfen roten Linien netzartig geadert.
— salicifolia. Siehe Buphthalmum.	60 cm. Früh
Iris, Schwertlilie, Iridaceae O = X	— Gandvik. Dom lavendelblau, Hängeblätt. veilchen-
Iris pumila und pumila hybrida. Siehe niedrig bleibende Stauden.	blau mit lavendelblauem Rand. 60 cm. Spät 0.80
Iris interregna. Eine Klasse, die den Flor zwischen Iris	— Goldvließ. Dom klargoldgelb, Hängeblätter rot-
pumila u. Iris germanica ausfüllt. 50 cm V	braun mit scharfem, goldgelben Rand. 50 cm 0.60
- Frithjof. Domblätter klarhellavendelblau, Hänge-	— Grace Sturtevant. Siehe Neuheiten 2.—
blätter samtigveilchenblau	— Grachus. Zartgelb mit rot, netzartig geadert, niedrig, eine der reichblühendsten. 60 cm. Früh 0.40
— Gerda. Domblätter lichteremegelb, die Hängeblätt.	— Havamal. Dom cremefarben mit lichtlila Anflug,
etwas dunkler mit goldgelber Aderung 0.40	Hängeblätter violettblau, mit breitem, cremefar-
— Halfdan. Einfarbig hellcremegelb 0.40	benen Rand. 60 cm. Mittelfrüh
— Helge. Lichtzitronengelb mit perlmutterfarbenen Stempelblättern	— Her Majesty. Edle Blumen von reiner rosalila Fär-
— Ingeborg. Reinweiß, sehr großblumig 0.40	bung. 60 cm. Mittelfrüh 0.40
- Walhalla. Obere Domblätter lilalavendelblau,	— Iduna. Dom zarthellgelb, Hängeblätter veilden-
Hängeblätter samtigweinrot 0.40	blau, hellgelb gerandet. 60 cm. Früh 0.60 — — Ilsan. Lichtlilarosa gefärbter Dom, dunkelweinrote
Iris germanica, Deutsche Schwertlilie. Wegen ihrer	Hängeblätter. 80 cm. Mittelfrüh 0.50
dekorativen schwertförmigen Blätter und schön ge-	— — Ivald. Klargelber Dom mit bräunlichgelben, weiß-
bauten farbenprächtigen Blüten, ihrer Anspruchs-	geaderten Hängeblättern. 60 cm. Mittelfrüh 0.80
losigkeit an Boden u. Standort, zählen die Schwert-	— — Iwein. Dom hellblau, Hängeblätter purpurviolett.
lilien zu den beliebtest. Gartenpflanzen V-VI	80 cm. Mittelfrüh 0.40
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück	— Kanaria. Eine reichblühende Neuheit mit kräftigem.
in 20 Sorten unserer Wahl zu RM 36.— 25 Stück zum % Preis.	gesunden Wuchs, Die mittelgroßen, wohlgeformten
— — Aareshorst. Dom lilafarben, in dunkeloliv über-	Blumen sind von reindunkelgoldgelber Farbe. 60 cm 0.60
gehend. Hängeblätter violett. 80 cm. Früh 0.80	— Kastor. Einfarbig mattblau, sehr edel in der Form.
- Aegir. Dom fast reinweiß, Hängeblätter lebhaft	— Kupferhammer. Große, edle Blumen mit leuchtend
karminrot. 80 cm. Mittelfrüh 0.60	goldgelbem Dom und samtig dunkelbraunen Hänge-
- Alfhem. Dom zartlavendelblau, gelblich gedeckt,	blattern, die leuchtend gelb gerandet sind, 60 cm 0.60
Hängeblätter violettblau. 70 cm. Spät 0.60	—— La Beaute. Edle Blütenform von herrlich hell-
— Alberti. Dunkelblauviolett, sehr großbl. 80 cm. Früh 0.40	himmelblauer Farbe. 50 cm. Früh 0.50
- Ambassadeur. Dom bronzeviolett, Hängeblätter dunkelrotviolett. 80 cm. Spät	— Lenzschnee. Grundton weiß, Hängeblätter lichtlila
- Asa. Dom cremegelb, die flachausgebreit. Hänge-	weich geadert. 60 cm. Spät 0.80 — Lohengrin. Von gigantischem Wuchs mit riesigem
blätter gelblichweiß geadert. 60 cm. Mittelfrüh . 0.60	Blattwerk und auffallend großen Blüten, die catt-
— Asmund. Rötlichviolette Hängeblätter mit gold-	leyenrosa gefärbt sind. 100 cm. Mittelfrüh 0.40
gelbem Bart, lavendelblauer Dom. 80 cm. Mittel . 0.80	- Loreley. Ultramarinblau mit creme Aderung und
— Atropurpurea. Dunkelbl., fast schwarz. 70cm. Früh 0.50	lichtgelb gerändert. 60 cm. Früh
— — Aurea. Reinkarnariengelb. 50 cm. Früh 0.40 — Balder. Der gelbolivefarbige, leicht bläulichen	— Li.A. Williamson. Dom lobelienblau, Hängeblätter
Schimmer zeigende Dom erhebt sich auf dunkel-	samtigpurpur. 70 cm. Mittelfrüh 0.80
pflaumfarbigem, olive gerändertem Sockel. Spät . 0.50	— Madame Chereau. Reinweiß mit zartlila gerändert und geadert. 80 cm. Mittelfrüh 0.40
— Bele. Dom lilafarbig, Hängeblätter weinrot, stark	— Maori King. Obere Blumenblätter dunkelgoldgelb,
geadert. 50 cm. Mittelfrüh 0.60	untere dunkelschwarzbraun mit gelbem Rande
— Brising. Purpurviolette Hängeblätter mit 7-8 mm	50 cm. Mittelfrüh
breitem weißen Rand und stark getigerte Aderung,	1 — — Mimung. Reinhellblau. 60 cm. Mittelfrijh 040
hellcremefarbener Dom. 60 cm. Mittelfrüh 0.80 — Bronzeschild.NiedrigerWuchs, Dom bräunlichgelb,	—— Willings. Domblatter lichtgelb; Hängeblätter: tief-
Hängeblätter samtigbraun. 60 cm. Spät 0.60	und klarweinrotviolett. 60 cm. Mittelfrüh 0.40
— Céleste. Himmelblau. 50 cm. Früh 0.40	— Mrs. Alan Gray. Prächtig zartrosa, zuweilen im Sommer ein zweites Mal blühend. 40 cm. Früh 0.40
— Député Nomblot. Siehe Neuheiten	— Mrs. Neubronner. Dom-u. Hängeblätter leuchtend
— Eckesachs. Domblätter zartlavendelblau, Hänge-	tiergoldgelb. 50 cm. Mittelfrüh
blätter hellpurpurviolett. 60 cm. Früh 0.40	- Wirs. H. Darwin. Wachsartigweiß, untere Blumen
— Fatum. Hängeblätter tiefsamtigschwarzblau, Dom-	blatter leicht violett geadert. 60 cm. Mittelfriib 040
blätter dunkelblau. Straffwachsende Sorte, 70 cm 0.60	- Wirs. Reume. Ruppel zarthlablau, wachsweiß und
— Flammenschwert. Domblätter hellgelb, Hängeblätter samtigbraun. 60 cm. Mittelfrüh 0.70	zartilla geadert. 70 cm. Spät
— Florentina. Groß, weiß, innen perlmutterfarben	— Nadia. Siehe Neuheiten
schimmernd. 60 cm. Früh 0.40	— Nibelungen. Domblätter olivenfarben m. schwefel- gelbem Anflug; Hängeblätt. tiefpurpurviolett. 80 cm 0.50
— Folkwang. Weinrote Hängeblätter mit stark her-	Nordalla. Riesengroße Bluten, deren Dom licht
vortretender braungelb. Aderung auf hellem Grund,	lavendel mit goldenem Schimmer ist. Hängeblätter
lichtrosafarbener Dom. Mittelfrüh. 60 cm 0.60	violett mit breitem weißen Rand 70

Iris germanica (Fortsetzung)	Iris (Fortsetzung)
St.M.	RM
— Odenvogel. Dom zitronengelb, Hängeblätter	— foetidissima fol. var. Breite, grasartige, weißbunte Belaubung. 50 cm VI-VII 0.80
purpurviolett, gelb gerandet. 70 cm. Früh 0.60 — Pallida dalmatica. Blumen sehr groß, zartlavendel-	— graminea. Blüten von blauer, weißer und purpurner
blau. 120 em. Spät 0.40	Farbe und aprikosenartigem Duft, Belaubung gras-
— Pfauenfeder. Domblätter hellgelb, Hängeblätter	artig. 40 cm VII-VIII 0.60
violettblau mit hellgelbem Rand, von niederem	— japon. Ledgers var. Siehe Neuheiten 1.—
Wuchs. 60 cm. Mittelfrüh 0.50	— laevigata. Aehnelt stark Iris Kaempferi, ist aber be-
— Prinzess Viktoria Luise. Domblätter klarlicht-	deutend härter als diese. Schöne, tiefblaue Blumen.
schwefelgelb, untere Blumenblätter pflaumfarben	50 cm VI-VII 0.70
mit cremefarbener Umrandung. 70 cm. Mittelfrüh 0.40	— fol. var. Buntblättr. Form d.vorig. 50 cm VI-VII 0.70
- Pullach. Sehr frühblühd., dunkellila, 80 cm. Früh 0.40	— Rose Queen. Blum. prächt. rosa. 50 cm VI-VII 0.70
— Queen of May. Die rosalila Blüten stehen auf	- Monspur. Prächtiger Wuchs, Blüten von herrlich licht- blauer Farbe. 100 cm VI-VII 0.60
schlanken hohen Stielen. 80 cm. Mittelfrüh 0.40 — Rheinfels. Besonders große, edle Blumen, Dom	orientalis. Von schön tief blauer Farbe mit leichter gelb,
und Hängeblätter weiß, an den Rändern porzellan-	schwarz und weißer Zeichnung auf den äußeren
blau geadert. 80 cm. Spät 1.—	Blumenblättern. 50 cm VI-VII 0.40
— Rheingauperle. Zartrosa, der Dom etwas heller	— Schneekönigin. Große, elfenbeinweiße Blumen
als die Hängeblätter. 60 cm. Mittelfrüh 0.50	auf 60 cm hohen, schlanken Stielen . VI-VII 0.50
- Rhein-Nixe. Domblätter reinweiß, Hängeblätter	— pseudacorus. Gelbblühende Wasserschwertlilie. 80 cm 0.40
tiefveilchenbl. mit weißem Rand. 100 cm. Mittelfrüh 0.50	- sibirica. Von schlankem, hohem Wuchs mit feinen,
— Rheinsage. Dom cremegolden mit lila Hauch. Die	hellblauen Blüten. 80 cm VI-VII 0.40
Hängeblätter lachskarmin und stark getigert. 80 cm 1.50	— alba. Mit lichten, reinweißen Blüten. 80 cm 0.40
— Rheintochter. Hängeblätter tiefsamtigviolettblau	superba. Dunkelblau, großblumig. 80 cm 0.50
mit klarem, breiten lichtlila Rand. Domblätter weiß	— Perry's blue. Große, klarblaue Blumen auf starken
mit lichtlila Rand. 80 cm. Spät 1.50	hohen Stielen. 80 cm VI-VII 0.50 — Strandperle. Reinhimmelbl., sehr reichbl. 80 cm . 0.50
— Rheinfraube.Domblätter reinlavendelblau, Hängeblätter purpurviolett. 100 cm. Mittelfrüh 0.60	— spuria. Schwertförmige, lanzettlich-lineale Blätter.
— Riese v. Cönnern. Große herrlich reinhimmelblaue	Blumen weißlichgelb, blau geadert, innen violett.
Blumen. 120 cm. Spät 0.50	60 cm VI-VII 0.70
— Rota. Dom seidenartig karminrosa, einige Ton-	- versicolor. Blätter schmal, schwertförmig, Blumen
stufen heller als die deutlich geaderten, jedoch nicht	dunkelviolett. 60 cm VI-VII 0.40
geränderten Hängeblätter. 80 cm. Mittelfrüh 0.60	- Wilsonii. Mit hellgelben, wachsartigen Blumen. 80 cm 0.50
— Runstein. Dom olivlila, Hängeblätter tiefsamt-	Iris Kaempferi, Japan. Pracht-Schwertlilien 🔾 🗆 🐰
violett mit weißer Aderung. 60 cm. Mittelfrüh 0.60	Die Einzelblüten sind von riesiger Größe u. weisen
— — Salonique. Dom hellgelb, Hängebl. dunkelpurpur 0.80	ein wunderbares Farbenspiel auf. An Teich-, Bach-
— Schwanhild.Diezart.,lilarosa Farb.der Blüt.machen	und Graben-Rändern von unerreichter Wirkung.
sie für die feiner Binderei wertvoll. 60 cm. Mittelfrüh 0.40	60 cm VI-VII
— Sirius. Siehe Neuheiten	Wir liefern ein feines Sortiment. 100 St. in 10 Sort.
purpur, sehr starkwüchsig, reichblühend und	unserer Wahl zu RM 60.—. 25 Stück zum ⁰ /0 Preis.
großblumig. 70 cm. Mittelfrüh 1.—	 — Aifukurin. Weiß mit lilablauen Flecken u. Rändern 0.80 — Akashi. Sehr großblum., rötlichviolett, weiß geadert 0.80
- Spectabilis. Reindunkelblau mit weinrot. Anflug.	— Gei-sho-ui. Rötlichpurpur, gelbe Flecken 0.80
50 cm. Früh 0.40	— — Gekko-no-nami. Großblumig, weiß 0.80
— Srinager. Reinanilinblaue Domblätter und schmale,	- Gofukushoshu. Starke violettrote Aderung auf
tiefpurpurne, fast schwarze Hängeblätter. 45 cm. 1.—	grauem Grund 0.80
— Thorsten. Dom lavendelblau, Hängeblätter dunkel-	— — Hinode-Sakura. Lilarosa, Stempelbl. tiefviolettrot 0.80
samtblau. 60 cm. Spät	- Kumoisho, Rötlichpurpur Aderung auf grauem
dunkelpflaumfarbig. 60 cm. Mittelfrüh 0.60	Grund. In der Mitte einen gelben Flecken 0.80
— Toelleturm. Die tiefsamtigvioletten, weißgerand.	— Misuji-no-ito. Weiß mit breitem rosa Ring 0.80
Hängeblätter stehen zu dem schneeweißen Dom in	— Mrs. Stanley. Rötlichpurpur, hellere Ränder 0.80 — O-torige. Hellpurpur, purpur geadert 0.80
gutem Kontrast. 70 cm. Mittelfrüh 0.60	— Shigano-ura-nami. Tiefviolett, weiß geadert 0.80
— Vingolf. Hängebl. tiefsamtigviolettblau, stumpf-	— Shimoyo-no-tsuki. Weiß, hellblau schattiert 0.80
cremefarbene Domblätter. 60 cm. Mittelfrüh 0.60	Shira-no-tamoto. Rotviolett mit gelbem Flecken . 0.80
- White Knight. Siehe Neuheiten 0.80	— — Shishi-no-ikari. Rötlichpurpur, dunkler geadert . 0.80
Verschiedene Iris-Arten ○□ ⊥	— — Shu-fu-raku. Rosa, im Zentrum gelb. Rot geadert 0.80
Nachstehende Sorten können außer auf Blumen-	— Ujaka. Großblumig, weiß, gefüllt 0.80
Rabatten auch an feuchten Ufern von Gewässern	— Ushio-no-kemuri. Violettblau, weiß geadert 0.80
prachtvoll verwandt werden V-VI	— Wakamusha. Weiß, scharf violett geadert 0.80
Iris aphylla. Große, germanicaähnliche leuchtend wein-	— Yube-no-sora. Außere Blumenblätter bläulich,
rote Blumen. Die Blütezeit liegt zwischen fris pumila und interregna, was sie besonders wertvoll	innere Blumenblätter rotviolett, weiß geadert 0.80 — Yurushi-no-iro. Tiefviolettrot, sehr großblumig . 0.80
macht. 40 cm V 0.60	— Prachtmischung aller Farben
- caespitosa. Siehe unter niedrig bleibenden Stauden.	Kirengeshoma palmata. Siehe Neuheiten 1.20
- chrysographes. Mit dunkelvioletten Blumen, die pracht-	Kniphofia, Japan. Fackellilie, Liliaceae ○□ ¼ 丄 △
voll goldgelb gezeichnet sind. 60 cm . VI-VIII 0.70	Aus einem Busch schilfartiger Blätter erheben sich
— Margot Holmes. Siehe Neuheiten 1.—	auf starken Stielen die prachtvollen Zylinderputzer
- Delavayi. Rötlichviolett mit weiß, schlank gestielt.	ähnlichen Blütenkolben VI-IX
70 cm . " VI-VII 0.60	— corallina. Leuchtend korallenrot. 60 cm 0.80
— ensata. Schmales, aufrecht stehendes, grasartiges	— elegans multicolor. Die großen Kolben erscheinen in
Blattwerk. Violette Blumen mit dunkleren Adern und gelblichem Schlund. 50 cm VI-VII 0.70	rot, orange, gelb und creme Tönungen. Sie blüht sehr früh und remontiert sehr gut. 60 cm 0.50
	The state of the s



Hemerocallis hybr. Aureola

Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1St.	Lobelia, Lobelie, Campanulaceae O 🗆 🗴 1St.
— gracilis Goldelse. Siehe Neuheiten 0.70	u. leuchtend blauen Rispenblüten. 40 cm VI-VIII 0.50
Kniphofia (Fortsetzung) — gracilis Goldelse. Siehe Neuheiten 0.70 — hybr. Grasart. Belaubung. Sehr zierl. Blütenkolben in den Farben hell- bis dunkelgelb, rot bis orange 0.60 — hybr. Luna. Siehe Neuheiten	- coerulea. Aufrechte Staude mit lanzettlichen Blättern
blau. 40 cm	— Sunshine. Großblumig, goldgelb
Leucanthemum. Siehe Chrysanthemum Liatris, Prachtscharte, Compositae O A Schöne, kerzenartige Blütenähren, dicht besetzt mit meist purpurfarbigen Blütenköpfen die von oben nach unten auf blühen VII-IX — callilepis. Straffaufrechtwachsend, leuchtend purpur- rote Blütenkerzen. 50 cm 0.40 — graminifolia. Bis 100 cm hoch, leuchtend purpur . 0.50 — pycnostachya. Leucht. purpurrosa, großblumig. 100 cm 0.60 — spicata. Violettpurpur. 50 cm 0.50 Ligularia. Siehe Senecio. Linaria, Leinkraut, Scrophulariaceae O X — macedonica. Aufrechtwachsendes Sträuchlein mit silbergrauer Belaubung und gelben Blüten. 60 cm 0.50 — Siehe auch niedere Stauden. Lindelofia, Trauben-Gedenkemein, Borraginaceae	Lychsilene, Pechnelkenbastard, Caryophyllaceae ○ □ — grandiflora. Ein Bastard zwischen Silene asterias und Viscaria viscosa. Die Pflanze gleicht einer robust wachsenden Viscaria. Leuchtend purpurrote große Blüten an stark verzweigten Stielen. 70 cm. Selten
— longiflora (spectabilis). Rauhblätterige Staude mit großen vergißmeinnichtähnlichen saphirblauen Blumen. 50 cm	fünfsternigen Blüten. 50 cm VII-VIII 0.50 Lythrum, Weiderich, Lythraceae ○ ≅ □ Die hohen Stengel sind mit lanzettlichen gegenständigen Blättern dicht besetzt, leucht. purpurne Blütenstände VII-IX — Crimson Dwarf. Eine weithin leuchtende rotblühende niedere Sorte. 60 cm 0.50 — Lady Sackville. Große Dolden. Leuchtend rosenrot. 80 cm 0.50 — Rose Queen. Von besonders zierlichem Wuchs. Schlanke, lockere lachsrosa Blütenähren. 80 cm

Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzuug 1 St.	Oenothera glauca (Fortsetzung)	St.
Macleaya (Bocconia) Federmohn, Papaveraceae ○□ ⊥	— Fraseri. Braunschimmernde Belaubung u. rötliche	RM
- cordata. Stattliche hohe Zierstaude mit ornamentalem,	Anospen. Blumen groß, goldgelb	.50
großem Laubw. und langen, weißen Blütenrispen. 200 cm VIII-IX 0.60	Illissouriensis. Siehe unter niedrig bleibenden Stauden	
- Kelway's Coral Plume. Siehe Neuheiten 1.—	— speciosa. Eine wirklich immerblühende Staude mit grauschimmernder, lanzettlicher Belaubung und	
- yedoensis. Über den großen blaugrün. gelappten	großen weißen, sehr wohlriechenden Blumen. Her-	
Blättern stehen die hohen bronzefarbenen Blüten-	vorragend zum Bepflanzen von Abhängen, da	
rispen, 200 cm VIII-IX 0.50	stark wuchernd. Im Garten läßt sich die Staude	
Malva, Pappelmalve, Malvaceae O — moschata. Aufrechte, reich verzweigte Staude mit	leicht durch Umstellen mit Ziegelsteinen oder Schieferstücken eindämmen. 40 cm. VI-X 0.	10
großen, duftenden, einfachen, zartrosa Blüten.	Paeonia albiflora (sinensis),	.40
70 cm VI-VIII 0.40	Pfingstrose, Ranunculaceae O X Gehören	
Malven (Stockrosen). Siehe Althaea.	zu den ansehnlichsten Stauden. Die Blumen kommen	
Meconopsis, Scheinmohn, Papaveraceae O-O	in der Form der Rose gleich und weisen ähnliche	
— cambrica. Blaugrüne Belaubung und hellgelbe Mohn- blüten. 40 cm VI-IX 0.50	feine Farbenabstufungen auf. Verlangen nahr- haften Boden um zur vollen Schönheit zu gelangen.	
— fl. pl. Gefülltbl. Form d. vorigen. 40 cm VI-IX 0.60	00-90 cm	
- betonicifolia (M. Bailey). Prachtvolle, langtraubige	vv ir empiehlen ein teines Sortiment von 100 Stild-	
Blumen auf fest. Stiel. Leucht. himmelblau mit einem	in 10-20 Sorten uns. Wahl mit Namen zu RM 80.	
Kranze goldgelber Staubfäden, 100 cm VI-IX 2.50 Melandrium. Siehe Lydnis dioica rubra pl.	25 Stück zum 100 Preis.	
Melissa, Zitronenmelisse, Labiatae ○ □	Gefüllt blühende Sorten:	
— officinalis. Ziemlich große, ovale, gekerbte Blätter.	— — Agida. Hellrot	
Quirlständige, weißlichrosa nach Zitronen duften-	— Asa Gray. Dicht gefüllte, große lila Blumen . 1. — atrosanguinea. Glänzendkarmin . 1. — Biebrich Zortfleich for N. N.	
de Blüten. 50 cm VI-IX 0.50	Dicolicii. Laitheisinfarnene Nellson Ioni	
Mentha, Pfefferminze, Labiatae ○ ≅- ① □	boule de Neige. Reinweiß mit lichtschwefel well	
— piperita Mitcham. Echte englische Pfefferminze mit dem allerfeinsten Aroma. 50 cm VI-IX 0.50	nadic Roseniorm	.50
Mertensia, Lungenwurz, Borraginaceae ○-①□ ¾	— Canari. Schale cremeweiß, Füllung hellschwefelgelb 1. — Dr. Bretonneau. Gut gefüllt, lichtlila 1.	00
— sibirica. Zarthellblaue röhrenförmige Blüten zu hängen-	Ducitess de Nellioni, Elfanbarro	
den Blütentrauben vereinigt. 50 cm. V-IX 0.60		
— virginica. Blüten größer, etwas dunkler und groß- glockiger. 50 cm V-VI 0.60	couns superba. Reinrosa, trubblishand	.—
glockiger. 50 cm V-VI 0.60 — Siehe auch niedere Stauden.	Lagerie Verdier. Lartlachsrosa, dicht gedrängte	
Meum, Bärwurz, Umbelliferae ○ ≅ - ● □	Form	
— athamanticum. Haarfein zerteilte frischgrüne Blätter	1 Conva maxima, Remwerb	00
und weiße Blütendolden. 40 cm V-VI 0.50	Hadialis Hatilarines	
Mimulus, Gauklerblume, Scrophulariaceae ○ ≅ □ — cardinalis. Klebrig behaarter Busch mit scharf gezähnt.	Communic bigor. Lilarosa, Mitte rot gefledet	
Blättern. Blumen rot mit gelb. 50 cm VIII-IX 0.50	Schalenform	
- Siehe auch niedere Stauden.	mit nochgebauter Fullung	20
Monarda, Etagenblume, Labiatae O	Cicicii. Ellelloeinweiße Rosenform Knospan	
Straff aufrechtwachsender Busch von aromatischem	lichtfleischfarben	
Duft mit sehr schönen quirligen Blütenköpfen. 150 cm VII-IX	Jedille U Alc. I lifsich blitentarben mit annu 11 4	FA
— didyma Cambridge Scarlet. Glühend dunkelscharlach-	Mul. Dilbiglosdiarben Rosentonn - II-1 M.	m 0
rote Lippenblüten 0.50	Notificial de la contraction d	
— Kalmiana. Karmesinviolettrot, von kräft. Wuchs 0.40	— Königswinter. Lila mit Silberschein, geschloss. Form 1. — Lady Alexand. Duff. Sehr großblumig, leucht. rosa 1.	PM
— magnifica. Blumen kräftiglachsrosa. Feine Farbe 0.50 — Mrs. Perry. Siehe Neuheiten 0.70		
— Sunset. Sehr großblumig, tiefpurpurrot 0.40	La Cita. Welk mit ma Hanch, knowledge Calal C	FA
— violacea superba. Leuchtend purpurviolett 0.40		
Morina, Kardendistel, Dipsacaceae O O I	— La Tendresse. Cremefarben in reinweiß übergeh. 2. — La Tulipe. Elfenbeinweiß und karminrot	
— longifolia. Ornamentale zartrosa blühende Distelart mit pyramidalen Blütenständen. 60 cm VII-VIII 0.60	La vesidie, Remwerk	mr .m.
Mulgedium, Alpenlattich, Compositae ○≅-①		
- alpinum. Mit rundlichen Blättern u. leuchtend blauen,		
traubigen Blütenköpfen. 100 cm VII-VIII 0.50	— Mad. Ducel, Lilarosa hadrahant E	.20
Myosotis. Siehe niedere Stauden.		
Nepeta. Siehe niedere Stauden. Nordmannia. Siehe Trachystemon.		
Oenothera, Nachtkerze, Oenotheraceae O		
Aufrechte schönblühende Stauden mit duftenden,	- Marg. Gérard. Weiß mit lide Hauch 1.	.20
meist schalenförmigen Blüten. 40 cm . VI-VII		
- truticosa major. Blüht goldgelb und reich, höchst		
wirkungsvoll	i i cissoffici. Dunkelsamtagamananta-t	
licher Belaubung 0.40	— Modèle de Perfection Library hand	
— glauca (glabra). Blüte goldgelb, besonders schön durch		
den Bronzeton der Blätter	— — Pomponette. Schale rosa, Füllung silbrigrosa 1.	.20

Paeonia albiflora (Fortsetzung) 1 St. R.M.	Papaver orientale (Fortsetzung) 1 St. RM
— — prolifera tricolor. Reinweiß 1.20	— King George. Mit gefransten, reinscharlach Blu-
— — purpurea superba. Lebhaftdunkelpurpur 1.20	men. 100 cm
— Rubra Triumphant. Leuchtend dunkelpurpur 1.20	— Lady Roscoe. Lachsrot. 70 cm
- Sarah Bernhardt. Großblumig, leuchtend rosa 1.50	— Lord Lambourne. Orangescharlachrot, Blumen- blätter eingeschnitten. 80 cm
 Solange. Lachsfarbigorange, in der Mitte hellrosa 1.50 Souvenir de l'exposition Universelle. Seidenrosa 1.20 	— Loreley. Straffstielig, blutrot u. großblumig. 80 cm 0.50
— sulphurea. Cremefarben	— Mahony. Mahagonibraun, sehr groß. Blum. 100 cm 0.60
— Thorbecke. Leuchtend rot	— May Queen. Gut gefülltblühend, tieflachsrot. 80 cm 0.50
— Triomphe de l'exposition de Lille. Silbrigrosa . 1.20	— May Sadler. Siehe Neuheiten
— Triumphans gandavensis. Zartlila, Füllung hell-	- Mrs. Stobarth. Großblumig, leucht. dunkelkarmin.
gelb mit lachsfarben	80 cm
— Wiesbaden. Fleischfarbigrosa, sehr reichblühend 2.—	— Orangekönig. Leuchtend orangescharlach. 80 cm 0.50
Einfachblühende, europäische Sorten:	— Perrys Weiße. Atlasweiß mit dunkl. Flecken. 80 cm 0.50
— Brutus. Rosa mit gelben Staubfäden 1.20	— Peter Pan. Leuchtend kirschrote Zwergsorte. 30 cm 0.60
- Clothos. Karminrosa mit Silberrand 1.20	- Prinzess Ena. Kleinblumig, lachsrosa. 40 cm 0.60
— Conus. Fleischfarbigrosa	— Roland. Großblumig, anemonenart., scharlachrot.
— Holbein. Hellseidenrosa	70 cm
— — Ludwig Richter. Pfirsichfarben 1.—	— Sturmfackel. Siehe Neuheiten
— — Murillo. Lichtfleischfarbenrosa m. gold. Staubgefäß. 1.—	— — Thora Perry. Siehe Neuheiten
— Rembrandt. Leuchtend blutrot mit Atlasglanz 1.50	— — Victoria Luise. Großblumig, lachsrosa, eine der
- Van Dongen. Sehr großblumig, rosa 1.20	wertvollsten. 80 cm 0.50
- Whitley major. Sehr großblumig, reinweiß 1.50	— Wunderkind. Karminrosa Riesenblumen. 80 cm 0.60
Einfachblühende und halbgefüllte	— Württembergia. Tiefblutrot, besond. großblumig.
japanische Sorten:	— nudicaule. Siehe niedere Stauden.
— Ginko-nishiki. Weiß, purpurn gestreift und ge-	Paradisea, Graslilie, Liliaceae ○-①□¾
flammt. Mitte eigelb. 70 cm	— liliastrum giganteum. Grasartige linealische Blätter,
innere Blumenblätt., rosig mit gelb geflammt. 80 cm 1.50	schlanke Blütenstiele mit einfachen, weißen Blüten-
— — Hyakka-to. Blüte flach, purpurrosa, Staubblätter	ähren. 40 cm V-VII 0.70 — major. Schöne weiße an kleine Gladiolen erinnernde
strohgelb, ballförmig zusammengekrümmt. 80 cm. 1.50	Blumen. 40 cm V-VI 0.60
— Kunimori. Lockergefüllt, dunkelkarmin, Staubblätter lebhafthellgelb. 80 cm	Peltiphyllum (Saxifraga), Schildblatt,
— Meigetsuko. Blaßlilarot. 100 cm 1.50	Saxifragaceae $\bigcirc\cong - \bigcirc \bot$
— — Mine-no-momiji. Seidigweiß, rahmgelbe Mitte 1.50	— peltatum. Große, schildförmige, bis 30 cm breite
— Ohirama. Dunkelrosa, lockergefüllt, Staubblätter	Blätter und hohe rosa Blütenrisp. 50 cm. V-VI 0.70
bandartig strohgelb. 80 cm	Pentastemon, Bartfaden, Scrophulariaceae O A KEignen sich ihrer mittleren Höhe u. Reichblütigkeit
wellt, hellgelb. 60 cm	wegen besond. zur Rabattenpflanzung. VI-IX
— — Shiraginu. Lockergefüllt, rahmweiß, Staubblätter	— barbatus hybridus (Chelone). Hohe Rispen, zart-
zungenförmig, schwefelgelb. 70 cm 1.50	rosa bis purpurrot. 70 cm
— Tamabotan. Gefüllt, rahmweiß, schwachrot ge-	— coccineus. Korallenrote Blütenrispen. 70 cm 0.40
streift. 80 cm	— hybr. nanus. Eine Zwergform obiger Sorte. 40 cm 0.50 — glaber. Große Schmallanzettliche Belaubung und schöne
Paeonia, verschiedene Sorten, 40-50 cm: — officinalis fl. pl. Purpurrot gefüllte Bauern-Pfingstrose 1.—	himmelblaue bis rosa Blütenrispen. 40 cm 0.50
— alba plena. Weißgefüllt V-VI 1.—	— heterophyllus True Blue. Siehe Neuheiten 1.—
— mutabilis plena.Rosa, spät.weiß, gefüllt V 1.—	— hybr. Andenken an Hahn. Die Blütenrisp. erscheinen
— rosea plena. Rosa, gefüllt V-VI 1.—	in ununterbrochener Folge den ganzen Sommer hin-
— tenuifolia. Geschlitzte Belaubung, Blüten einfach, leuchtend rot VI-VII 1.50	durch. Die Farbe der Blüten ist ein leuchtendes weinrot mit hellem Schlund. 40 cm 0.60
tend rot VI-VII 1.50 — — fl. pl. Gefüllt purpurrot VI-VII 1.50	— — Andenken an Purpus. Siehe Neuheiten 0.80
— rosea. Einfach, rosablühend V-VII 1.50	— laevigatus digitalis. Breitovalblättrige Art mit
- Wittmanniana hybr. Schön geformte, einfache Blumen,	großen weißen Blüten. 80 cm
schwefelgelb in lachsrosa übergehend V-VI 2.—	— Siehe auch niedere Stauden.
Papaver orientale,	Petasites, Pestwurz, Compositae ○ ≅ ① — japonicus giganteus. Dekorative Blattpflanze. Rosa
Riesen-Türkenmohn, Papaveraceae O A & Durch seine reiche Blüte und seine satten, leuch-	Blütenschäfte vor den Blättern. 50 cm IV-V 0.70
tenden Farben ist der Riesen-Mohn eine allgemein	- niveus. Weißfilzige große Blätter. 40 cm IV-V 0.40
gesuchte Zierstaude. Nach der Blütezeit schneide	- officinalis (Tussilago vulg.). Starkwachs., heimische
man die abgeblühten Stiele über dem Boden ab,	Blattpflanze für größere Anlagen.
da von August an die Pflanzen wieder frisches	50 cm
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in	— Hausknechti (capitata). Aufrechte, weißgrau behaarte,
10 Sorten unserer Wahl zu RM 40.—	buschige Staud. mit gelblich-weißen, quirlständigen
25 Stück zum ⁰ /0 Preis.	Blüten. 60 cm V-VII 0.60
— Feuerzeichen. Zinnoberrot, guter Bau. 70 cm 0.50	— samia. Eilanzettliche, silbergraue Belaubung und
- Goliath. Große Blumen, brennendscharlachrot.	prächtige, goldgelbe, quirlständige Blüten.
100 cm	— viscosa (Russeliana). Behaarte Blätter und große
— Großfürst. Dunkelrot m. schwarzen Flecken. 100 cm 0.50	gelbe Lippenblüten. 70 cm VII-VIII 0.60

Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1 St.	Phlox paniculata (Fortsetzung)
Phlox Arendsii,	- Camillo Schneider. Verbesserung der alten, roten
Flammenblume, Polemoniaceae O 🗆 🖟 Kreu-	Aegir, Blumen bedeutend größer und leuchtender.
zung von frühblühenden Phloxen aus der Gruppe	ou cm. Spat
der divaricata mit den besten paniculata-Sorten,	- Camen. Rein leucht, karmin, kompakter Wuchs
die sich an den Flor der Frühjahrsphlox anschließen und bis zum vollen Erblühen der Phlox paniculata	besonders spätblühend, großdoldig. 60 cm. Spät . 0.50 — Caroline van den Berg. Enorm große Blüten von
hinreichen V-IX	auffallend blauer Farbe, überaus große Dolden
— — Amanda. Blüten mittelgroß, hellila mit dunkler	70 cm. Mittel
Mitte. 40 cm	— Daily Sketch. Siehe Neuheiten
— Charlotte. Weiß mit rosa Schein und dunkllila Auge. 60 cm	our. Mittel
— — Emmy. Zartlila mit dunkellila Auge, sehr groß-	- Direktor Dr. vodel. Blauviolette Blumen große
blumig. 60 cm 0.40	Dolden. 100 cm. Mittel 0.50 Dr. Königshöfer. Feurigzinnoberscharlach mit
— Grete. Weiß, in der Krone etwas rosa scheinend.	dulkerbluttotem Alloe, bll cm Mattal
— — Hanna. Große, leuchtend purpurrosa Blumen. 40 cm 0.40	Louisedi. Furpurkarmin grobbl 80 cm Mitt-1 04
— Hilda. Weiß, lila Schein u. leucht. rosa Auge. 40 cm 0.50	— Elisabeth Campbell. Hellachsf. m. weiß. Zentrum 0.4. — Ellen Willmott. Prächtiglila, Mitte heller, 100 em 0.5.
 Inge. Reinrosafarbene, weißgeaugte Blum. 60 cm 0.50 Käthe. Helles purpurrosa m. dunklem Auge. 50 cm 0.50 	Lindin Fiduld, tillhendkarmanat
— Lisbeth. Weiß mit zartlila Rückseite. 60 cm 0.50	Limereder, Siene Neuherten
— Luise. Hellila mit lilakarmin Auge. 60 cm 0.50	— Europa. Schneeweiß mit karminrotem Ring. 80 cm 0.4 — Eva Foerster. Sehr großblumig, leuchtend lachsrosa,
— Marianne. Dunkelblauviolette Blüten. 40 cm 0.50	1 Cloesserung der Sorte F. Campbell 50 cm
Phlox maculata,	L vollegellie. V ornenm rosa sahr ana [] 1 70 0 E
Flammenblume, Polemoniaceae O A Ent- stammen einer Kreuzung mit Phlox suffruticosa,	— Fellbacher Porzellan. Zartlila mit heller Mitte. 80 cm. Mittel
denen sie auch sehr ähnlich sind VI-IX	I do bidio. Leucht. orangescharlach M. 44. 1 11 0 E
- Alpha. Elegante Rispen leuchtend rosafarbener	oddirener. Diene Weilheiten
Blüten. 80 cm	l dilo. Liu besonders glubendes rot geichnet d'
- Rosalinde. Leuchtend karminrosa mit dunklem Auge. 100 cm	dankbare Sorte aus. 60 cm. Mittel 0.6 — Fidelio. Reinweiß mit großer auffallender, karmin-
- Schneelawine. Blendendweiß. 80 cm 0.40	1 Total Filtle. OU cm. Writtel
Phlox suffruticosa (glaberrima)	— Firmament. Zartlila m. weiß. Auge. 50 cm. Mittel . 0.4 — Frau Anton Buchner. Schneeweiße Blüten und
Flammenblume, Polemoniaceae O 🗆 🛪 Be-	Tiesige Dolden, Phillel bil cm
ginnen 4 Wochen früher als Phlox paniculata zu	Torondian Control of the Control of
blühen und remontieren bis zum Eintritt stärkerer Fröste. Langgestreckte schmale Rispen. VI-IX	O Chi. I little I
- Gryp, Weiß mit rosa Auge. 60 cm 0.40	— Fred Rafferty. Großblumig, orangerot. 80 cm. Früh 0.4 — Freifräulein von Laßberg. Reinweiß, großblumig,
— Indian Chief. Dunkelpurpurlila. 60 cm 0.50	1 Stone Romparte Dolden bil om Mattel
 — Magnificense. Purpurkarmin. 60 cm — Snowdon. Lange Blütenschäfte, vollbesetzt mit 	1 Idillosa, sehr trubblibend 50 cm
blendendweißen Blumen. 60 cm 0.40	— General van Heutsz. Leucht. lachsrot m. weiß. Auge 0.4 — Georg Olbrich. Überaus große Einzelblüten von
Phlox paniculata (decussata)	Tarbe mit grober weiber Mitte
Flammenblume, Polemoniaceae O = X Schönste	Too cm. Pittlet
u. dankbarste Staude von unerschöpflichem Farben-	— Georg Stipp. Lachsrot mit karmin Auge, auf be- sonders kräftigen Dolden. 60 cm. Mittel 0.5
reichtum. Sie gedeiht in jedem Boden bei sonniger Lage. Unser Phlox-Sortiment enthält die schönsten,	Tieneagies Olory, Grobbluming tiefkingchross
neuesten großblütigsten Züchtungen . VII-IX	40 cm. Mittel
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in	of all stratuers and rotem Auge, 100 cm Spit 04
20 Sort. uns. Wahl RM 32.— 25 St. zum % Preis. — Administrator. Scharlachorange mit rotem Auge.	Total Zeppelli. Großblumig, blendend weiß mit
60 cm. Mittel 0.50	- Karminrotem Auge. 60 cm. Früh 0.5 Gustav Lind. Wundervolle lachsrote Farbe, be-
- Adolf Adorno. Leuchtend orangerot mit dunklem	sonders medrig im Wuchs, 50 cm Mittal 0.5
Auge. Riesige Dolden. 80 cm. Früh 0.50 Aida. Dunkelkarmoisin mit purpurnem Auge.	I die voilloner. Lila m. weib Mitte 70 cm Crit 0 4
Schöne, runde, kompakte Büsche. 60 cm. Mittel . 0.60	— Hauptmann Köhl. Leuchtend dunkelkarminrot. Großblumig und großdoldig. 80 cm. Mittel 0.6
- Alfred Weiß. Großbl., veilchenbl. 50 cm. Mittel 0.50	1. D. Ividy, Reinrosa, besonders grafidalling on OF
— Andenken an Wilhelm Pfitzer. Karminrosa, sehr gute Gruppensorte. 100 cm. Mittel 0.50	1 Iterdunkelrosa mit rotem Auge
— — Anton Mercier. Großblum., zartlila. 60 cm. Mittel 0.40	- Hindenburg. Große Dolden von mildestem rot.
— Asien. Lilarosa m. leucht. karmin Auge. 60 cm. Spät 0.50	O cm. Frun
— Australien. Karminviolett. 80 cm. Mittel 0.40 — Baron v. Dedem. Orangerot, Auge karmin. 70 cm.	— Jules verne. Tiefviolettblau. 100 cm. Mittel . 0.4
Mittel	Juligiur. Sehr großbl., gühendkirschrof, 60 cm Friih 0.8
— Baron v. Heekeren. Sehr großbl., salmrosa. 80 cm.	Junius. Sehr großblum., lachsrosa, nicht verblassend 0.6
Mittel	- Kapitän König. Lachsrosa mit karmin Auge. 70 cm 0.5 - Karl Foerster. Farbe glühenddunkelorangerot, große
- Border Gem. Tiefdunkelviolette, breite, große	Einzelbluten. 70 cm. Mittel
Dolden. Sehr starkwüchsig und widerstandsfähig.	—— Nommerzienraf Borsig, Leuchtend zinnoberrot mit
40 cm. Spät 0.60	karminrotem Auge. 80 cm. Mittel

Phlox	paniculata (Fortsetzung)	Physalis, Lampionpflanze, Solanaceae ○□ ¾ 1St.
	Le Mahdi. Tiefdunkelblau. 80 cm. Mittel 0.40	- Franchetii. Mit hübschen, leuchtd. roten ballonartigen
	Leo Schlageter. Große pyramidale Dolden schar-	Früchten in den Blattwinkeln. 60 cm VIII-IX 0.40 — Bunyardii. Sehr große, zinnoberrote, ballonartige
	lachkarminroter Blumen mit dunklerem Zentrum.	Früchte. 40 cm VIII-IX 0.40
	Leuchtfeuer. Lachsrosa mit dunklem Auge. 80 cm 0.50	Physostegia, Etagenerika, Labiatae ○□ X
	Lofna. Silberrosa mit weißem Spiegel. 90 cm. Mittel 0.40	— virginiana alba. Lederartige Belaubung mit weißen Lippenblüten in aufrechten langen Ähren.
	Loki. Reinlachsrosa, dunkelkarminroter Mittelring.	80 cm VI-VIII 0.50
	Lord Lambourne. Prachtvoll lachsrosa, sehr groß-	— grdfl. Prachtvolle, straffe, rosablühende Sorte.
	blumig und großdoldig. 70 cm. Mittel 0.60 Lord Raleigh. Violettblau. 40 cm. Spät 0.40	80 cm VI-VIII 0.40 — Vivid. Siehe Neuheiten 0.80
	Lukas Schwinghammer. Leuchtend karmin mit	Phytolacca, Kermesbeere, Phytolaccaceae O-1 \(\tag{1} \)
	blutrotem Auge, sehr großblumig. 70 cm. Mittel . 0.60	- americana (decandra). Eigenartige Staude von
	Mandelduft, Siehe Neuheiten 0.80 Mia Ruys. Großblumig, reinweiß, reichverzweigt.	exotischem Aussehen. Weiße Blütenrispen, denen im Herbst schwarze Beeren an langen Frucht-
	40 cm. Mittel	trauben folgen. 100 cm VII-VIII 0.70
	Morgenrood. Aparte rote Farbe, sehr reichblühend, 60 cm. Mittel 0.50	Platycodon, Marienglockenblume, Campanulaceae
	Mrs. Ethel Prichard. Groß. zartbläulichrosa Dolden.	— grandifl. Mariesii (Wahlenbergia). Flade, an
	Besonders große Einzelblüten. 80 cm. Mittel 0.60	Glockenblumen erinnernde, leuchtend blaue Blüten.
	Mrs. H. J. Jones. Malvenrosa mit rotem Auge. 80 cm. Mittel 0.50	40 cm VII-VIII 0,50
-	Mrs. Milly van Hoboken. Großblumig zartrosa.	— — album. Weißblühende Art der vorigen. 40 cm VII-VIII 0.50
	60 cm. Mittel	Podophyllum, Fußblatt, Berberidaceae → • ● ≃
	große breite Dolde. 70 cm. Mittel 0.50	- emodi majum. Schildförmige marmor. Blätter, einzeln
	Nelkendom. Siehe Neuheiten 0.70	stehende, weiße bis zartrosa Blumen. Taubenei- große rote Früchte. 60 cm IV-V 0.80
	Nordlicht. Karminrosa mit dunkelrot. Auge. 60 cm 0.50 Opal. Siehe Neuheiten 0.70	Polemonium, Sperrkraut, Polemoniaceae ○ □ X
	Paul Hoffmann. Magentakarminrot mit dunklerer	- carneum. Auffallender Frühjahrsblüher mit fleisch-
	Mitte, sehr auffallende Farbe. 80 cm. Mittel 0.50 Professor Went. Tiefamarantpurpur, sehr reich-	farbigrosa Blüten. 40 cm V-VII 0.80 — coeruleum Primadonna. Zarthellblaue Blüten zeich-
	blühend und großdoldig. 50 cm. Mittel 0.50	nen diese kräftig und gedrungen wachsende Staude
	Rheinländer. Ladsfarbigrosa m. karminrot. Mitte 0.40	aus. 40 cm V-VII 0.50 — Richardsonii (lanatum). Niedrige Art, prachtvoll
	Rigoletto. Karminlila, großdold. u. straffwachsend.	himmelblau. 40 cm V-VII 0.50
	Rokoko. Sehr großblumig, zartrosa. Nicht ver-	— album. Blendendweiße Blumen. 60 cm V-VII 0.50
	Bosenkavalier. Rosenrot, zeichnet sich durch ro-	— pallidum. Reinporzellanblaue Blumen. 40 cm V-VII 0.60
	busten Wuchs aus. 60 cm. Mittel 0.60	— — superbum. Mit dunkelblauen Blüten.
	Saladin. Leucht. scharlachorangerot, blutrot. Auge 0.50 Salom'e. Lachsrosa mit lila Auge. 50 cm. Sehr früh 0.50	40 cm V-VII 0.60
	San Antonio. Dunkelblutrot. 80 cm. Mittel 0.60	Polygonatum, Salomonssiegel, Liliaceae () – • & — officinale. Hängende grünlichweiße Blüten an bogigen
	Schwerins Flagge. Die einzelnen Blumenblätter	Trieben. 60 cm V-VI 0.40
	sind weiß mit einem breiten dunkelrosa Mittelstrich. 70 cm. Mittel	— multiflorum. Besonders vielblütige u. großblütige Abart der vorigen. 70 cm V-VI 0.50
-	Septemberglut. Orangerot m. dunkelkarminrotem	Polygonum, Knöterich, Polygonaceae ○-① ≅
	Auge. 70 cm. Spät	- amplexicaule. Stengelumfassende, herzförm. Blätter u.
12-11	Sir William Lawrence. Siehe Neuheiten 0.80	schlanke, leucht.rote Blütenähren. 80 cm V-IX 0.60 — atropurpureum. Dankbar blühende Bienennähr-
	Smiles. Sehr großblumig, lilarosa mit dunklem	pflanze, mit großen Rispen von schwarzroter Farbe.
	Auge. 60 cm. Spät	80 cm V-IX 0.50 — bistorta superbum. Dichte rote Blütenähren.
	warmen Zinnoberrot. 100 cm. Spät 0.80	40 cm VI-VIII 0.50
	StadtgärtnerWaiblinger. Feurigmagentarote, teil-	— album grdfl. Weißbl. Form. 50 cm. VI-VIII 0.60
	weise karminviolett scheinende Bl. 40 cm. Mittel 0.60	— usuriense. Üppiger wachsende Form mit längeren fleischfarbigen Blütenähren. 40 cm. VI-VIII 0.50
4	U. Deutschland. Auffall. dunkelorangerot. 60 cm 0.50 Weiße Perle. Reinweiß, reichverzweigte große	- polystachyum. Staudenflieder. Blüht in rosaweißen
	Dolden. 40 cm. Mittel	Blütenrispen. 120 cm VIII-X 0.60 — sacchalinense. Weißblühender Riesenknöterich.
	Widar. Violettblau mit reinweißem Auge, große	2 m VIII-X 0.50
	Dolden. 70 cm. Mittel	- sericeum. Mit lanzettlich. Blättern u. reichverzweigten
	100 cm. Spät 0.40	blendendweißen Blütenrispen. 80 cm VI-VII 0.70 — Siehe auch niedere Stauden.
	Wilhelm Kesselring. Dunkelviolettpurpur mit	Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae O A & Große erd-
142	großem weißem Auge. 40 cm. Früh 0.40 Württembergia. Karminrosa mit hellerer Mitte,	beerähnliche Blumen auf festen Stielen und sehr
	sehr große Dolden. 40 cm. Früh 0.40	wohlriechendes Blattwerk. 40 cm VI-VIII — atrosanguinea (Gibsons Scarlet). Dunkelblutrote
	W. Ramsey. Violettrot, sehr aparte Farbe und	Blüten, reichblühend
DLL	reichblühend. 60 cm. Mittel	— hybr. Carneval. Orangerot, gelb getönt, gefüllt 0.50 — Emilie. Purpurrot mit gelben Rändern, gefüllt 0.50
rnio	divaricata und pilosa. Siehe unter niedere Stauden.	I Limite. I dipartot mit getoen Randern, gerunt

Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1 St.	Pyrethrum roseum (Fortsetzung) 1 St.
Potentilla hybr. (Fortsetzung)	φ_{II}
— Goldkugel. Goldgelb, gefülltblühend 0.50	— Holstein. Rosarote Zwergsorte
— Harlequin. Blüten scharlach mit goldgelb, halbgef. 0.50	- James Nelway. Sammetrot, mit die schönste und
— purpurea plena. Purpurkarmin, gefüllt 0.50	— — dunkelste
- Star of the North. Scharlachrot, gefüllt 0.50	reinig
— sulphurea pl. Dunkelbräunlichgelb, gefüllt 0.50	1 Vidua. Dunkellilarosa
— Wm. Rollisson. Blüten rot mit gelb, halbgefüllt . 0.50	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
nepalensis Miss Willmott. Äußerst dankbar blühende Art mit mittelgroßen, karminrosafarbigen einfach.	Große, langstrahlige Bluten von zartrosa
Blüten in großer Fülle 0.40	rarbe
— Roxana. Leucht. kupfrigrosa mit kirschrotem Auge 0.50	1 CINCO. Hellblutrote / wergeorfe
- Thurberi. Achnlich der Sorte nep. Miss Willmott, je-	- Rubens. Siehe Neuheiten
doch dunkelblutrote Blumen	Soprific. Leuchtend rosa
Poterium, Wiesenknopf, Rosaceae ○ ≅ □	official office of the office
obtusum. Frischgrün gesiederte Belaubung, lange	rucdii. Diene Tveuneiten
elegante Blumenstiele mit dunkelrosa Blütenähren.	VIVIO. Leuchtend karmoteinnet
100 cm VI-VIII 0.50 — album. Weißblütige Form. 100 cm . VI-VIII 0.50	nybi. Saitingspilanzen. Feinstes großblumigetes
Primula. Siehe niedere Stauden.	1 arochspier
	Pyrethrum corymbosum hybridum. Farbenspiel wie
Pulmonaria. Siehe niedere Stauden.	bei Tyrethrum ros. hybr., jedoch erscheinen die
Pyrethrum roseum, Bunte Marguerite,	Didten zu menteren an einem Stengel und bilden
Compositae O 🗆 🛪 Aus üppigen, von feinzerteilten Fiederblättchen gebild. Blattros. kommen d. bunt.,	dadurch ganze Blütenbüschel. 40 cm. V-VI 0.70
margeritenart. Blum. hervor. 50-70 cm V-VII	Ranunculus, Hahnenfuß, Ranunculaceae O-
Wir liefern ein feines Sortiment gefüllt- u. einfach-	- aconitifolius fl. pl. Tief eingeschnittene Blätter und weiße Blütenköpfchen auf reichverzweigten Stielen.
blühende Pyrethrum von 100 St. in besten Sorten	00 cm
uns. Wahl mit Namen AM 50 25 St. zum % Preis.	- deris II. pl. Mit dichtgefüllten, goldgelben Blijten
Gefülltblühende	00 cm
— — Alfred. Hellamarant	- bulbosus (speciosus) fl. pl. Niedrighleibende Ant t
— Amethyst. Amarantrot	großen, goldgelben, gefullt. Blum. 30 cm V-VI 0.40
— Aphrodite. Reinweiß, sehr frühblühend 0.60	Rheum, Zier-Rhabarber, Polygonaceae ○≅- 1
— Capella. Der lilarosa Blütenrand umschließt eine reinweiße, dichtgefüllte Scheibe 0.50	Die Zierrhabarber sind prachtvolle Standan die
— Delphin. Chamoisfarben	durch ihr mächtiges Blattwerk sehr hohen Schmuck-
- Deutsche Kalserin. Große Blüten von eigenartig	wert haben
schöner lachsrosa Farbe. Mitte cremefarbig 1.—	pullidadin flore rubio. Diatter fiet geechlitat. fol
- Figaro. Großblumig, karminrot	Didtenstande mit tietroten Blutchen 200 cm
— Gretel. Dunkelmagenta, halbgefüllt 0.60	anguncum. Spitzianzettliche Blatter, rote Bliten
— Hobart Pascha. Dunkelrot 0.70 — Koralle. Scharfdunkelrosa, Blumen gleichmäßig ge-	schaffe. 150 cm
füllt und kräftig gestielt 0.70	— Speise-Rhabarber. Siehe Obst.
— La Vestale. Lila mit silbriger Mitte 0.60	Rodgersia, Schaublatt, Saxifragaceae • = = 1
— Lord Rosebery. Leuchtendes karminrot 0.70	Aeußerst dekorative Schmuckstaude mit interessant. Laubwerk und schönen spiraeenähnlichen Blüten.
- Madel. le Clerq. Große, lockere, langstrahlige	00-100 cm
Blumen, silbrigrosa	descumona, Rastanienahnliche Relaubung C
— Non plus ultra. Fleischfarbigrosa 0.60	weige Diutenrispen .
— Oldenburg. Frischrosa, gutgefüllt 0.60	printed dibd. Diatter allfilled wie die erste min 1
- Prinz Metternich. Reinweiß, spitzstrahlig 0.70	genedert angeordnet. The vergue Blit.
Progression. Gefülltblühend, feinzartrosa 0.70	- podophylla. Mit bronzeartig glänzend großen ge- fingerten Blättern u. spiracenartigen Blütenrispen 0.80
— Queen Mary. Blum. von edelster Form, zartes Rosa 0.60	bit belaub, pleicht der aines Hall
— Wega. Chamoisfarben	strautics, die Diulenrispen einer wie 6
- White Queen Mary. Weiße Form der bekannten	
Sorte Queen Mary 0.70	geoduttet sind und tischformig dem Plattet 1 C
Yvonne Cayeux. Reinweiß mit cremefarb. Mitte,	1—
spitzstrahlig 0.60	komneya Coulferi, Baummohn, Panaveraccao
Einfachblühende	ochederte blaugrune Belaubung C
- Aminthe. Leuchtend karminrot 0.60	artige weiße Blumen mit goldgelben Staubfäden. 100 cm V-IX 3.—
— Beatrix Kelway. Leuchtend kirschrot 0.60 — Donatis. Siehe Neuheiten 0.80	Rosmarinus, Rosmarin, Labiatae O L A
— Dr. Bosch. Leuchtend lachsrosa Farbe, wie diese	- Officinalis. Der echte Rosmarin Blatter 1 Die
bisher bei Pyrethrum noch nicht vorhanden war . 1	Rostila dultena. Veberwinterung in factor.
- Dr. Parker. Sehr fein salmrosa, großblumig 0.70	readme noting od. gute Laubdecke. 50 cm VII-VIII 070
— Eileen May Robinson. Sehr großblumig, rein-	Rudbeckia, Sonnenhut, Compositae Or VI 8: 11
rosa, auf straffen Stielen 0.60	and Administration Mit Kleinen Sonne-Ll.
— Feuerstrahlen. Feurigkarminrot 0.60	sind von einer staunenswerten Blühwilligheit
— Freya. Reinmalvenrosa, edel geformt 0.60 — Hamlet. Lebhaftrosa 0.60	vv chig ansprumsvoll.
— Harold Robinson. Herrlichscharlachkarmesin 0.70	flava. Rudbeckia speciosa sehr ähnlich; blüht jedoch
0.70	vier Wochen früher als diese. 40 cm. VI-VII 0.40

rispen. 60 cm V-VI

- Sussex Beauty. Satinrosa, lockerer Blütenst. 50 cm 0.60

Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1St.	Stokesia, Kornblumenaster, Compositae O 🗆 X 1S
Silphium, Kompaspflanze, Compositae O 🗆	Cydiled (Idevis). Eigenartige, schone Stande wit KA
- perfoliatum. Dekorative Staude mit gelben Blumen	groß, nimmelblauen Kornblumen-ähnl. Blijten Von
und schöner Belaubung, deren Spitzen nach Nord und Süd gerichtet sind. 200 cm VIII-IX 0.50	langt sonnigen warmen Standort. 40 cm VII-IX 0.60 — alba. Weiße Form der vorigen. 40 cm VII-IX 0.70
Sisyrinchium, Binsenlilie, Iridaceae 🔾 🗆 🛆	Siylophorum diphyllum, Siehe Neuheiten
— striatum. Breite, grasähnliche Belaubung. Hübsche, gelblichweiße Blütenrispen. 40 cm V-VII 0.50	lelekid. Siehe Buphtalmum.
- Siehe auch niedere Stauden.	Thalictrum, Wiesenraute, Ranunculaceae ○ ≅ ◑ □ aquilegifolium. Leichter federbuschartig. Blütenstand
Solidago, Goldrute, Compositae O-D \(\times \) Alle Goldruten sind sehr hart und anspruchslos. Die	ton school maroter rarbe und alcalerent D
Blütenstände gleichen gelben Federbüschen von	laubung. 120 cm VI-VII 0.50 — album. Mit großen, weißen Blütenständen.
schönster Wirkung.	1 00 cm
- aspera (rugosa). Zierliche verzweigte gelbe Blüten- stände. 150 cm VIII-X 0.40	Machiani, Schone Illa Blutenstände
- ellyptica. Breitblätterige niedere Art mit eleganten	— dipterocarpum. In pyramidalen Rispen stehende
goldgelben Rispen. 40 cm VIII-IX 0.40 hybr. Frühgold. Breite Rispen von altgoldgelb. Farbe,	Decembration von Durphrilla Barba au Jan 1. 1
sehr frühblühend. 150 cm VII-VIII 0.40	tig kontrastieren. 150 cm
— Golden Wings. Mit goldgelben Blütenrispen. 150 cm VIII-IX 0.40	dibdilli vy circe orm der vonsee 100
- Goldelfe. Reichverzweigte Rispen dunkelgold-	gelbe Blütenstände 150
— Goldschleier. Strahlige, leucht. goldgelbe Blüten,	
straffe pyramidale Rispen. 60 cm VIII-IX 0.50	an feines Farngrün (Adiantum) erinnert. 40 cm VII-VIII 0.50
— Goldstrahl. Hübsche, goldgelbe Blütenrisp, straffer	
— Wuchs und ohne Ausläufer. 80 cm . VIII-IX 0.50 — Mimosa. Reichverzweigte Rispen, goldgelbe Blü-	labacea. An Lupinen erippernda Ct. 1
ten, Mimosa ähnlich, 150 cm IX-X 0.50	gelben Blütenrispen. Hervorragend z. Bepflanzen von Böschungen. 50 cm V-VII 0.60
- Perkeo. Gleicht im Wuchs virgaurea nana, wird etwas höher und blüht später. 40 cm IX-X 0.50	
—— Schwefelgeisir. Von strafferem Wuchs wie aspera.	hellblaue Blumen, 40 cm
— Sonnenschein. Achnlich Goldschleier, mit hellerer	induction Dicinidate Di Commolinate
Farbe und späterer Blütezeit. 50 cm IX-X 0.50	Wuchs mit schilfartigen Blättern von 1 200 Plan
— Spätgold. Spätblüh., gleicht der Sorte Perkeo. 60 cm	
— missouriensis (Aster hybr. luteus). Eine Masse gold-	— alba major. Reinweiße — 6. Dir
gelber Sternblütchen auf Riesensträußen. Unent- behrliche Schnittblume. Hält sich auch im getrock-	— Hutchinsonii. Großblumig, zartrosalila 0.60
neten Zustand sehr gut. 60 cm VII-IX 0.50	— Leonora. Große Blumen v. warmische in 180
— mollis. Breitblätterige graugrüne Belaubung, Rispen goldgelb. 50 cm VIII-IX 0.80	
nemoralis. Amerikan. Einführung mit schmal lanzett-	Blumen leuchtend rot.
licher Belaubung und goldgelben sehr graziösen	
Rispen. 50 cm VIII-IX 0.60 — Shortii. Altbekannte Art m. groß., leicht federig., gelben	Tricyrtis, Krötenlilie, Liliaceae O-D - 0.50 — dilatata. Jap. Art. Im Charakter wie nachstehende,
Blütenrisp. Wuchs straff aufr 150 cm IX-X 0.40	Jedou III. Hatar bellen, dlink er punkt Die.
virgaurea nana (canadensis). Von niedrigem, straff aufrechtem Wuchs, goldgelbe, federartige Rispen.	
40 cm VIII-IX 0.40	mit eigenartigen gelben braun
- praecox. Wegen der schon im Juli erscheinenden schlank. gelb. Risp. sehr wertvoll. 40 cm VII-VIII 0.40	tenden Blütendolden. 50 cm VII-VIII 1.— Tritoma. Siehe Kniphofia.
Spiraea Aruncus. Siehe Aruncus silvester.	Trollius, Trollblume, Ranunculaceae 0 ~
— filipendula, palmata und andere. Siehe Filipendula. Stachys (Betonica), Scheinziest, Labiatae ○ □	Listhassige Rabatten- und Sch-itt
grandiflora robusta. Schöne, große purpurrosa Lippen-	rosenartig, kugelig, 40-60 cm, W.W.
blüten auf kräft. Stielen in dichter, breiter Aehre. 40 cm VII-VIII 0.50	The state of the s
granditlora superba. Heller wie vorige, von gleichem	zum % Preis. 25 Stück
Wuchs. 40 cm VII-VIII 0.50 — Siehe auch niedere Stauden.	europaeus superbus. Hellgoldgelbe Blumen 0.50 Hybriden, Mischung in gelbus erreit.
Statice, Strandflieder, Plumbaginaceae O 🗆 🐰	- hybr. Atna Tieforangerote Plante, sehr großblumig. 0.50
Aus großen, breitblättrigen Grundrosetten erheben sich die rispigen, schleierartigen Blütenstände, die	— Canary Bird. Kanariengelbe Blüten 0.60 — Earliest of All. Früheste von all
abgeschnitten und getrocknet sehr lange haltbar	— Earliest of All. Früheste von allen, ungeheuer reich- blühend, großblumig golden!!
sind. 40 cm VII-VIII	— Empire Day, Hellorange gell S. 1
— eximia alba. Mit großen, weißen Blüten 0.50 — latifolia. Mit Massen kleiner blauer Blütchen 0.50	- Excelsion Dunkalana
- limonium. Blätter verkehrt eiförm., Blüt. blauviolett 0.50	- Feuertroll Organization 0.60
Stenanthium, Federbusch, Liliaceae D 🗆 ⊥ — robustum. Große, lanzettl. Belaub., kleine rahmweiße	— Goldquelle. Große Kugelblumen, gelborange 0.60 — Goliath. Hodwachs n reichblith
Blüten in großen, federart Risp. 120 cm VII-VIII 1.—	— Goliath. Hodwachs. u. reichblüh., dunkelorange . 0.60 — Götterfunke. Leuchtend orangegelb 0.60
	Begelo 0.60

Trollius hybr. (Fortsetzung)	Viscaria, Pechnelke, Caryophyllaceae O 🗆 🗴 1 St.
— Helios. Kugelförmig, reingelb 0.70	— viscosa alba grdfl. Blüt. in reinweiß. großen Rispen. AM
— Lichtball. Festgeschlossene Kugeln, orangegelb . 0.60	40 cm V-VI 0.40
- Majesty. Große, orangegelbe Blumen 0.60	—— fl. pl. Rot gefüllt, hervorragende Leuchtkraft.
- Orange Kugel. Blüte sehr reich, glüh. orangegelb 0.60	40 cm V-VI 0.40
— — Orangekönig. Leuchtend orangegelb, sehr großbl. 0.70	— — lilacina. Siehe Neuheiten
— — Orange Prinzeß. Schön geformte orangef. Blum. 0.70	Yucca, Palmlilie, Liliaceae ○ □ ⊥
— — Salamander. Kupfrigorange 0.70	— agavaefolia. Siehe Neuheiten
— Schwefelglanz. Hellgelb, großblumig 0.60	- angustifolia. Besonders schmale, steif-spitzblättrige
- japonicus fl. pl. Leuchtend orangegelb, leicht gefüllt 0.70	Belaubung und cremeweiße Blütenglocken.
- Ledebouri. Leuchtend orangefarbig mit langen ver-	60 cm VIII-IX 3.—
breiterten Honigblättern. Eigenartige spätblühende	— filamentosa. Bekannte immergrüne Staude mit breit-
Art. 50 cm	lanzettlicher Belaubung und große Blütenständen
— Golden Queen. Dunkelorangegelber Sommer-	cremeweißer Glocken. 80 cm VIII-IX 1.— — elegantissima. Achnlich der vorigen mit elegant
trollius. 60 cm VI-VII 1.—	
— patulus Bees var. Große, flache, reingoldgelbe Blumen.	schmaler Belaubung. 80 cm VIII-IX 2.— — latifolia. Durch die großen, breiten, dunkelgrünen
40 cm V-VI 0.70 — pumilus Moerheimii. Schr großblumig, goldgelb mit	Blätter unterscheidet sie sich wesentlich von der
mehreren Petalen. 50 cm VI-VII 0.70	Stammart, 100 cm VIII-IX 2.—
— yunnanensis. Wachsartige, goldgelbe flache Blu-	— hybr. filamentosissima. Eine auffallend starke
men. 40 cm V-VI 0.70	Faserbild, an schmalblättriger Belaubung macht
Tropaeolum, Ausdauernde Kapuzinerkresse,	die Sorte besonders interessant und schön. Der
Tropaeolaceae ()—()	Wuchs ist aufrecht und die Blätter blaugrün 2
— speciosum. Interessante, schling. Staude mit schildf.	Zauschneria. Siehe niedere Stauden.
Blättern u zinnoberroten Blüt. 100 cm VIII-IX 0.80	Louisemental brene medere Standen.
	Ausdauernde Küchen- und Heilkräuter
Tussilago, Huflattich, Compositae ○ ≅-() — farfara fol. var. Dekorativ. Weißbuntbl. 30 cm 0.70	Alant (Inula helenium). Die Wurzel wird zu Likör und
	als Heilmittel verwendet 0.40
Valeriana, Baldrian, Valerianaceae ○≅──	Baldrian (Valeriana officinalis). Die Wurzel wird zu
— alliariaefolia. Kräftigwachs. Art m. herzförm. Blättern	Heilmittel verwendet
u. großen, weißen Blütenrispen. 60 cm VII-VIII 0.50	
- Siehe auch niedere Stauden.	Beifuß (Artemisia vulgaris). Als Gewürz bei Braten und
Verafrum, Germer, Liliaceae ○≅-①□ ⊥	Soßen zu verwenden
- album. Prächtige Blattpflanze mit weißen Blüten-	Bohnenkraut (Satureia montana). Für Suppenwürze
rispen. 100 cm VII-VIII 1.—	sowie als Gewürzkraut zu Bohnen und Gurken . 0.40
— californicum. Kandelaberartige Blattstaude m. groß.,	Erdbeer-Tomate (Physalis Franchetii). Bildet im Herbst
weißen Blütenrispen. Selten. 180 cm. VII-VIII 3.—	knallrote Früchte, die roh oder in Zucker eingemacht, in Peru sehr beliebt sind
— nigrum. Schwarzpurpurne Blütenrispen. Prächtige Ein-	Estragon (Artemisia dracunculus). Als Gewürzkraut
zelpflanze. 120 cm VII-VIII 1.50	beim Einlegen von Gurken zu verwenden 0.50
Verbascum, Königskerze, Scrophulariaceae O-ODL	Lavendel (Lavandula vera). Die Blüten liefern auch ein
Herrliche ornamentale Blatt- und Blütenstaude, die	
in jedem Boden gedeiht VII-IX — densiflorum (thapsiformae). Blütenstände dichtbesetzt	gutes Schutzmittel gegen Motten 0.40 Liebstock (Levisticum officinale). Vorzügliches Gewürz
mit mittelgroßen, hellorangegelben Blüten. 100 cm 0.40	für Braten und Suppen
— hybr. C. R. Adams. Siehe Neuheiten 1,—	Majoran (Origanum offinarum comp.). Feines Gewürz
— Mars. Isabellafarbig mit rot. 80 cm 0.60	für Wurstbereitung, sowie für Braten und Suppen 0.50
- phoeniceum. Blüten variieren von weiß durch hellrosa	Pfefferminze (Mentha piperita). Vorzüglich zur Tee-
und hellila bis purpurviolett. 40 cm 0.40	bereitung
- pyramidalum. Rot mit gelb, imposant. 80 cm 0.60	Pimpinell (Sanguisorba minor). Sehr fein für Salate . 0.30
- vernale (nigrum). Mit verzweigtem Blütenstand und	Rhabarber (Rheum). Siehe Obst.
hellgoldgelben Blumen. 150 cm 0.40	
— Cotswold Beauty. Biskuitfarb., purpurschatt. 100cm 0.60	Rosmarin (Rosmarinus officinalis). Die Blätter werden
— — Gem. Gelblichlachsfarb., purpur schatt. 100 cm 0.50	als Heilmittel verwendet
— — Queen. Dunkellachsfarbig. 100 cm 0.60	Salbei (Salvia officinalis). Die Blüten finden als Gewürz
Vernonia, Eisenkraut, Compositae ○ ⊥ ¾	Verwendung, die Blätter als Heilmittel (Salbeitee) 0.50
- crinita (arkansana). In Tracht wie folgende, jedoch	Schnittlauch (Allium schoenoprasum). Vorzüglich für
purpurrote Blütenköpfe. 180 cm VII-IX 0.70	Suppen und Speisen
- noveboracensis. Aufrechtwachsende amerikanische	Thymian (Thymus vulgaris). Liefert eine sehr aro-
Staude mit wechselständigen, lanzettlichen Blättern	matische Speisenwürze 0.30
und dichtdoldigen, purpurvioletten Blütenköpfen.	Tripmadam (Sedum reflexum). Vorzügliches Braten-
180 cm VII-IX 0.70	und Soßengewürz
Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae ○ ∞ □ ¾	Waldmeister (Asperula odorata). Vorzüglich zur
Unverwüstliche Dauergewächse von großer Wider-	Bowlenbereitung
standskraft gegen Dürre.	Weinraute (Ruta graveolens). Uraltes Heilmittel, auch
- Hendersonii (longifolia subsessilis). Prachtvolle	für Kräutersoßen verwendbar 0.50
Staude mit großen dunkelblauen Blütenrispen.	Wermut (Artemisia absinthium). Für Herstellung von
50 cm VII-IX 0.60	
bybr Blankowso S. 1 M 1	Likören und Essenzen. Bewährtes Hausmittel 0.50
hybr. Blaukerze. Siehe Neuheiten	Ysop (Hyssopus officinalis). Blätter finden zur Tee-
— longifolia. Lilablaue Blütenrispen. 70 cm VII-VIII 0.50	Ysop (Hyssopus officinalis). Blätter finden zur Tee- bereitung bei Erkrankungen der Atmungsorgane
	Ysop (Hyssopus officinalis). Blätter finden zur Tee-

Winterharte Bambusen und Ziergräser	Carex (Fortsetzung) 1 St. RM
bringen im Garten angenehme Abwechslung hervor, wenn sie, ihrem Charakter entsprechend, in der Nähe von Gewässern oder	 riparia fol. var. Weißbuntblätterige Form unseres heimischen Riedgrases. 50 cm 0.60 umbrosa. Frischgrüne Belaub. Bildet breite Teppiche. 0.60
als Einzelpflanzen auf dem Rasen angewendet werden.	Chrysopogon nutans. Siehe Neuheiten 0.80
Zeichenerklärung:	Cortaderia, Pampasgras, Gramineae ○ ⊥ ∧
$\bigcirc =$ Sonne, $\bigcirc =$ Halbschatten, $::=$ Einfassung, $\triangle =$ Felsen, $\cong =$ Feucht, $\# =$ Immergrün, $\bot =$ Solitär, $\land =$ Winterschutz.	— Selloana. Sehr dekorativ, mit leuchtend weißen, federartigen Blütenbüscheln im Sommer. 150 cm 2.—
Agrostis, Windhalm, Gramineae O- A 25. — alpina. Feines, zartes Schleiergras. 25 cm 0.50	Cyperus, Zypergras, Cyperaceae ○≅-0
Aira, Waldschmiele, Gramineae O-1	— carexoides. Mit carexähnlicher Belaubung u. braunen Blütenbüscheln. 40 cm
— caespitosa. Dunkelgrüne, graziöse Belaubung, Blüten- ähren gelblich. 40 cm 0.40	Blütendolden. 100 cm
Alopecurus, Goldfuchsschwanzgras, Gramineae ○ ≅	— speciosus. Hellgrüne Belaubung, gelblichgrüne Blüten- dolden. 60 cm
— pratensis aureus. Zierliche, goldbuntblättrige Belaubung und bräunliche Blüten. 40 cm 0.50	Elymus, Strandhafer, Gramineae O
Andropogon, Indianer-Bartgras, Gramineae O — furcatus. Rötlichgrüne Belaubung und lockere, lang-	— glaucus. Mit schönen blauweißen, breiten Blättern. Gedeiht im schlechtesten Boden. 100 cm 0.40 — giganteus. Bläulichgrüne, robuste Belaubung und
gestielte Blütenähren. 100 cm 0.70 Arrhenatherum, Blatthafer, Gramineae ○ ≅	ingerlange Blutenahren. 80 cm 0.50
— bulbosum fol. var. Schmale Blätter, hübsch weißbunt. 30 cm 0.40	Erianthus, Ravennagras, Gramineae ○ ⊥ — strictus. Ornamentale, steifaufrechte Belaubung und weiße, federige Blütenrispen. 150 cm 1.—
Arundinaria, Bambusrohr, Gramineae ○ ≅- → # ⊥	Eriophorum, Wollgras, Cyperaceae $\bigcirc\cong\triangle$
— Fortunei fol. var. Weißbuntblättr. Zwergbambus. 50 cm 1.— metake (japonica). Starkwachsende Art, sehr deko-	- alpinum. Seidenartig feine, silberweiße Samenperiicken
rative Belaubung. 180 cm	20 cm
nitida. Zierlichste und schönste aller Bambusarten, den höchsten Kältegraden widerstehend, bildet präch-	Eulalia. Siehe Miscanthus.
tige, große Büsche von überhängendem, eleganten	Festuca, Schwingel, Gramineae O A: #: #
Wuchs. 200 cm	 alpina. Grüne, feste Polster bildend. 20 cm 0.50 glacialis. Herrliches blaugraues Teppichgras. 10 cm . 0.40 glauca. Blaugrüne Grasart, besond. f. Einfass. 20 cm 0.40 ovina amethystina. Bildet prächtige Grasschöpfe mit silberlilarosa schimmernden Tönungen. 30 cm 0.60
Arundinella anomala. Japanisches Schilfgras O \(\precedef{\pm}\) Tracht ähnlich Miscanthus, jedoch noch straffer auf-	 — glauca pallens. Lilablauschimmernde Belaub. 20 cm 0.60 — sempervirens. Smaragdgrüne Form vorgenannter Art. 30 cm
recht wachsend, auch ist die Belaub. spitzblätterig und dunkelgrüner. Der ganze Busch färbt sich im zeitigen Herbst goldgelb. 150 cm 0.60	Färbung. 10 cm
Arundo, Klarinettenrohr, Gramineae O L donax. Sehr dekoratives Riesenschilf, liebt feuchten	fadenartigen, harten Blättern. 10 cm 0.40 Glyceria, Schwadengras, Gramineae ○ ≅
Boden. 200 cm	— aquatica fol. var. (spectabilis). Rosa, weiß und grijn
— fol. var. Buntblättrig, weiß u. grün gestreift. 150 cm 2.— phragmitis. Einheimisches Schilfrohr. 200 cm 0.40	gestreifte graziös überhängende Blätter. 100 cm. 0.40 Gynerium argentum. Siehe Cortaderia Selloana.
— fol. aurea. var. Mit gelbbunter Belaubung 0.80	Imperata saccharifera. Siehe Miscanthus.
Avena, Blaustrahlhafer, Gramineae O A #	Luzula, Hainsimse, Juncaceae ○≅-① △ #
stehende Blätter. Sehr dekorativ. 40 cm 0.50	— nivea. Weißbehaarte Blatt- und Blütenbüschel 0.40 — silvatica (maxima). Mit etwas weiß gestreift. Blättern
Bambusa. Siehe Arundinaria. Bouteloua oligostachya. Moskitogras O Nordameri-	und breiter Belaubung, 40 cm 0.40
kanische Präriepflanze von eigenartiger Struktur.	Melica, Amerikanisches Perlgras, Gramineae O — altissima. Lange, saftiggrüne Belaubung und silber-
Aeußerst schmalblättrig. Die braunen, 5 cm langen Aehren stehen wagrecht an den beblättert. Stengeln	graue Blütenrispen. 100 cm
und erscheinen in großer Anzahl. 40 cm 0.80	— condensatus. Sehr dekorativ und schön belaubt,
Carex, Segge, Cyperaceae ○ ≅ - ① △ # — acuta fol. var. Immergrüne, breite, gelbgestreifte Be-	Arten durch den niederen Wuchs Selten 80 cm 1 50
laubung, schwarzbraune Blütenähren. 30 cm 0.50 — Buchananii. Siehe Neuheiten	mit hübschen weißen Wedeln, 200 cm
— viridis. Siehe Neuheiten	herrlichen Blütenähren. 200 cm
ähren. 40 cm	— fol. var. Mit breiten weißen Längsstreifen. 150 cm 0.80 — gracillimus. Elegante, lineale dunkelgrüne Blätter von einem weißen Mittelnerv durchzogen. 120 em . 0.60
	2 Arttemery durdizogen, 120 em . 0.60

Miscanthus sinensis (Fortsetzung) 1St. RM	Acorus gramineus (Fortsetzung) 1 St. RM
— zebrinus. Mit gelbgestreiften hängenden Blättern. 150 cm	— fol. var. Zwergkalmus mit schöner weißbunter Belaubung. 30 cm
— — strictus. Aufrechtstehende Blätter mit gelben Querstreifen. 100 cm	Alisma, Froschlöffel, Alismataceae U
Molinia, Bentgras, Gramineae O	— plantago. Breite, langgestielte Blätter. Griffel langgestreckt. Blüten weiß. 70 cm VII-IX 0.40
— coerulea fol. var. Weißbuntes, elegantes, buschiges Gras. 50 cm	— lancifolium. Schmallanzettliche Belaubung, rosaweiße Blüten. 70 cm VII-IX 0.60
Panicum, Hirse, Gramineae $\bigcirc \perp \cong$	Anemopsis, Sumpfanemone, Ranunculaceae U
 altissimum. Zierliche Belaubung. 150 cm virgatum. Schmale bräunlichschimmernde Belaubung und braune Blütenrispen. 100 cm 	— californica. Dunkelgrüne, rotgeaderte, ovalherzförm. Belaubung u. gelblichweiße clethraähnliche Blüten- rispen. Einzelblüte an Anemone erinnernd, 50 cm. 0.80
Pennisetum, Lampenputzergras, Gramineae ○ ⊥ — compressum. Siehe Neuheiten	Aponogeton, Wasserähre, Aponogetonaceae U — distachyus. Schwimmpflanze mit duftenden weißen Blütenähren VIII-X 1.50
— japonicum. Sehr dekoratives Ziergras mit schmaler elegant überhängender Belaubg. Rotbraune walzenförmige Blütenähren mit weißen Spitzen, was die	Butomus, Blumenbinse, Butomaceae U — umbellatus. Blätter schmal schilfartig, schöne rosen-
Schönheit dieses Grases noch steigert. 80 cm 1.50	rote Blüten in Dolden. 60 cm VI-VIII 0.50
Phalaris, Bandgras, Gramineae ○ ≅ — arundinacea picta. Mit schön weißbunten Blättern.	Calla, Sumpfkalla, Araceae — palustris. Weißblühende Sumpfcalla. 20 cm VI-VII 0.70
Nicht wuchernd. 60 cm 0.40	Caltha. Siehe niedere Stauden.
Sesleria, Blaugras, Gramineae ○ ≅ — coerulea. Zierlich blaugrüne Belaubung und rötlich-	Carex. Siehe Ziergräser.
braune Blütenrispen. 30 cm 0.60	Cyperus. Siehe Ziergräser.
Sporobolus, Fallsame, Gramineae O	Equisetum, Riesenschachtelhalm, Equisetaceae — giganteum. Frischgrüne runde Stengel mit stark her-
— aizoides. In Tracht wie Aira. Rauh behaarte Blätter und schöne große Blütenrispen. 90 cm 0.60	vortretenden, schwarzen Ringen. 120 cm. Selten . 2.— — palustre. Großer immergrüner, schwarz gegliederter
Stipa, Haargras, Gramineae ○ △ — calamagrostis. Mit prachtvollen federigen Blüten-	Schachtelhalm. 70 cm 0.70 Eriophorum. Siehe Ziergräser.
ständen. 100 cm	Glyceria. Siehe Ziergräser.
— capillata. 15 cm lange, etwas spiralig gedrehte Grannen. 80 cm	Hibiscus, Sumpfeibisch, Malvaceae ப
— gigantea. Greisenhaargras. Schmale fast borstige Belaubung und lange, fahnenförmige, weiße Blütenähren. 100 cm	— palustris (moschatus). Eibischartige Blätter, Blüten einer einfachblühenden Malve ähnlich, rosablühend. 100 cm VII-VIII 1.50
— pennata. Mädchenhaargras. Sehr zierlich belaubt und lange, federartige Blütenähren. 30 cm 0.60	Hippuris, Tannenwedel, Hippuridaceae U — vulgaris. Zierliche tannennadelartige Belaubung, ver-
Themeda, Japanisches Bartgras, Gramineae ○ ⊥ — Forskalii japonica. Miscanthus-äholiche behaarte Be-	zweigte aus dem Wasser herausrag. Stengel. 40 cm 0.40 Houttuynia cordata U Siehe Anemopsis.
laubung, jedoch viel interessantere Blütenrispen.	Hydrocharis, Froschbifs, Hydrocharitaceae U
100 cm. Selten	— morsus ranae. Schwimmpflanze mit herzförmigen Blättern und weißen Blüten VII-VIII 0.50
— latifolia. Flache bis 2 cm breite und plattgedrückte, prächtige braune Blütenähren. 80 cm 0.80	Iris laevigata, Kaempferii, orientalis i. S., pseudacorus, sibirica i. S., versicolor. Siehe unter mittelhohe
Zizania, Hafer-Reis, Gramineae ○ ≅ — aquatica var. arundinacea. Breite, rohrkolbenartige	Stauden. Juncus zebrinus U Siehe Scirpus Tabernaemontanii
Belaubung, welche sich im Herbst gelblichweiß färbt. Große, haferähnliche Rispen. 150 cm 1.50	zebrinus.
	Limnanthemum, Sumpfrose, Gentianaceae U — nymphaeoides. Schwimmpflanze mit herzförmigen Blättern und gelben Blumen VII-VIII 0.40
Winterharte Sumpf- und Wasserstauden	Lysichitum, Scheinkalla, Araceae
für Teiche und Wasserläufe	— americanum. Mit an Musa erinnernd. Blättern. Große, callaähnliche gelbe Blumen. 50 cm . VII-VIII 3.—
U = welche bis zum Wurzelhals im Wasser stehen müssen, die übrigen gedeihen in sumpfiger Lage.	— camtschatcense. Wie vorige, jedoch weißblühend. 50 cm. Selten VII-VIII 4.—
Acorus, Kalmus, Araceae	Lysimachia. Siehe mittelhohe und niedere Stauden.
— calamus. Dunkelgrün schilfartige Blätter, Blütenstand einen Kolben bildend, wohlriechend. 80 cm 0.40	Marsilia, Kleefarn, Marsiliaceae — quadrifolia.Vierblättrige steinkleeartige Staude. 20 cm 0.80
— fol. var. Weißbunte Blätter. 80 cm 0.80	Menyanthes, Bitterklee, Gentianaceae
— gramineus (pusilla). Seltener Zwergkalamus aus Japan mit grasartiger, blaugrüner Belaubung. 10 cm 1.—	- trifoliata. Mit dreizähligen Blättern. Blüten federartigweiß. 20 cm VII-VIII 0.40

Winterharte Sumpf- und Wasserstauden (Fortsetzung)	W
	Winterharte Seerosen
Myosotis. Siehe niedere Stauden.	Die Kultur der herrlichen, winterharten Seerosen (Nymphaeen) ist sehr einfach und in jedem Garten ausführbar. Sie verlangen
Nuphar, Mummel, Nymphaeaceae U 9.M. — luteum. Gelbe Teichrose VI-VIII 1.50	sonnige Lage, und in künstlichen Bassins darf nur das ver-
— advena. Mit über das Wasser sich erhebenden Blättern	dunstete Wasser erneuert werden. Wer einen Versuch im kleinen
und gelben Blüten. Selten VI-VIII 3.—	machen will, für den genügen in der Hälfte durchschnittene, ausgebrannte Petroleum- oder Seifenfässer, die in den Boden
Ophiopogon, Schlangenbart, Liliaceae	eingelassen werden Pflanzerde soll kräftig sein; gute Lehm-
— japonicus. Immergrüne, grasartige Blätt., blaue Blüten- ähren, türkisblaue Beeren. 30 cm VI-VIII 0.80	erde mit einem guten Teil verrottetem Kuhdünger oder Horn-
Orontium, Goldähre, Araceae U	spänen vermischt und die Oberfläche mit grobem Sand bedeckt, um das Wasser sauber zu halten. In Teichen genügt der vor-
— aquaticum. Maiblumenähnliche Blätter oben dunkel-	handene Schlamm, Pflanzstelle muß jedoch schilffrei sein. Die
grün, unten silberig und gelbe Blütenkolben an	Zeit des Pflanzens ist von Anfang Mai ab. Zur Einsenkung
schneeweißen Stielen. Selten. 30 cm . V-VII 3.—	in Teiche pflanze man die Wurzeln in einen flachen Korb oder in eine 30 cm hohe Kiste, binde zum Festhalten dünnen Bind-
Peltandra, Pfeilaron, Araceae U — virginica. Callaähnliche Blätter und Blumen. 60 cm.	faden oder Draht darüber und versenke sie.
Selten V-VI 3.—	Der Mindest-Wasserstand sei 50 cm für die schwachwachsenden Sorten, wie Laydekeri-, odorata- und pygmaea-Sorten und
Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae U	mindestens 70 cm für die starkwachsenden N. alba, N. Mar-
- cordata. Herzeiförmige Belaubung und blaue Blüten-	liacea, tuberosa und Hybriden.
ähren. 80 cm VII-VIII 2.— - robusta. Siehe Neuheiten	Winterschutz ist in Teichen unnötig. Beton-Behälter und Fässer entleere man vom Wasser und fülle sie mit Torf oder Laub.
	Wir liefern ein feines Sortiment 5 Stück verschiedene Sorten
Ranunculus, Wasserhahnenfuß, Ranunculaceae U — aquatilis. Schwimmende Art mit kreisförmigen,	Nuphar luteum und advena. Siehe unter Sumpf- und
3-5 teiligen Blättern. Anemonenartige, weiße	Wasserstauden. 1 St.
Blüten VI-VIII 0.60	Nymphaea, Seerose, Nymphaeaceae VI-IX RM
— lingua. Lanzettliche Belaubung, gelbe Blüten. 150 cm VI-VIII 0.60	— alba. Die gewöhnliche weiße Seerose 2.— — caroliniana perfecta. Wohlriechend, lachsfarbig 6.—
— grandiflorum. Prächtige Sumpf- u. Wasserstaude	— rosea. Große rosafarbene Blumen, cremefarbene
mit fast fingerdicken, runden Stengeln, schmaler, zungenförmiger Belaubung und wildrosengroßen,	Staubgefäße, sehr wohlriechend 6.— — nivea. Wohlriechend, großblumig, weiß 6.—
goldgelben Blumen. 150 cm V-VIII 1.—	- hybr. afropurpurea. Tiefglänzend karmesinfarben,
Sagittaria, Pfeilkraut, Alismataceae U Gleich dekorat.	Staubfäden goldgelb
durch ihre Blätter und Blumen, alle weißblühend.	— — Aurora. Blum. erst rosag., dann oranger., dann tiefr. 8.— — — Andreana. Schalenförmige, leuchtend rote Blüten 7.—
40-60 cm VI-VIII — latifolia. Mit breitem Blattwerk und großen Blüten . 0.40	— Colossea. Fleischfarbene, in weiß übergehende,
— lancifolia. Mit froschlöffelähnlicher Belaubung 0.50	sehr wohlriechende Blumen
- sagittifolia (japonica). Schmale pfeilförmige Blätter 0.40 - fl. pl. Siehe Neuheiten	Blumen. Staubgefäße orangefarben 8.—
— graminea. Schmalbfättrig und zierliche Blumen . 0.50	— Escarboucle. Große zinnoberrote Blume. Staub-
— — leucopetala. Besonders schöne, reinweiß blühende	gefäße tiefzinnoberrot
und großblättrige Form	zinnoberroten Staubfäden 6
Saururus, Molchschwanz, Saururaceae U — cernuus. Stengelumfassende Blätter und weiße wohl-	— Galathée. Schöne, rote, weiß bemalte Blumen. Staubgefäße orangegelb 8.—
riechende Aehrenblüten. 50 cm. Selten VII-VIII 0.80	— James brydon, Sehr gr., scharlachkarming, Blum 7—
Loureirii. Chinesische, seltene Sumpfstaude mit wechsel- ständigen, 5 cm großen herzförmigen Blättern und	— Indiana. Zuerst orangegelb, geht sie nach und nach
großen, weißen Blütentrauben. Wächst sowohl im	in ein sehr lebhaftes kupferrot über 8.— — Massianello. Große, wohlriechende Blumen, rosa,
Wasser als auchin sumpfig. Lage. 40 cm VII-VIII 0.80	karmin getupft 8 —
Scirpus, Binse, Cyperaceae U	— Meteor. Sehr große, granatrote Blumen 7.— Robinsonii. Rotviolette, in ockerg. übergeh. Blum. 8.—
— lacustris. Riesenbinse, mit dunkelgr. Blattwerk. 200 cm 0.50 — spiralis. Spiralförmig wachsende Binse. 40 cm. Selten 2.—	— — Seignourem. Karminrosa abgestuft auf gelbem
— Tabernaemontanii zebrinus (Juncus). Weiß quer-	Grund. Staubgetake gelb. Sehr reichblihend 7-
gestreifte, an Stachelschweinstacheln erinnernde Binse. 80 cm	Laydekeri alba. Großblumig, weiß Laydekeri alba. Großblumig, weiß Laydekeri alba. Großblumig, weiß Laydekeri alba. Großblumig, weiß Laydekeri alba. Großblumig, weiß
	Sehr schon und reichblühend
Stratiotes, Wasseraloe, Hydrocharitaceae U — aloides. An Aloe erinnernde Schwimmpflanze mit	— rosea. Mit rosaroten Blüten 6.— lucida. Großblumig, dunkelkarminrosa 7.— Marliaga albida XX i
stark gezähntem Blattwerk. 20 cm 0.60	1 - Ividriaced dibida. Weiße, sehr große Blum., reichblih 3 -
Турha, Rohrkolben, Typhaceae U	Carried. Fleischfarbige groke Blumen 4_
- angustifolia. Schmalblätt. Rohrkolb. 200 cm VIII-IX 0.50	— chromatella. Schönste gelbe Art mit braungefleckten Blättern. Blüten u. Blätter sehr schön kontrastierend 5.—
— latifolia. Breitblättriger Rohrkolben. 250 cm 0.40 — Laxmannii. Sehr zierliche, schmalblättrige Art mit	1 — 105ed. Hellrosa, großblumig 5 —
fingerlangen, dünnen Rohrkolben. 120 cm. Selten . 1.—	— odorata superba. Schneeweiß, wohlriechend 4.— — minor. Kleinblumig, weiß
minima. Der kleinste und zierlichste aller Rohrkolben, mit dunkelgrüner, grasartiger Belaubung und nur	Tuberosa rosea, Wohlriechend, rosarof
bis 3 cm langen Rohrkölbchen. 40 cm. Selten 1,—	- Olddstonland, Sehr grok, weik
— Shuttleworthii. Breitblättrige Art mit dicken rundlichen	aller winterharten Seerosen
Rohrkolben. 150 cm. Selten	- Kidiardsonii. Balltormig gefüllt, schneeweiß 4 —
Villarsia U Siehe Limnanthemum.	1 — Rosennymphe. Herrlich rosablühende Riesenblüt. 8.—

Winterharte Garten-Blumenzwiebeln 1 St.	Lilium (Fortsetzung) 1 St.
Allium. Siehe niedere Stauden.	— pardalinum. Pantherlilie. Orangerot, gelb gefleckt.
Anemone. apennina. Siehe niedere Stauden.	— philippinense formosanum. Pelikanlilie. Großblumig,
Colchicum, Herbstzeitlose, Liliaceae $\bigcirc\cong\triangle$ $20-40~\mathrm{cm}$ IX-X	trompetenförmig, weiß mit gelbem Schlund, außen mit rötlichen Mittelstreifen gezeichnet. 80 cm 1.20
— autumnale. Rosarote Blüten. 20 cm 0.30	— regale. Königslilie. Gehört zu den schönsten u. dank-
— fl. pl. Rosagefüllte Blumen. 20 cm	barsten aller Lilien Saftiggrüne, weidenart. Blätter.
— — album. Reinweiße Blüten. 20 cm 0.60	Blume sehr groß reinweiß, das im Schlunde in ein zartes kanariengelb übergeht. 80 cm 0.75
— giganteum. Sehr großblumig, rosarot. 30 cm. Selten 0.80	— speciosum Krätzeri (lancifolium). Edle weiße Blumen
Cyclamen. Siehe niedere Stauden.	auf kräftigen Stielen. 100 cm
Eranthis. Siehe niedere Stauden.	— — roseum. Großblumig rosa. 100 cm 1.20
Eremurus. Siehe mittelhohe Stauden.	— — rubrum. Dunkelrot gefleckte, sehr schöne Blüten.
Erythronium, Hundszahn, Liliaceae ○ △	100 cm
— dens canis. Rotblühend. 20 cm IV-V 0.30	— superbum. Blumen langgestielt, zurückgerollt, orange, braunrot gefleckt. 80 cm
Fritillaria, Kaiserkrone, Liliaceae ○ □ — imperialis. Orangefarbige Blüten hängen kronenartig	— tenuifolium. Korallenlilie. Blüten scharlach. 80 cm. 1.20
an dem dicken, 50 cm hohen Stengel . IV-V 1.20	— tigrinum. Tigerlilie. Rote gefleckte Lilie, die stark
- meleagris. Kiebitzeier. Feine Tönungen um purpur,	wächst und dankbar blüht. 100 cm , 0.60
punktiert. 30 cm. Prachtmischung IV-V 0.20	— — fl. pl. Rote gefüllte Form. 100 cm 0.60
Galanthus,	— — splendens. Besonders leuchtend rote Art. 100 cm 0.60
Schneeglöckchen, Amaryllidaceae ○-①: : △	— Willmottiae. Orangerot, braun punktiert. 80 cm 2.—
— nivalis. Das altbekannte und beliebte Schneeglöckchen.	Muscari, Traubenhyazinthe, Liliaceae ○△ IV-V
15 cm	- botryoides. Dunkelblaue Blütentrauben. 15 cm 0.10
Galtonia, Sommerhyazinthe, Liliaceae ○ □ — candicans. Weiße Glocken an langen Rispen.	Narcissus, Narzisse, Amaryllidaceae O ::
100 cm VIII-IX 0.35	— Golden Spur. Reingoldgelbe, einfache Trompeten- narzisse, frühblühend. 40 cm IV-V 0.20
Leucoium, Märzbecher, Amaryllidaceae ○-① : △	— poeticus ornatus. Dichternarzisse. Einfache, schnee-
- vernum. Aehnlich dem bekannten Schneeglöckchen.	weiße Blumen mit roter Krone. 40 cm IV-V 0.20
Blütenglocken jedoch größer u. mit grünen Tupfen	— Van Sion fl. pl. Gefülltbl., goldgelb. 40 cm IV-V 0.30
an den Spitzen. 20 cm II-III 0.15	
1:11 1:11- 1:11	
Lilium, Lilie, Liliaceae ○-① □ Sie lieben sämtlich einen Platz, wo. der Fuß beschaftet werden kann. Man	Blumenzwiebeln und Knollen
Lilium, Liliaceae O-O Sie lieben sämtlich einen Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder	Blumenzwiebeln und Knollen die im Keller überwintert werden müssen.
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen,	die im Keller überwintert werden müssen.
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus 🔾 🗆 % Knollen werden von März bis Mai in
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen,	die im Keller überwintert werden müssen.
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O = & Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80-100 cm VIII-IX
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.—	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.—	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.—	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O A Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80 – 100 cm VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O X Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80—100 cm VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O X Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80—100 cm VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O A Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80—100 cm . VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachtot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25 — L. H. v. Kattendijke. Fleischfarbig mit roten Flecken . 0.30
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O A Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80—100 cm . VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25 — L. H. v. Kattendijke. Fleischfarbig mit roten Flecken . 0.30 — L. v. Beethoven. Violettmalvenfarbig, sehr eigenartig 0.70
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O A Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80—100 cm . VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25 — L. H. v. Kattendijke. Fleischfarbig mit roten Flecken . 0.30 — L. v. Beethoven. Violettmalvenfarbig, sehr eigenartig 0.70 — Marokko. Die dunkelste der dunkelroten 0.50
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O A Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80—100 cm . VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25 — L. H. v. Kattendijke. Fleischfarbig mit roten Flecken . 0.30 — L. v. Beethoven. Violettmalvenfarbig, sehr eigenartig 0.70
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus ○□ ¾ Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80—100 cm . VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25 — L. H. v. Kattendijke. Fleischfarbig mit roten Flecken . 0.30 — L. v. Beethoven. Violettmalvenfarbig, sehr eigenartig 0.70 — Marokko. Die dunkelste der dunkelroten 0.50 — Marschall. Rosa. Frühblühend 0.20 — Schubert. Aprikosenfarbig, blutrot gefleckt 0.25 — Stutfgardia. Großblumig, glühendrot 0.30 — Walter Bloem. Eine leucht. salmfarbige Primulinussorte 0.30 — Großblumige Farbenauslese in einzelnen Farb. sortiert:
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m.riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus ○□ ¾ Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80 – 100 cm . VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25 — L. H. v. Kattendijke. Fleischfarbig mit roten Flecken . 0.30 — L. v. Beethoven. Violettmalvenfarbig, sehr eigenartig 0.70 — Marokko. Die dunkelste der dunkelroten 0.50 — Marschall. Rosa. Frühblühend 0.20 — Schubert. Aprikosenfarbig, blutrot gefleckt 0.25 — Stuttgardia. Großblumig, glühendrot 0.30 — Walter Bloem. Eine leucht. salmfarbige Primulinussorte 0.30 — Großblumige Farbenauslese in einzelnen Farb. sortiert: weiß, gelb, rosa, rot, lachs, hell- u. dunkelblau, orange 0.25
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m.riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus ○□ ¾ Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80—100 cm . VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25 — L. H. v. Kattendijke. Fleischfarbig mit roten Flecken . 0.30 — L. v. Beethoven. Violettmalvenfarbig, sehr eigenartig 0.70 — Marokko. Die dunkelste der dunkelroten
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus ○ □ ¾ Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80 – 100 cm . VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25 — L. H. v. Kattendijke. Fleischfarbig mit roten Flecken . 0.30 — L. v. Beethoven. Violettmalvenfarbig, sehr eigenartig 0.70 — Marokko. Die dunkelste der dunkelroten 0.50 — Marschall. Rosa. Frühblühend 0.20 — Schubert. Aprikosenfarbig, blutrot gefleckt 0.25 — Stuttgardia. Großblumig, glühendrot 0.30 — Walter Bloem. Eine leucht. salmfarbige Primulinussorte 0.30 — Großblumige Farbenauslese in cinzelnen Farb. sortiert: weiß, gelb, rosa, rot, lachs, hell- u. dunkelblau, orange 0.25 — Prachtmischung aller Farben 0.20 Montbretien ○ □ ¾ Kultur wie Gladiolen.
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus ○ □ ¾ Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80 – 100 cm . VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25 — L. H. v. Kattendijke. Fleischfarbig mit roten Flecken . 0.30 — L. v. Beethoven. Violettmalvenfarbig, sehr eigenartig 0.70 — Marokko. Die dunkelste der dunkelroten 0.50 — Marschall. Rosa. Frühblühend 0.20 — Schubert. Aprikosenfarbig, blutrot gefleckt 0.25 — Stuttgardia. Großblumig, glühendrot
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm 1.— — croceum. Feuerlilie. Starkwachsend m. safranorangefarbenen Blumen. 80 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm 1.— — croceum. Feuerlilie. Starkwachsend m. safranorangefarbenen Blumen. 80 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus ○ □ ¾ Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80 – 100 cm . VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25 — L. H. v. Kattendijke. Fleischfarbig mit roten Flecken . 0.30 — L. v. Beethoven. Violettmalvenfarbig, sehr eigenartig 0.70 — Marokko. Die dunkelste der dunkelroten 0.50 — Marschall. Rosa. Frühblühend 0.20 — Schubert. Aprikosenfarbig, blutrot gefleckt 0.25 — Stuttgardia. Großblumig, glühendrot
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm 1.— — croceum. Feuerlilie. Starkwachsend m. safranorangefarbenen Blumen. 80 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O

EL C. LLING L. LANC LLING	
Einfachblühende und Mignondahlien O = # X	Athyrium filix femina (Fortsetzung)
Wir haben diese einfachblühenden Dahlien neu aufgenommen,	— — Fieldiae. Aehnlich Victoriae, schmale, lange
da sie in vielfacher Hinsicht äußerst wertvoll sind. Sie sind niedrig, daher windfest, ungeheuer reich- und langblühend.	Wedel, ziemlich hoch wachsend. 50 cm 0.70 — Fritzelliae. Schmale, gekrauste Wedel. 50 cm . 0.70
Mit sommer- und herbstblühenden Stauden zusammengepflanzt,	— — Irregulare. Zierliche, feine Form. 40 cm 0.60
lassen sich herrliche Farbwirkungen erzielen VII-X 1St.	— — lineare. Mit dornartig gekrümmten Fieder- blättchen. 40 cm 0.60
Betsy. Leuchtend rot. 50 cm	——— monstrosum. Hellgrüne, am Ende hahnen-
Bishop of Llandaff. Blätter braunrot, Blumen scharlach, lockere Füllung. 60 cm 0.70	kammartig gekrauste Wedel. 40 cm 0.60 — — multifidum. Stark gefiederte Form, besonders
Colfness Gem. Leuchtend scharlachrot. 50 cm 0.60	an den Endspitzen. 50 cm 0.60
Dunecht Yellow, Gelbblühend, 50 cm	— — plumosum. Die üppigen Wedel sind feinzer- schlitzt. 40 cm 0.60
Helvetia (Danebrog). Weiß, feurigrot bandiert. 100 cm 0.60 Lady Aileen. Kräftigrosa, dunklere Mitte. 50 cm 0.60	— — regale. Herrliche, starkgefiederte, hellgrüne
L'Innocence. Reinweiß. 40 cm	Wedeln. 40 cm. Selten
Lucifer. Braunrotes Laub, blutrote Blüten. 60 cm 0.70 Maasland. Dunkelrot. 50 cm	— — setigerum. Sehr schmale, hellgrüne Wed. 30 cm 0.50 — — simpannosum. Wedel sehr zierlich. 40 cm . 0.70
Meteor. Leuchtend zinnoberrot. 50 cm 0.70	— — Standishii. Zierl. gekrauste nied. Form. 50 cm 0.60
Mrs. K. Webb. Blätt. braunrot, Blum. lachsorange. 100 cm 0.70 Orangeflagge. Leuchtend orange. 60 cm 0.80	— — Victoriae. Schmale Wedel, deren Fiederblätter kreuzweise übereinander stehen. 40 cm 0.70
Philine. Niedrigste Sorte, leuchtend dunkelrot. 40 cm 0.60	Blechnum, Rippenfarn, Polypodiaceae $\bullet # \cong \Delta$
Prinzeß Marie José. Leuchtend dunkelrosa. 60 cm 0.70 Prinz Hendrik. Leuchtend rosa. 50 cm 0.70	— penna marina (alpinum). Rasenbildende Art mit leder-
	artiger, dunkelgrüner Belaubung. 10 cm 0.60 — spicant. Glänzende, lederartige Belaubung und lange
Winterharte Freilandfarne	schwarzbraune Sporenträger. 40 cm 0.50
Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, zur Ausschmückung	— serratum. Mit tiefeingesägten Fiederblättchen. 40 cm. Selten
der absonnigen Teile von Felspartien eignen sich ganz besonders	Ceterach, Schriftfarn, Polypodiaceae 🛆 #
die winterharten Farne. Es empfiehlt sich, dem Boden eine Beismischung von Torf oder Lauberde zu geben.	- officinarum. Mauerfarn mit silberweißer, rundlicher
Wir empfehlen ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu RM 45.—, 25 Stück zum Hundertpreis	Belaubung, unten braun besport. 10 cm 0.70
Zeichenerklärung:	Cryptogramma, Rollfarn, Polypodiaceae ● △ ≅ — crispum (Allosorus). Feinfiederiger, hellgrüner Zwerg-
○ = Sonne, gedeiht natürlich auch im Halbschatten. ≅ = ver-	farn. 10 cm
langen feuchte Lage. Schatten, gedeiht auch im Halb-	Cystopteris, Blasenfarn, Polypodiaceae ● ≅
schatten. △ = für Steingärten. # = Immergrün. ¾ = Schnitt.	 — asplenioides. Starkwüchsige, feinblättr. Form. 40 cm 0.60 — bulbifera. Schmale Brutknöllchen tragende Wedel, die
Adiantum, Frauenhaar, Polypodiaceae ● ¾ 1 St. — pedatum. Zierliche Wedel auf dünnen schwarzbraunen	im Frühjahr herrlich rot austreiben. 40 cm 0.50
Stielen ähneln täuschend Adiantum cuneatum. 40 cm 1.—	— fragilis △ Felsenfarn mit zierlichen, frischgrünen Wedeln. 30 cm
Allosorus. Siehe Cryptogramma.	— — alpina. △ Lebhaftgelbgrün, zierliche, kleine, lichte
Aspidium aculeatum, A. angulare, dilatatum. Siehe	Wedel. 20 cm
Polystichum.	Dennstaedtia (Dicksonia) Schüsselfarn, Polypodiaceae ● ≅
— filix mas. Siehe Dryopteris.	— punctilobula. Kriechende Rhizome mit langen zier-
Asplenium, Milzfarn, Polypodiaceae — adiantum nigrum ○ # △ Wedelstiele glänz.schwarz-	lichen, feinzerteilten Wedeln. 30 cm 0.60
braun, Fiederblätter glänzend dunkelgrün. 30 cm. 0,70	Dryopteris (Aspidium) Wurmfarn, Polypodiaceae ● ≃ — decursive pinnata. Eigenartige schmale, grob gefiederte
angustifolium Seltene, halb-immergrüne Art, mit fasanenfederartigen Wedeln. 60 cm 0.70	lange Wedel, 30 cm. Selten 0.60
— germanicum ● △ Hübscher Zwergfarn mit am Ende	 dilatata # Lange, breite, dunkelgrüne Wedel 0.50 gracile # Besonders zierliche Form der vorigen . 0.80
doppelt gefiederten Wedeln. 10 cm 0.70 — ruta muraria ○ △ # Zierlicher Mauerfarn mit kleinen	— erythrosora # Lederartige Blätter, die beim Austrieb
Fiederblättchen. 5 cm	prächtigrot erscheinen. 40 cm. Selten 1.— filix mas. Heimische Art, mit langen Wedeln. 60 cm 0.40
— septemtrionale ○ # △ Wedel derb sattgrün, unregel- mäßig gabelförmig. 15 cm	——— Darnesii. Elegante, schmale Wedel, 50 cm 060
— frichomanes ● # △ Glänz. schwarzbraune Blattstiele	— — cristata. Lange, am Ende gekrauste Wedel. 60 cm 0.60 — — angustata. Schmale, kammartig gekrauste
u. saftiggrüne, feinzerteilte, lineare Blätter. 15 cm 0.50 — viride • △ Mit zierlicher, saftiggrüner Belaub. 15 cm 0.60	Wedel, 40 cm
Athyrium, Streifenfarn, Polypodiaceae	Lilworthi. Lichte, schmale Wedel, 40 cm 060
— filix femina. Hellgrüne, im Herbst absterbende Wedel.	— — erosa crenata. Scharf gekerbte Wedel. 40 cm 0.70 — — fluctuosa. Gedrungen wachsende Form mit
Heimische Art. 50 cm 0.40	etwas gewellten Blattern. 40 cm
— — corymbiferum. Stark gefiederte Wedel. 40 cm 0.60 — — Craigii. Zierlich gefiederte, feine Wedel. 50 cm 0.60	— — furcans. Sehr graziöse, gabelige Wedel. 40 cm 0.60 — — gracile. Aeußerst zierlich, geteilte Wedel mit
— — cristatum. Wedel hellgrün, eigenartig gekraust 0.60	feinzerschlitzten Fiederblättchen, 40 cm 060
— — — nanum \(\triangle \) Herrl. gekr. Zwergform. 30 cm 0.60	lineare. Mit gröberen zerschlitzten, linear- lanzettlichen Fiederblättchen. 40 cm 0.60
— — disectum gracile. Zierliche, fein zerschlitzte Wedel. 30 cm	———— polydaciyla. Mit stark geschlitzter Belau-
erosum minus △ Zwergfarn mit zierlichen	— — bung. 60 cm
kleinen Wedeln. 20 cm 0.60	kammartig gekrausten Fiederblättern. 60 cm 0.60

Dryopteris filix mas (Fortsetzung) 1 St.	Polystichum angulare proliferum (Fortsetzung) 1 St.
— — palleacea. Glänzenddunkelgrüne Wedel, ungesägte Fiederblättchen. 40 cm	 — nephrolepifolium. Siehe Neuheiten 3. — scalptum densum. Prachtvolle Wedel, deren einzelne Fiederblättchen gespalten sind. 40 cm 0.80 — Wollaston. Breite, starkgefiederte Wedel. 60 cm 0.80 — lobatum. Glänzend lederartige Wedel 0.60
derblättchen am Ende büschelartig zusammenstehen. 60 cm	Pteridium, Adlerfarn, Polypodiaceae — aquilinum (Pteris aquilina). Hohes, heimisches Farn- kraut mit dreifachgefied., ausgebreit. Wed. 100 cm 0.50
Wedeln. 30 cm	Scolopendrium U Siehe Phyllifis.
doppelt so lange und breite, zartgrüne Wedel. 40 cm 0.60 — noveboracensis. Amerikanische Art mit starkgefiederten, bleichgrünen Wedel. 40 cm 0.70	Struthiopteris U Siehe Matteucia.
— phegopteris. Breit dreieckig, zarthellgrüne Wedel.	Winterharte Heidekräuter
Robertiana. Dreieckige, gesiederte Wedel. 40 cm 0.50 spinulosa # Halbimmergrüne, heimische Art, im Bau ähnlich wie dilatatum. 40 cm 0.40	Obwohl diese in fast jedem lockeren, humosen Gartenboden gedeihen, ist es doch vorteilhaft, ihn durch reichlichen Zusatz von Heides, Laubs oder Moorerde oder Torfmull zu verbessern.
— thelypteris. Wedel lebhaftgrün, langgestielt, weich. 30 cm	Leichte Bedeckung mit Tannenreis im Winter ist zu empfehlen. Wir liefern ein feines Sortiment von 100 St. in 20 Sorten unserer Wahl mit Namen zu RM 50.— Ab 25 Stück Hundertpreis.
Lomaria alpina. Siehe Blechnum. Matteucia, Becherfarn, Polypodiaceae ○ ≅	Bruckenthalia, Ahrenheide, Ericaceae O - 1 A # 15t.
— struthiopteris (Struthiopteris germanica). Die jungen, zarthellgrünen Wedel bauen sich zu einem trichter-	— spiculifolia. Feinnadelige saftiggrüne Belaub., dichte hellrosafarbige Blütenährchen. 30 cm VI-IX 0.80
förmigen Becher aus. 80 cm 0.60 — pennsylvanica. Stärkerwachsende Art, mit blaugrünen Wedeln. 100 cm	Calluna, Herbstheidekraut, Ericaceae ○ - ① △ # 10-30 cm VIII-IX — vulgaris. Unser gewöhnliches, allbekanntes und be-
Onoclea, Perlfarn, Polypodiaceae ○ ≅ — sensibilis. Kriechende Rhizome mit eigenartiger, grau-	liebtes Heidekraut mit lila Blütenrispen 0.50 — alba. Mit weißen Blüten 0.60
grüner Belaubung. 40 cm	— — plena. Siehe Neuheiten
treibenden Wedeln 1.—	— — erecta. Aufrechte, kräftigwachsende Sorte mit weißen Blüten
Osmunda, Königsfarn, Osmundaceae → ≃ — cinnamomea. Zierliche Art mit gelblichgrünen, später	— Alportii. Schlanke graugrüne Triebe, dunkelrote Blütenrispen
zimtbraunen Sporenträgern. 50 cm 1.50	— — argentea. Silbergraue Belaubung und lila Blüten 0.60
— Claytoniana. Aehnl. der vorigen, mit gröberen Fruchtwedeln. 60 cm	— — aurea. Goldgelbe Belaubung, Iila Blütchen 0.60 — — Camla Variety. Siehe Neuheiten 1.—
— regalis. Breite, lange, gelblichgrüne, doppeltgefüllte Wedel, zierende, lange Sporenträger. 80 cm 1.—	— — compacta. Von gedrungenem Wuchs, lila Blüten . 0.60 — — cuprea. Belaubung rötlichgelb, im Winter leuch-
— gracilis. Sehr zierlich belaubt. 40 cm. Selten 3.—	tend kupferbraun, Blüten lila 0.60
Phyllitis, Hirschzungenfarn, Polypodiaceae ● ≅ △ # — scolopendrium. Starkwachsender, herrlicher Farn,	 — dumosa. Starkverzweigt, dichte Form, Blüten lila 0.60 — eleganfissima. Sehr zierliche Form, lila Blüten . 0.60
mit breit lanzettlichen Wedeln. 30 cm 0.60	— — fl. pleno. Große, gefüllte, lila Blütenrispen 0.70
— cristatum. Prächtige, gekrauste Form. 30 cm 0.80 — lacerum. Mit starkgeschlitzten Wedeln. 30 cm . 0.80	— — Foxii. Siehe Neuheiten
— — marginatum. Monströs geränderte Form. 30 cm. 0.80	Blüten
— monstrosum. Schmale, monströs geformte Blätter.	— H. G. Beale. Siehe Neuheiten
— nepenthoides. Blätter am Grunde nepenthesartig	— — minima. Ganz niedrige, dunkelgrüne Rasen bildend.
zusammengerollt. 30 cm	Lila Blüten
monströs-schirmartig geformt. 30 cm 0.80	— — prostrata. Siehe Neuheiten
— undulatum. Breite und lange, hellimmergrüne, ge- wellte Blätter. Sehr effektvoll. 30 cm 0.80	— — atrorosea. Siehe Neuheiten 0.80 — — flagelliformis. Siehe Neuheiten 0.80
— var. Hookeri. Siehe Neuheiten	— — Kuphaldii. Siehe Neuheiten 1.—
Polypodium, Tüpfelfarn, Polypodiaceae ● △ #	— pygmaea. Niedrigbleibende Art mit lila Blüten 0.60 — Searlei. Graugrün belaubt, weiße Blüten, spät-
- vulgare. Mit kriechenden Rhizomen u. dunkelgrünen, tiefeingeschnittenen, fiederteiligen Wedeln. 30 cm 0.50	blühend 0.60
— cambricum pulcherrimum. Prächtige, an Nephro-	— spicata. Große, lila ährenartige Rispen 0.70 — tenuis. Siehe Neuheiten 0.80
lepis erinnernde breite Wedel. 30 cm 0.80 Polystichum, Punktfarn, Polypodiaceae ● # ≅	Erica, Ericaceae ○─● △ # :#:
- acrostichoides. Seltene nordamerikan. Art mit langen,	Frühjahrs-Heidekraut — Schneeheide.
lederartigen, grobgefiederten Wedeln. 60 cm 1.— — aculeatum. Lange, schmale, lederart. Wedel. 40 cm . 0.60	10–30 cm III-IV — carnea. Frühblüh. Art, sobald der Schnee verschwindet
— angulare divisilobum. Große feingefied. Wedel. 50 cm 0.80	mit leuchtend rosenroten Blütchen bedeckt 0.60
— — robustum. Üppigwachsende Form mit fein zerteilter Belaubung. 60 cm	— alba. Schöne reinweiße Abart der vorigen 0.70 — atrorubra. Siehe Neuheiten 0.80
— — plumosum. Sehr feinzerteilte Wedel, moosartig	— gracilis. Siehe Neuheiten
durchscheinend. 40 cm	— King George. Leucht. rosenrote, auffallende Farbe 0.70 — Springwood. Siehe Neuheiten 1.—
Wedel. Sehr dekorativ. 50 cm 0.80	— Thomas Kingskote. Siehe Neuheiten 0.80

Winterharte Heidekräuter Fortsetzung 1 St.		1 St
Erica carnea (Fortsetzung)	— ledifolia alba. Großblumig, weiß	3.50
— Vivellii. Belaubung dunkelgrün, Blüten karminrot 0.60	— malvatica. Einfache, lilablaue Blumen	3.50
— Winter Beauty. Großblumig, dunkelrosa, blüht schon Anfang Januar 0.60	— Maxwellii. Karminrote Blüten	3.50
— ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill. Siehe Neuheiten 0.80	— Yodogawa. Halbgefüllt, lilablau	3.50
- hybr. Dawn. Siehe Neuheiten 0.80	Verschiedene Sorten: ○-① @	
— mediterranea erecta. Bildet kräft. aufrechte Büsche,	Arendsii. Siehe Neuheiten	1
deren graziöse Triebe von unten bis oben besetzt	- mollis. Große Blumen in großen Dolden, blühen vor	4
sind mit rosaroten Blüten. Blüht unaufhörlich vom	dem Laub. Feinstes Farbenspiel in gelb, lachs.	
zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein 0.80	orange und rot	2.50
— hybr. Dunkelrosa Blüten wie carnea, später blüh. 0.60	hybr. In separaten Farben: gelb, lachs, orange	
Erica. Sommer-Heidekraut ○-① △ # VII-VIII — stricta. Aufrechtwachsend, rosa Blüten. 40 cm 0.60	und rot	3.—
— tetralix. Endständige Köpfchen, rosa Blütenglocken . 0.60	— Kosters Brillant. Großbl., scharlachrot 4	4
— alba. Graufilzige Triebe, weiße Blütenglöckchen . 0.60	- pontica. Gelbe Blüten, etwas kleiner als die von	7
- vagans. Kräftigwachsende Art, Blütentrauben von	A. mollis	J.—
frischrosa Farbe. 30 cm	orange, lachs, rosa und rot	3 50
— alba. Abart der vorigen, reinweiße Blüten 0.60	- Vaseyi. Früher blühend als obige, zartrosafarbige	
— — carnea. Mit fleischfarbigrosa Blüten. 30 cm 0.60	Blumen	4.—
- F. D. Maxwell. Siehe Neuheiten	— viscosa. Wohlriechende, weiße Blumen	4.—
— — Lyonesse. Siehe Neuheiten 0.80 — — rubra. Dunkelrosa Blütentrauben. 30 cm 0.60	Cassiope, Zypressenheide, Ericaceae ○-③ △ #	
— St. Keverne. Siehe Neuheiten 0.80	- tetragona. Schuppenartige Blätter, wachsweiße Blu-	
- arborea alpina. Streng aufrechtwachsend, lichtgrüne		1.50
Belaubung, weiße Blüten. 50 cm V-VI 1.—	Clethra, Maiblumenstrauch, Clethraceae ○ ⊥ Ø	
Empetrum, Rauschbeere, Empetraceae O-1 A #	— alnifolia. Weiße Blüten im Aussehen und Wohlgeruch	
- nigrum, Kriechende Pflanzen mit nadelartiger Belau-		1.50
bung, rosaroten Blüten und schwarzen Beeren.	Daboecia, Kriechheide, Ericaceae ○-→ △ #	
20 cm VI-VII 0.80	- polifol. Kleines Sträuchlein, Blüten rot, maiblumenartig	1
— scoticum. Feinblättrige Form der vorigen. 20 cm VI-VII 0.80	TYY 101 101	1
	Daphne , Seidelbast, Thymelaeaceae $\bigcirc \cong \triangle$	
Winterharte	— Blagayana # Kriechende, großblättrige Art mit rahm-	
Immergrüne und Moorbeetpflanzen		3.—
Der Pflanzerde ist reichlich Torfmull oder Lauberde beizumischen.	— cneorum # Kleiner hübscher Strauch, dunkelgrüne	
Del I lidizerde ist relatifat rollifiati odel Ladoelde beizumischen.	D1::1 . D1::. 1 11 00 **** **	17
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend		3.—
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren	
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufüllen.	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm III-IV	3.— 2.— 3.—
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufüllen. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae • # 1 St.	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm III-IV	2.—
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufüllen. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm III-IV	2.—
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufüllen. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen er-	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm III-IV	2.—
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufüllen. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	 mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.— 3.—
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufüllen. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** 1 St.* — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	 mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.— 3.—
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufüllen. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm III-IV	2.— 3.—
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufüllen. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm III-IV	2.— 3.— 1.20
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufüllen. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm III-IV	2.— 3.— 1.20
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufülten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm III-IV 2 — album. Weißblühende Form. 80 cm . III-IV 3 Gaultheria, Scheinbeere, Ericaceae ○— ♠ ★ # — procumbens. Kriech., lederart., frischgrüne Blättch., weiße Blütenglöckchen und rote Beeren VI-VII — shallon. Rosaweiße Blütenglöckchen, schwarze Beeren VI-VII IIex, Stechpalme, Aquifoliaceae ○— ♠ # ↓ — aquifolium. Glänzend dunkelgrüne stachelige Blätter. Korallenrote Früchte. 100—125 cm	2.— 3.— 1.20
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufülten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm III-IV 2 — album. Weißblühende Form. 80 cm . III-IV 3 Gaultheria, Scheinbeere, Ericaceae ○— ♠ ★ — procumbens. Kriech., lederart., frischgrüne Blättch., weiße Blütenglöckchen und rote Beeren VI-VII — shallon. Rosaweiße Blütenglöckchen, schwarze Beeren VI-VII IIex, Stechpalme, Aquifoliaceae ○— ♠ ★ — aquifolium. Glänzend dunkelgrüne stachelige Blätter. Korallenrote Früchte. 100—125 cm	2.— 3.— 11.20 11.20 6.—
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufülten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm III-IV 2 — album. Weißblühende Form. 80 cm . III-IV 3 Gaultheria, Scheinbeere, Ericaceae ○— ♠ ★ — procumbens. Kriech., lederart., frischgrüne Blättch., weiße Blütenglöckchen und rote Beeren VI-VII — shallon. Rosaweiße Blütenglöckchen, schwarze Beeren VI-VII IIEx, Stechpalme, Aquifoliaceae ○— ♠ ★ — aquifolium. Glänzend dunkelgrüne stachelige Blätter. Korallenrote Früchte. 100—125 cm	2.—3.—11.20 11.20 6.—3.—
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufülten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm III-IV	2.— 3.— 11.20 11.20 6.—
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufülten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm III-IV	2.—3.— 11.20 11.20 6.—
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufülten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae () # 1St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.—3.—11.20 11.20 6.—3.—
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufülten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae () # 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.—3.— 11.20 11.20 6.—
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufülten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** 1 St.* — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.— 3.— 11.20 11.20 6.— 3.— 4.— 11.50
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufülten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** # 1 St. ** #	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.—3.— 11.20 11.20 6.—
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufülten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** # 1 St. ** #	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.— 3.— 11.20 11.20 6.— 3.— 4.— 11.50
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufülten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** # 1 St. ** #	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.— 3.— 11.20 11.20 6.— 3.— 4.— 11.50
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufülten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** # 1 St. ** #	mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.— 3.— 11.20 11.20 6.— 3.— 4.— 11.50
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufüllen. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae # 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.— 3.— 11.20 11.20 6.— 3.— 4.— 11.50
Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufülten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae ** # 1 St. ** #	— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.— 3.— 11.20 11.20 6.— 11.50 2.—
Bet lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmult und Lauberde vermischt wird, aufzufütten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae # 1 St. # 1	mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.— 3.— 11.20 11.20 6.— 3.— 4.— 11.50
Bet lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufüllen. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae # 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.— 3.— 11.20 11.20 6.— 4.— 11.50
Bet lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufüllen. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae • # 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.— 3.— 11.20 11.20 6.— 11.50 2.— 2.—
Bet lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufülten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae () # 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.— 3.— 11.20 11.20 6.— 4.— 11.50
Bet lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufüllen. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae • † 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.— 3.— 11.20 11.20 6.— 3.— 4.— 11.50 2.— 3.—
Bet lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben und diese mit kalkfreiem Sand oder sandiger Erde, welche ebenfalls mit reichlich Torfmull und Lauberde vermischt wird, aufzufülten. Andromeda, Lavendelheide, Ericaceae () # 1 St. — floribunda. Frischgrüne, lederartige, längliche Blätter, große, weiße Rispenblüten, an Maiblumen erinnernd	mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm	2.— 3.— 11.20 11.20 6.— 11.50 2.— 2.—



Carex japonica im Rauhreif



Phyllitis scolopendrium undulatum



Paeonia moutan Dakota




Nymphaea Marliacea albida



Clematis hybr. Lasurstern

MI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Winterharte 1 St. Immergrüne und Moorbeetpflanzen Fortsetzung	Rhododendron catawbiense (Fortsetzung) 1 St. RM
Magnolia soulangeana (Fortsetzung)	— hybr. Sämlinge. Hell- bis dunkellila und purpurne
— Alexandrina. Innen purpur, auß. weiß. IV-V 15.—	Farbtöne.
— — Lennei. Große karminrote Blumen. Eine der	— Cunninghamii White. Schöne weiße Blüten.
schönsten IV-V 15.—	 hybr. Caractacus. Purpurrot. Charles Dickens. Leuchtend rot.
- nigra. Lange, dunkelrote Blüten IV-V 15	— Everestianum. Violettlila.
- stellata. Mit reinweißen, sternartigen Blüt. IV-V 10	— giganteum. Kirschrot.
Pernettya, Moormyrte, Ericaceae • #	, — Pink Pearl. Leuchtend rosa.
— mucronata. Dunkelgrüne Belaubung, an Brautmyrte erinnernd. Weiße Blütenglöckch. im Frühling. Große	— — purpureum grandifl. Dunkelviolett.
rosa, rote oder weiße Beeren im Herbst. V-VI 1.50	Vorstehende Sorten:
Phyllodoce, Moosheide, Ericaceae ○ - ● △ #	50-60 cm 4.50 60-70 cm 5.50 70-80 cm 6.50
— empetriformis. Rosafarbene Glöckchen an den Zweig-	Gruppe Azalea
spitzen. 20 cm VI-VII 1.20	— flavum, japonicum usw. Siehe unter Azalea.
- splendens. Siehe Neuheiten 1.50	Vaccinium, Ericaceae ()
- taxifolia. Nadelartige Blätter, rote Glocken-	- corymbosum. Nordamerikanische Heidelbeere, deren
blüten VI-VII 1.— Prunus, Kirschlorbeer, Rosaceae ○ - ● #	schwarze, wohlschmeck. Früchte im August reifen 2.—
— laurocerasus Reynvanii. Harte Art mit dunkel-	— macrocarpum. Amerikanische Moosbeere. Kriechende Art mit ziemlich großen weißen Blüten und großen,
grüner schmalblättriger Belaubung 3.—	preiselbeerartigen Früchten 1.50
— schipkaensis. Lanzettliche Blätter, schräg aufrecht	— myrtillus. Heidelbeere
strebende Zweige	— vitis Idaea △ # Preißelbeere. Weißlichrosa Blüten in
— Iusitanica pyramidalis. Portugiesisch. Kirschlorbeer.	Glockentrauben. Leuchtend rote, wohlschmeckende
Pyramidal wachsend, schwärzlichgrüne Blätter,	Früchte. 30 cm VI-VIII 0.80
schöne weiße Blütenrispen V-VI 2.50	Niedrig bleibende und kriechende Felsen-
Rhododendron, Alpenrose, Ericaceae	
Gruppe Echte Alpenrosen: ○-① △ # Kleinblumige außerordentlich reichblühende Gebirgs-	sträucher (Zwerggehölze)
formen die besonders in Steingärten unentbehrlich sind.	Acer, Japanische Zwerg- oder Fächerahorn,
- ambiguum. Chinesische Art mit gelben Blüten in	Aceraceae O & Three schönen Belaubung, sowie
großer Zahl V-VI 4.—	ihres langsamen Wuchses wegen, sind sie prächtige Ziergehölze für den Steingarten. Auch als Einzel-
- arbutifolia. Karminrosa Blüten V-VI 3	pflanze im Zierrasen sind sie von malerischer Wir-
- azaleoides. Mit hellrosafarbenen, wohlriechenden	kung. Es empfiehlt sich, im Winter den Fuß des
Blumen V-VI 4.— — brachycarpum. Sehr harte, japanische Art mit gelblich-	Stammes handhoch mit Laub einzufüllen. 1St.
rosa Blüten VI-VII 3.—	— palmatum. Zierliche, braunrot austreibende grüne
— caucasicum. Kaukasische Alpenrose. Sehr harte,	Belaubung, die sich im Herbst leuchtend rot färbt 1.50
langsam wachs. Art. Rahmgelbe Blum. IV-V 3.—	— atropurpureum. Schöne breitblättrige Form mit
— dahuricum, Halbimmergrün, Purpurrosa	prachtvoll dunkelroter Belaubung
Blumen III-IV 3.— ferrugineum. Lederartige, dunkelgrüne, unterseits	— crispum. Stark gekrauste grünblätterige Form . 4.—
rostbraune Blätter. Purpurrote Blüten in Dolden-	— disectum atropurpureum. Starkgeschlitztblätt-
trauben V-VI 3.—	rige, dunkelblutrote Form 4.50
- Fortunei. Ziemlich große Blumen, zartrosa. V-VI 3	Viride Feingeschlitzte grünblättrige Form 350
- hypnophaeoides hypr Siehe Neuheiten 4 -	— — viride. Feingeschlitzte, grünblättrige Form . 3.50
hyppophaeoides hybr. Siehe Neuheiten 4.—	— filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter 3.50
- hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote	— filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter 3.50 — Oshiri Beni. Sehr dekorative, grünblättrige Form 3.50
hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen V-VI 3.—	— filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter 3.50 — Oshiri Beni. Sehr dekorative, grünblättrige Form 3.50 — reficulatum. Mittelgroße Blätter v. hellgraugrüner
— hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen V-VI 3.— — intermedium. Eine Hybride zwischen Rh. ferrugineum	— filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter 3.50 — Oshiri Beni. Sehr dekorative, grünblättrige Form 3.50 — reticulatum. Mittelgroße Blätter v. hellgraugrüner bis gelblichweißer Färbung 3.50 — roseum marginatum. Grüne, rosa berandete Be-
 hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen V-VI 3.— intermedium. Eine Hybride zwischen Rh. ferrugineum und Rh. hirsutum V-VI 3.— kamtschaticum. Laubabwerfernde Art mit rosa Einzel- 	— filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter 3.50 — Oshiri Beni. Sehr dekorative, grünblättrige Form 3.50 — reticulatum. Mittelgroße Blätter v. hellgraugrüner bis gelblichweißer Färbung
 hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen V-VI 3.— intermedium. Eine Hybride zwischen Rh. ferrugineum und Rh. hirsutum V-VI 3.— kamtschaticum. Laubabwerfernde Art mit rosa Einzel- Blüten	— filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter 3.50 — Oshiri Beni. Sehr dekorative, grünblättrige Form 3.50 — reticulatum. Mittelgroße Blätter v. hellgraugrüner bis gelblichweißer Färbung
 hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen V-VI 3.— intermedium. Eine Hybride zwischen Rh. ferrugineum und Rh. hirsutum V-VI 3.— kamtschaticum. Laubabwerfernde Art mit rosa Einzel- Blüten V-VI 3.— mucronulatum. Laubabwerfende, mandschurische Art 	— filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
 hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen V-VI 3.— intermedium. Eine Hybride zwischen Rh. ferrugineum und Rh. hirsutum V-VI 3.— kamtschaticum. Laubabwerfernde Art mit rosa Einzel- Blüten V-VI 3.— mucronulatum. Laubabwerfende, mandschurische Art mit leuchtend purpurrosa Blüten III-IV 3.— 	— filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
 hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen V-VI 3.— intermedium. Eine Hybride zwischen Rh. ferrugineum und Rh. hirsutum V-VI 3.— - kamtschaticum. Laubabwerfernde Art mit rosa Einzel- Blüten V-VI 3.— mucronulatum. Laubabwerfende, mandschurische Art mit leuchtend purpurrosa Blüten III-IV 3.— myrtifolium. Dunkelgrüne Belaubung, hellrosa 	 filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
 hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen V-VI 3.— intermedium. Eine Hybride zwischen Rh. ferrugineum und Rh. hirsutum V-VI 3.— kamtschaticum. Laubabwerfernde Art mit rosa Einzel- Blüten V-VI 3.— mucronulatum. Laubabwerfende, mandschurische Art mit leuchtend purpurrosa Blüten III-IV 3.— myrtifolium. Dunkelgrüne Belaubung, hellrosa 	 filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
 hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen V-VI 3.— intermedium. Eine Hybride zwischen Rh. ferrugineum und Rh. hirsutum V-VI 3.— - kamtschaticum. Laubabwerfernde Art mit rosa Einzel- Blüten V-VI 3.— - mucronulatum. Laubabwerfende, mandschurische Art mit leuchtend purpurrosa Blüten	 — filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
 hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen V-VI 3.— intermedium. Eine Hybride zwischen Rh. ferrugineum und Rh. hirsutum V-VI 3.— kamtschaticum. Laubabwerfernde Art mit rosa Einzel- Blüten V-VI 3.— mucronulatum. Laubabwerfende, mandschurische Art mit leuchtend purpurrosa Blüten	 — filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
 hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen V-VI 3.— intermedium. Eine Hybride zwischen Rh. ferrugineum und Rh. hirsutum V-VI 3.— kamtschaticum. Laubabwerfernde Art mit rosa Einzel- Blüten V-VI 3.— mucronulatum. Laubabwerfende, mandschurische Art mit leuchtend purpurrosa Blüten	 — filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
 hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen 	 — filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
 hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen	 — filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
 hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen	 — filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
 hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen	 — filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
 hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen	 — filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
- hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen V-VI 3.— - intermedium. Eine Hybride zwischen Rh. ferrugineum und Rh. hirsutum V-VI 3.— - kamtschaticum. Laubabwerfernde Art mit rosa Einzel- Blüten V-VI 3.— - mucronulatum. Laubabwerfende, mandschurische Art mit leuchtend purpurrosa Blüten	 — filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
— hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen V-VI 3.— — intermedium. Eine Hybride zwischen Rh. ferrugineum und Rh. hirsutum	 — filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
- hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen V-VI 3.— - intermedium. Eine Hybride zwischen Rh. ferrugineum und Rh. hirsutum V-VI 3.— - kamtschaticum. Laubabwerfernde Art mit rosa Einzel- Blüten V-VI 3.— - mucronulatum. Laubabwerfende, mandschurische Art mit leuchtend purpurrosa Blüten	 — filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
— hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen	 — filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter
— hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen	 — filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter

Berberis (Fortsetzung)	Cotoneaster (Fortsetzung) 1 St. RM
— Hookeri # Lederartige, bis 8 cm lange u. 2 cm breite	- prostrata. Starkverzweigte, auf der Erde liegende Art.
kurzgestielte Belaubung. Blüten groß, prächtig	Belaubung groß, hellgrün. Früchte leuchtend rot . 2.—
schwefelgelb	— fructu sanguinea. Siehe Neuheiten 2.— — rubens # Auffallend stumpfschwarzgrüne, zierliche
mit den gleichen guten Eigenschaften 2.50	Belaubung und schöne, rote Früchte 1.50
- Julianae # Elyptischlanzettliche Blätter, unterseits	- rupestris. Von niedrigem Wuchs, überschattet mit leuch-
grünlichweiß, goldgelbe Blüten 2.50	tend roten Beeren. Laub rötlichblaugrün 2.—
— stenophylla# Blätter lederartig, oberseits dunkelgrün, unterseits weißlichgrün, Blüten gelb 2.—	Crataegus pyracantha. Siehe Pyracantha coccinea.
— — empetrifolia # Empetrumblättrige Form mit rot-	Cytisus, Besenginster, Leguminosae ○-∞△ ⊥ V-VI
holzigen, gebogenen Zweigen u. goldgelben Blüten 2.50	- albus. Kleine weiße Blüten an schlanken Rispen 1.50
— Irwinii # Reichblühender, niedriger, dichtwachsend. Strauch mit dunkelgrüner, unterseits silberweißer	— durus. Reichblühende Form, cremeweiße Blüten. 1.—
lederartiger Belaubung und gelben Blüten 2.50	— Ardouinii. Niedriger Felsenstrauch, gelbe Blüten 1.50 — decumbens. Siehe Neuheiten
— — latifolia # Eine großblättrige Form der Stammart 2.50	- kewensis. Kriechender Bastard, lichtgelbe Blüten 2.50
Thunbergii Hellgelbe Blüten, korallenrote Früchte 0.70	- praecox. Elfenbeinginster. Zierl. Zweige, schwefel-
— atropurpurea. Blutrotes Laub, gelbe Blüten, einer der schönsten unter den Berberitzen 1.—	gelbe Schmetterlingsblüt. Ungeheuer reichblühend 1
— — minor. Niedrigbleibende Form von B. Thunbergii 1.20	— prostrata. Stark auf dem Boden liegende Art mit gold- gelben Blüten
- verruculosa # Lederartige, starkbestachelte Blättchen.	— purgans major. Schwefelgelbe Blüten 2.—
Blüten goldgelb. 40 cm	- purpureus incarnatus. Aufrechtwachsende Art mit
Veitchii # Starkbedornter Strauch mit fingerlanger lederartiger Belaubung und goldgelben Blüten 2.50	rosafarbigen Blüten
- Wallichiana # Große, lederartige, breite Blätter,	hellgelben Blütenköpfen
gelbe Blüten	— scoparius Andreanus. Blüten gelb mit roten Flügeln 1.50
— Wilsonae & Stachel. Büsche, kleine bläulichschimmernde Belaubung, Blüten goldgelb 1.20	— — pendula. Bogig überhängende Zweige. Blüten
Betula, Zwergbirke, Betulaceae ○ △ 🔊	gelb mit rot
— nana. Kleinblättrige, niedrige, sehr langsam wachsende	— C. E. Pearson. Sehr große, rosabunte Blüten 2.50
Art	— — Daisy Hill. Fahlgelb mit verwaschenem rot. Eigen-
Caragana, Erbsenstrauch, Leguminosae ○ △ V-VI	artiges Farbenspiel
aurantiaca. Schwachbedornter Zwergstrauch mit	 — Dallimorei. Lebhaftkarmin geflügelte Blüten 2.50 — Dorothy Walpole. Fahne magentarosa, Flügel
genistaähnlichem Aussehen und orangegelben Schmetterlingsblüten, welche an den gebogenen	tiefrot. Eine der schönsten Roten 2.50
Zweigen sitzen 2.50	Dragonfly. Nankinggelb, Flügelsamt.düsterkarmin 2
- Maxinowicziana. Zierlicher dichter Strauch mit klei-	— Firefly. Feurigrot geflügelte Blüten 2.—
nen lebhaft grünen Blättchen und gelben Blüten 2.50	— fulgens. Golgelbe, eigenartig leuchtend braunrot überzeichnete Blüten
Caryopteris, Bartblume, Verbenaceae ○ △ — incana (mastacanthus). Herrlicher Sommerblüher mit	— — Mayfly. Gelb, rot überschattet 2.—
gekerbter, silbergrauer Belaubung und blauen	- Moonlight. Blaßgelb. Sehr wertvoll, da es die spät-
Blütendolden 1.20	blühendste Sorte ist 2.50
Convolvulus cneorum. Siehe Neuheiten 1.50	Daphne. Siehe Moorbeetpflanzen.
Cotoneaster, Zwergmispel, Rosaceae ○△®	Dryas. Siehe niedere Stauden.
— adpressa. Chinesische Art, gedrungener und niedriger	Elsholtzia, Labiatae ○ △ Ø ⊥ — Stauntonii. Herbstblühender Zwergstrauch mit rötlich-
wie C. horizontalis, mit etwas größeren Blättern und lebhaftroten Früchten. 20 cm 1.50	violetten Blütenähren VIII-IX 1.50
— amoena. Siehe Neuheiten 2.50	Ephedra. Siehe Zwergkoniferen.
- buxifolia # Buxbaumblättrige Form mit niederlie-	Escallonia virgata. Siehe Neuheiten
genden Zweigen und verhältnismäßig großen, weißen Blüten	
— Dammeri (humifusa) # \(\Delta \) Zweige fest am Boden	Evonymus, Pfaffenhütchen, Celastraceae ○—① # △ — nana (Koopmannii rosmarinifolius) # Mit dünnen
liegend, große runde Blätter. Früchte scharlachrot,	langen Zweigen, lanzettliche dunkelgrüne Blätter,
perlenartig. Besonders wirkungsvolle Art 1.20 — radicans. Siehe Neuheiten 2.—	rosafarbige Samenkapsel
- horizontalis. Bekannte Art mit wagrecht ausgebrei-	— japonica acuta. Siehe Neuheiten
teten Zweigen und roten Früchten im Herbst 1.20	- radicans : # Kriechende, kleinblättrige Stammart . 0.40
— fol. var. Siehe Neuheiten	— fol. var. : # Weißbuntblättrige Abart der vorigen 0.40
— microphylla # Niederliegender Strauch mit kleinen, schmalelliptisch dunkelgrüner Belaubung u. kleinen	- vegeta # Schöner Strauch mit großen saftig-
roten Früchten 1.50	grünen Blättern, 70 cm
cochleata. Siehe Neuheiten	Boden anschmiegend. Bildet prachtvolle Teppiche 0.70
— glacialis (congesta) # Die mit feinen Blättern dichtbelaubten, zierlichen Zweige schmiegen sich	Fuchsia, Winterharte Fuchsie, Oenotheraceae O-1 ^
fest dem Gestein an	VII-X
— — thymifolia # Besonders feinblättrige Art mit	- gracilis, Kleinblumige Fuchsie, Kelch rot, Blumen-
karminroten Früchten	blätter blau
— praecox Hessei. Eine besonders starkwüchsige, groß- blättrige u. großfrüchtige Form der nachgenannten 2.50	— macrostemma. Außerordentlich reichblühende, klein-
— Nan Shan. Rosenrote Blüten, gewellte, runde	blumige Art 0.70
Blättchen, oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün,	- Riccartonii. Etwas robuster wachsend als vorige, mit
rosenrote Früchte	größeren Blüten 0.70



Polygonum Auberti

Cytisus praecox (Elfenbeinginster)



Deutzia discolor floribunda



Phyllodoce empetriformis



Teehybridrose Florex




Mignondahlie



Rosa pimpinellifolia hispida (Edel »Wildrose)

Niedrig bleibende und kriechende 1 St. Felsensträucher (Zwerggehölze) Fortsetzung	Muehlenbeckia, Polsterstrauch, Polygonaceae O- # 1 St. — nana (axillaris). Reizendes Sträuchlein, dichte Polster
Genista, Ginster, Leguminosae ○-∞ △ V-VII — anglica. Dorniger Strauch, gelbe Schmetterlingsblüten 1.—	bildend, rundl. Blätter
- cinerea. Silbergraue behaarte, lanzettliche Blättchen,	— cerifera. Mit glänzenddunkelgrüner Belaub. u. schönen
leuchtend goldgelbe Blüten 2.— — germanica. Stachelige Art mit spitznadelförmiger Be-	Kätzchen von würzigem Wohlgeruch . III-IV 1.50
laubung und gelbe Blumen	Perowskia, Blauraute, Labiatae O-OO A L — abrotanifolia. Siehe Neuheiten 2.—
hispanica. Stacheliger Strauch mit gelben Blumen 1.— horida. Kleiner, sehr dorniger Zwergginster mit gold-	- atriplicifolia. Prächtige, harte Labiate aus Afghanistan.
gelben Blüten 2.—	Silbergraue Belaubung, blaue Blüten in langen
— pilosa. Niederliegende Art mit kleinen Blättchen und gelben Blüten, rasenbildend 0.80	Rispen VII-IX 1.— Philadelphus, Falscher Jasmin, Saxifragaceae O—
— radiata. Sparrig verzweigter, kugeliger Strauch mit	- microphyllus. Zwergiger Strauch mit schmallanzettl.
gelben Blütenköpfen 2.— — sagittalis. Eigentümliche pfeilförmige Blätter, Blüten-	Belaubung und kleinen weißen, starkduftenden Blüten VI-VII 1.20
büschel goldgelb	Polygala, Kreuzblume, Polygalaceae ○-① # △
— tinctoria. Kleinstrauch m. gelben Schmetterlingsblumen 0.80 — angustifolia. Fast pyramidal wachsender Klein-	- chamaebuxus. Sehr zierliches Sträuchlein mit bux-
strauch mit nadelartiger Belaubung u. gelben Blüt. 1.50	ähnlichen Zweigen, braunrote Blüten V-VI 1.5
— fl. pleno. Gefülltblühende Abart der Stammform 1.20 Hedera, Zwergefeu, Araliaceae ○ - ● # △	Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △ ⊥ VI-VIII — Farreri. Strauchige Fingerkrautart mit goldgelben
- helix conglomerata. Mit dichtstehenden gewellten	Blumen
Blättern	- prostrata. Kriechende Art des vorigen 1 fruticosa Beesii. Siehe Neuheiten
Blattwerk. Selten 1.50	— — dahurica. Mit gelblichweißen Blüten 0.7
Helianthemum. Siehe niedere Stauden. Hypericum, Johanniskraut, Guttiferae O- + VII-IX	— Friedrichsenii. Hellgrün belaubt, lichtgelbe Blüten in Massen
- aureum. Feinholziger Strauch mit lanzettlicher, unter-	hiemalis. Robuste Art mit bedeutend größeren
seits silbergrauer Belaubung und gelben Blüten . 1.— - calycinum. Siehe unter niedere Stauden.	Blättern und Blüten als die anderen Arten. Blumen leuchtend gelb
- lysimachioides. Widerstandsfähige Art mit festen	— — Purdomii. Siehe Neuheiten
Zweigen, bedeckt mit goldgelben Blüten. Sehr reichblühend	— Veitchii. Mit schneeweißen Blüten 1
- Moserianum. Goldgelbe Blumen, rote Staubgefäße,	Pyracantha, Feuerdorn, Rosaceae ○ - ● # ⊥ — coccinea. Kleine, lederartige Blätter, weiße Büschel-
reichblühend	blüten, orangerote Beeren im Herbst 1.5
zweigt, goldgelbe Blüten	— praecox. Siehe Neuheiten
Ligustrum, Liguster, Oleaceae O-D #	Ribes, Zierjohannisbeere, Saxifragaceae ○ - ● #
oberseits sattgrüner, unterseits hellgrüner Be-	— alpinum nanum. Zwergstrauch mit dunkelgrünem Laub, gedeiht auch im Schatten
laubung. Kopfartige, weiße Blütenstände 1.50 — Delavayanum # Mit zierlich gebogenen Zweigspitzen	- Gayana. Siehe Neuheiten
und kleiner, ovallanzettlicher Belaubung 1.50	Rubus, Zwergbrombeere, Rosaceae O-O#A
— ionandrum. Siehe Neuheiten	— Fockeanus. Bodenbededendes Sträuchlein mit kleinen. bronzegrünen Blättchen und weißen Blüten 2
dicklichen, lederartigen Blättchen 1.50	Salix, Zwergweide, Salicaceae $\bigcirc \cong \triangle$. III-IV
Lonicera, Heckenkirsche, Caprifoliaceae ○-① # △ v-vI	Bockii. Siehe Neuheiten
- myrtilloides. Hängende Aeste, kleine weißrötliche	zendbraune Zweige und weiße Kätzchen 2.5
Blumen, rote Früchte	 Cottetii. Robuste Kriechweide mit schönen Kätzchen . 1. purpurea nana. Aufrecht wachsendes Sträuchlein mit
förmigen Blättchen und gelblichweißen Blüten 1.50	zierlichen, roten Zweigen und kleinen, weißen
— nitida # Aufrechtwachsender, dicht belaubter Strauch. Myrtenähnliche Blätter oberseits sattgrün, unter-	Kätzchen
seits heller. Blüte rahmweiß. Frucht erbsengroß,	laubung und schönen Kätzchen
purpurblau	— reticulata. Hochgebirgsweide, rundlich genetzte Blätt- chen, kleine niedliche Kätzchen
mit glänz. grüner Belaubung, Beeren violettpurpur 0.80	- refusa. Stark auf dem Boden aufliegende, kriechende
— yunnanensis # Gleicht im Wuchs L. nitida, er- innert jedoch in der Belaubung an L. pileata, ist	Art mit glänzenddunkelgrüner Belaubung 1.5 — simulatrix. Siehe Neuheiten
aber sehr viel härter als beide 0.80	Senecio Greyi. Siehe Neuheiten
— prostrata. Niederliegender Strauch mit lanzettlichen Blättchen und weißen, duftenden Blüten 1.20	Spiraea, Spierstrauch, Rosaceae ○△ ®
- rupicola. Mit überhängenden Zweigen und duftenden,	— bullata crispitolia. Halbkugelige Doldenrispen mit
hellila Blumen	dunkelrosa Blüten, Blätter geschlitzt . VII-VIII 0.3 — decumbens. Nur 15-20 cm hohes, teppichbildendes
rosafarbige Blüten, blaurötliche Beeren 1.—	Sträuchlein mit niedlichem Blattwerk und kleinen,
— syringantha. Aufrechtwachsend mit schmallanzettlicher Belaubung und duftenden rosalila Blumen 1.20	weißen Blütendolden
tibetica. Schlankzweigiger Kleinstrauch mit schmal- lanzettlicher Belaubung und duftenden, violett-	weißlichgelben Blüten
Distance Deladoung and duttenden, violett-	- pumila. Kleines, niedrig bleibendes Sträuchlein mit

Spiraea pumila (Fortsetzung) 1St. 1	Juniperus chinensis (Fortsetzung) 1St.
RM	RM
- Anthony Waterer. Buschiger Kleinstrauch mit	— Pfitzeriana. Aeste wagrecht abstehend. Feine grau-
dunkelkarminroten Blumen 0.60 — trilobata (grossulariaefolia). Ausgebreiteter Zwerg-	grüne Bezweigung Je nach Größe 3.50 bis 10.— — communis hibernica. Schöne schmale Säulen bildend 4.—
strauch mit stachelbeerartiger Belaubung und schnee-	— compressa. Siehe Neuheiten
weißen Blüten in großer Zahl 1.50	- nana. Niederliegende Gebirgsart mit scharfer, grünlich-
- vaccinifolia. Niedriger Strauch mit kleiner, heidelbeer-	grauer Benadelung
artiger Belaubung und rosa Blüten 2.—	— aurea. Goldbunte Form der vorigen 5.—
Teucrium, Gamander, Labiatae () #	— prostrata. Niedergestreckte Art mit blauschimmernder Benadelung. Sehr gut zum Bepflanzen größ. Flächen 2.50
— chamaedrys. Siehe niedere Stauden.	— recurva densa. Dunkelgrüne Zwergform mit kurzen,
— Requienii. Kleines, niedliches Sträuchlein mit zierlich silbergrauer Belaubung und roten Blütchen. Zer-	dichten Zweigen 6.—
riebene Blättchen riechen sehr stark nach Salmiak-	— sabina. Dunkelgrüne, auf dem Boden sich ausbreitende
geist und sind ein gutes Mittel gegen Schnupfen . 1.20	Zweige Je nach Größe 3.50 bis 10.—
Ulex, Stechginster, Leguminosae ○ - ① # ⊥	— tamariscifolia. Dunkelgrüne, tamarixart. Benadel. 3.50 — squamata Mayeri. Siehe Neuheiten 5.—
- europaeus. Dorniggrüner Felsenstrauch, leuchtend	- virginiana tripartita. Niedere Form mit dichtstehenden
gelbe Blüten IV-V 1.—	aufwärts ausgebreiteten Aesten u. kurzen Zweigen 3.50
— Gallii. Aehnlich vorgenannter, besonders stark bedornt 2.—	— — Clanbrassiliana. Ganz gedrungene kurz- u. dicht-
Viburnum, Schneeball, Caprifoliaceae O	bezweigte Form
— Carlesii.Koreanischer Schneeball m.gezähnten Blättern. Die breiten Blütendolden setzen sich aus sehr wohl-	Picea, Zwergfichte, Pinaceae ○ △ #
riechenden Einzelblüten zusammen 3.—	- excelsa compacta. Dichter, rundlicher Wuchs 4.50
- opulus pygmaeum. Zwergschneeball, der nur eine	— echiniformis. Kissenförmige, igelartig benadelt
Höhe von 30 cm erreicht V-VI 2.—	Zwergform
- utile. Chinesischer Schneeball mit ovalen, glänzend-	— Maxwellii. Flachkugelige Varietät mit hellgrüner
grünen unterseits weißfilzigen Blättern und gipfel- ständigen weißen Blütendolden 2.50	Benadelung
ständigen wengen Biutendolden	— — Merkii. Dicht- und breitwachsende Zwergform . 5.—
Niedrig bleibende und kriechende Nadel-	- mucronata. Ausgebreitete oder mehr aufstrebende
	Zweige
gehölze (Zwergkoniferen)	— nidiformis. Kissenbildende Form m. kurzen, fächer-
Chamaecyparis, Scheinzypresse, Pinaceae ○ △ #	förmigen, hellgrünen Zweigen 5
— Fletscheri. Siehe Neuheiten 4.—	parviformis. Sehr gedrungene, breitpyramidale
- Lawsoniana forsteckensis. Vollkommen dicht, breit-	Zwergform
kugelförmig	 — procumbens. Ganz dem Boden anliegende Zweige 5. — pumila glauca. Plattrunde Zwergform mit bläulich-
— Krameri. Breite dichte Kugelform m. dunkelgrüner Benadelung	schimmernder Benadelung 5.—
- minima glauca. Dichte, breitwachsende, dunkel-	- pygmaea. Dichte, kegelförmige Sorte mit hell-
blaugrüne Kugelform	grüner Benadelung 5
— nana compacta. Sehr schöne Zwerg-Kugelform . 6.—	- Remontii. Spitzkegelige Form. Kurze, dicht-
— obtusa albo spicata. Schöne dunkelgrüne Zwergform mit weißen Spitzen 6.—	stehende Zweige
— aurea gracilis. Schöne Form mit beständiger, gold-	form mit kleiner, dunkelgrüner Benadelung 5.—
gelber Belaubung 6.—	— — gracilis. Eine besonders feinnadelige Form der
— Crippsii. Mit blaß- oder goldgelber Färbung 6.—	vorigen
- compacta. Gedrungener, rundlichkegelförmiger	Pinus, Zwergkiefer, Pinaceae ○ △ #
Wuchs und dunkelgrüne Belaubung 6.— — nana. Fächerförmig flachausgebreitete dunkelgrüne	— densiflora pumila. Zweinadelige Zwergkiefer von
Zwergform 6.—	kugeligem Wuchs und dunkelgrüner Benadelung 8
— — aurea. Die fächerförmigen Zweige sind von	— montana. Die bekannte Krummholzkiefer des Hoch-
goldgelber Färbung 8.—	gebirges (Latsche). Niederer, strauchartiger Wuchs. Für den Steingarten unentbehrlich. Aeußerst an-
- pisifera filifera nana. Grüne, dichtbuschige Zwerg-	spruchslos Je nach Größe 2.50 bis 6.
form mit fadenförmigen Zweigen 4.— — nana aureo-variegata. Niedrigbleibende, dichte,	— pumila, echt. Sehr seltene sibirische Zwergkiefer von
goldbunte Kugelform 6.—	kriechendem Wuchs
Cryptomeria, Kryptomerie, Taxodiaceae ○ △ #	Taxus, Eibe, Taxaceae ○-● △ #
- japonica cristata. Monströse Form mit dichtstehenden,	— baccata adpressa variegata. Belaubung goldgelb
pfriemförmigen Nadeln	mit grünen Zweigen
— Lobbii compacta. Dunkelgrüne niedere schmale	— — Dovastoni. Breitwachs., grobnadelig, dunkelgrün 5.— — — aurea variegata. Goldbunte Form mit über-
Säulen	hängenden Seitenästen 5.—
Ephedra, Meerträubel, Gnetaceae O A # Gehören botanisch zu den Koniferen, gleichen aber in ihrem	Die drei vorstehenden Arten eignen sich nur für
schachtelhalmähnlich. Aussehen mehr einem Gehölz.	größere alpine Anlagen.
— Gerardiana. Interessante und seltene Art	— ericoides. Schwachwüchsige Zwergform mit schma-
- fragilis (campylopoda). Schöne, zierliche Sorte 1.50	len, sehr spitzen Nadeln
— helvetica. Schweizer Art	eibe mit dunkelgrüner Benadelung 4.—
— sikkimensis. Vom Himalaja stammend. Selten 1.50	— — — aurea. Sehr schöne goldbunte Form der vorigen 5.—
Juniperus, Wacholder, Cypressaceae ○ △ # — chinensis argentea-variegata. Bildet dichte Kugeln	Thuya, Lebensbaum, Pinaceae ○ △ #
mit weißen Zweigspitzen	— occidentalis Ellwangeriana Rheingold. Locker ge-
— — compacta aurea. Zierlich goldbunte Zweige 4.—	baute Spielart von leuchtend goldgelber Färbung 4.



Haupteingang zur Gärtnerei



Teilansicht der Abteilung Vermehrung und Bürogebäude



Teilansicht unserer Wirtschaftsgebäude



Ausschnitt aus unserer Samenversandabteilung



Pflanzkolonne bei der Arbeit

Schönblühende und dekorative Ziergehölze

Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20-25 Sorten unserer Wahl zu RM 60.-, 25 Stück zum 0/0 Preis

Acer, Ahorn, Aceraceae O ®	C
— campestre O- Korkartige Zweige, schöne Herbst-	-
färbung	C
— ginnala. Zierliche Zweige, feine Belaubung u. schöngefärbte Früchte	_
Botter	1
Amelanchier, Felsenbirne, Rosaceae O-1-0 8	28
— botryapium (canadensis). Hängende Zweige, Blüten groß, weiß, in Trauben V-VI 0.75	C
	-
Amorpha, Bastard-Indigo, Leguminosae ○ ∞ — crispa. Gekrauste Blätter, violettblaue, ährenartige	
Blütenrispen VI-VII 0.75	
	_
Aralia, Araliaceae ○ ⊥ — chinensis mandschurica. Aufrechter, dorniger Stamm,	
große, gefiederte Einzelblätter	
	-
Aronia, Zwergvogelbeere, Rosaceae O @ — arbutifolia. Glänzendgrüne Blätter, weiße Blüten und	
scharlachrote Beeren im Herbst V-VI 0.75	
Berberis, Berberitze, Berberidaceae ○ ® ⊥ V-VI	-
aggregata. Belaubung lebhaftgrün, länglicheiförmig.	
Gelbe Blüten in dichten Trauben	-
- aquifolium. Siehe Mahonia.	
- brevipaniculata. Dichtwachsender Strauch, Zweige	
leuchtend rot, Blumen hellgelb 0.80 — concinna. Strauch mit rotbraunen Zweigen, Belaubung	
oberseits tiefgrün, unterseits stark weißlich. Blüten	-
tiefgelb. Frucht rot 1.50	-
— Dielsiana. Blätter schmalelliptisch mit weißlicher	
Unterseite. Gelbe Blüten	0
 vulgaris. Gemeine Berberitze mit schön. rot. Früchten 0.60 atropurpurea. Beliebter Strauch mit dunkelroter 	-
Belaubung und gelben Blüten 0.75	-
Buddleia, Fliederspeer, Loganiaceae O \(\precedef{D} \)	-
— alternifolia. Siehe Neuheiten	
- variabilis magnifica. Schöner Strauch mit graugrüner	1
Belaub. u. tiefrosapurpurne Blütenrisp. VII-X - Veitchiana, Malvenblaue Blütenrispen VII-X 1.—	-
	-
Calycanthus, Gewürznelke, Calycanthaceae O-1 1 — floridus. Die dunkelbraunen Blüten haben einen star-	-
ken, würzigen Geruch VI-VII 1.50	
Ceanothus, Sommerflieder, Rhamnaceae O L	-
- hybr. azureus grandiflorus. Schöner Zierstrauch mit	(
prächtigen, hellblauen Blütenrispen . VII-VIII 1.50	1
— Marie Simon. Mit rosa Blüten VII-VIII 2.—	1
Colutea, Blasenstrauch, Leguminosae O	
- arborescens. Feingefiederte, lichtgrüne Blätter, gold-	
gelbe Blüten V-VI 0.75	1
Cornus, Hartriegel, Cornaceae O-O 8 . III-VI	1 7
— alba. Holz rotbraun, Blüten weiß, Beeren blauweiß. 0.70	1
— australis. Kräftige, rotbraune Triebe. Herbstfärbung tiefviolettbraun	1
— Baileyi. Aehnlich C. alba m. unterseits wollig behaarten	15
Blättern	1
- brachypoda. Breitelliptische, glänzendgrüne, unter-	1
seits weißgraue Blätter, Blüten rahmweiß 0.80 — flaviramea. Wirkt besonders im Winter durch die hell-	
gelbe Bezweigung sehr zierend 0.80	1
- mas. Blüht goldgelb vor dem Austrieb der Blätter.	-
Rote, kirschenähnliche Früchte 0.80	1
- sanguinea. Mit braunroten Zweigen 0.60	1
— sibirica. Im Winter mit leuchtend feurigmennigeroten Zweigen	1
— Spaethi. Blätter im Austrieb bronzefarben, goldgelb	1
gerandet	1

Sorten unserer Wahl zu HM 60.—, 25 Stuck zum 70 Freis
Coronilla Kronwicke Leguminosae () 1St.
Coronina, Monwicke, Leganinosac
— emerus. Niedriger Strauch mit gefiederten Blättern und lebhaftgelben Doldenblüten V-VII 0.80
Corylus, Hasel, Betulaceae O-D \(\precedef{\pmatrix}\)
— avellana. Gewöhnlicher Haselstrauch . III-IV 0.80
— atropurpurea. Bluthasel. Belaubung und Früchte
braunrot III-IV 1.50
Cotoneaster, Ziermispel, Rosaceae O Ø V-VI
— acutifolia. Glänzendgrüne Belaubung, Blüten rötlich-
weiß, Frucht braunschwarz
— applanata (Dielsiana). Ovale, dunkelgrüne Blätter,
unterseits weißgrau. Glänzendrote Früchte 0.75
— bullata. Schöner Strauch mit blasenförmig aufge- bauschten Blättern, die oberseits glänzendgrün
sind u. unterseits gelblichgrau. Lebhaftrote Früchte 0.75
— Franchefi. Schöner Strauch mit gebogenen Zweigen.
Blätter oberseits sattgrün, unterseits weiß- oder
gelbfilzig. Prachtvolle, orangerote Früchte 1.50
- lactea # Uppig weißblühend u. stark fruchtend. Selten 2
— nitens. Dichte, ausgebreitete Verzweigung, groß., breit-
ovales Blatt, lebhaftgrün. Frucht schwärzlichrot 0.80
— racemiflora (nummularia). Dunkelgrüne Belaubung,
weiße Blüten in gedrängten Doldentrauben. Rote Früchte
— salicifolia floccosa # Lederartige, lebhaftgrüne Be-
laubung, Blätter unterseits weißfilzig. Große, leb-
haftrote Früchte
— Simonsii. Halbimmergrüner Strauch mit lederartiger,
glänzendgrüner Belaubung. Blüten gelblichweiß,
Beeren korallenrot
Crataegus, Dorn, Rosaceae O @ L V-VI
— oxyacantha alba plena. Weiß gefüllte Blüten 1.— — punicea. Blüten einfach, leuchtend dunkelrot 1.—
— — punicea. Bluten einfach, feuchtend dunkenst
— rosea plena. Blüten rosa, gefüllt 1.—
— pyracantha. Siehe Pyracantha (Zwerggehölze).
Cydonia, Japanische Quitte, Rosaceae O @ IV-V
- japonica. Feurigrote Blüten, zitronengelbe Früchte 0.70
— alba. Einfach, weißblühend
— rubra grandiflora. Großblumig, karmoisinrot 1.— — versicolor lutescens. Mit gelblichroten Blüten . 1.—
— Maulei. Niedrigbleibende Art mit zinnoberroten Blüt. 1.—
— Sargenti. Mit feurigroten Blumen. Zwergiger Wuchs 1.—
Cytisus. Siehe unter Felsengehölze.
Daphne. Siehe Moorbeetpflanzen.
Decaisnea, Blauschote, Lardizabalaceae ○ ⊥
- Fargesii. Schöner Strauch mit langen, gesiederten
Blättern u. blaubereift. Zweigen. Blumen grünlich- gelb. Blaugefärbte, hängende Früchte. V-VI 2.—
Desmodium (Lespedeza) Buschklee, Leguminosae O
— penduliflorum. Mit gebogenen Zweigen, dreilappigen
Blättern und prachtvollen, rosaroten Blütenrispen 1.20
Deutzia, Maiblumenstrauch, Saxifragaceae O V-VI
- crenata candidissima. Reichblühender Strauch mit
großen, weißen Blüten 0.70
— eburnea. Zierliche Blütenrispen, herrlich elfen- beinfarbig einfach 0.70
- rosea plena. Blumen gefüllt, rosa 0.70
— discolor floribunda. Schöne, weiße Rispen, außer-
ordentlich reichblühend
— gracilis. Schöner Zwergstrauch mit weißen Blütenrisp. 0.70
— — campanulata. Glockenförmige, milchweiße Blumen 0.70
— multiflora. Die aufrechten Zweige sind ihrer ganzen
Länge nach mit weißen Blumen bedeckt 0.70
 hybr. Welsii. Reinweiß, gefülltblühend 0.70 Lemoinei Boule rose. Blüten aufrecht, rosaweiß, in
einer Dolde vereinigt

Schönblühende 1 St. R.M.	Hydrangea (Fortsetzung)
und dekorative Ziergehölze Fortsetzung Deutzia (Fortsetzung)	— paniculata granditlora. Große, reinweiße, pyramiden-
- parviflora. Dunkelgrüne Belaubung, Blüten weiß 0.70	förmige Rispen
— staminea. Blumen weiß und rosarot 0.70 Diervilla, Weigelie, Caprifoliaceae ○ ⊥ VI-VII	Kerria, Ranunkelstrauch, Rosaceae O- V-VI — japonica. Grünholziger Strauch mit einfachen, großen,
— amabilis. Schöne, große, hellrosa Blumen 0.80	gelben Blüten 0.80
— bitormis. Große dunkelrosa Blüten 0.80	— aurea. Goldbuntblättrige Form
— candida. Sehr schön reinweiß blühend 1.— Eduard André. Dunkelrote Blüten : 1.—	— — plena. Beliebter Blütenstrauch mit dichtgefüllten, goldgelben Blüten
- Eva Rathke. Prächtig leuchtend karmin bis purpurrot 1	Kolkwitzia amabilis. Siehe Neuheiten 2.—
Flour de may. Purpur marmoriert, innen lachsrosa . 1.— Floréal. Blumen zartrosa, Schlund lebhaftkarmin 0.80	Laburnum, Goldregen, Leguminosae O- V-VI
grandiflora Vanhouttei. Blum. rosa mit weiß bordiert 0.80	- alpinum. Belaubung glänzenddunkelgrün. Sehr große.
- hortensis Conquéte. Sehr große, dunkelrosa Blumen 1	goldgelbe Blütenrispen. Blüht später als L. vulgare 1.50
- intermedia. Rosa und weiße Blumen 0.80 - Lowii. Blumen dunkelpurpurrot 1	- vulgare. Gelbe, hängende Blütentrauben in großer Zahl 0.80 Ligustrum, Rainweide, Oleaceae O- VI-VII
- Mad. Lemoine. Hell- und dunkelrosa 0.80	— ovalitolium aureum elegantissimum # Blätter schön
Président Duchartre. Blumen dunkelpurpur 1.—	goldgelb gerändert
— purpurata. Einfarbig, durchscheinend, dunkelrosa . 0.80 Elaeagnus, Ölweide, Elaeagnaceae ○ ⊥	- Regelianum. Breitwachsender und reichblühender Strauch. Weiße Blumen, schwarze Früchte 0.80
— edulis (multiflora). Schöner Strauch mit silberigem	- Vulgare chlorocarpum. Die gelblichgrünen Früchte
Laub und großen roten Beeren V-VI 0.75	sind sehr zierend
Escallonia virgata. Siehe Neuheiten	regelmäßig weiß gerandet
Evonymus, Spindelbaum, Celastraceae O - 1 8 - alata. Buschiger Strauch mit korkflügeligen vier-	— Italicum # Aufrechtwachsende Varietät mit dunkel-
kantigen Zweigen	grüner mittelgroßer Belaubung 0.70 Lonicera, Heckenkirsche, Caprifoliaceae O-0
europaea. Mit korkig geflügelten grünen Aesten.	- chrysantha. Buschiger Strauch mit gelben Blüten und
Samenkapsel rosarot	dunkelroten Beeren V-VI 0.70
Exochorda, Schein-Felsenbirne, Rosaceae O L — grandiflora. Schön belaubter Busch mit großen, weißen	- fragrantissima # Prachtvoller Strauch mit hängenden Zweigen und großer, rundovaler, lederartiger Be-
Blütentrauben IV-V 1.50	laubung. Weiße, wohlriechende Blumen. II-III 1
Fontanesia, Fontanesie, Oleaceae O-D	— Morrowii. Mit überhängenden Aesten, eirundlichen Blättern und weißgelben Blüten.
— phillyraeoides. Schönbelaubter, grünblättrig. Strauch mit traubenartigen Scheindolden von weißer	Beeren blutrot V-VI 0.70
Farbe V-VI 0.80	- Purpusi # Herrlicher Strauch mit lederartiger Be-
Forsythia, Forsythie, Oleaceae O-1 III-IV	laubung und außerordentlich wohlriechenden grün- weißen Blüten
— intermedia. Bekannt. Zierstrauch mit lichtgelben Blüt. 0.70 — primulina. Die hellgelben Blüten stehen sehr dicht	— fafarıca. Schönblühender Strauch mit hellrosa Blüten
gedrängt	und lebhaftroten Früchten V-VI 0.70 — xylosteum. Überhängende Zweige, gelblichweiße
- spectabilis. Schöne, dunkelgoldgelbe Blumen 0.80	Blumen und rote Beeren V-VI 0.70
— suspensa. Die überhängenden Zweige sind dichtbesetzt mit trichterigen, glockigen, hellgelben Blüten 0.70	Magnolia. Siehe Moorbeetpflanzen.
- Fortunei atrocaulis. Schwarzrot austreibende	Mahonia, Fliederberberitze, Berberidaceae O-O#
Triebe, gelbe Blüten	— aquifolia. Bekannter Strauch mit glänzendgrünen, lederatigen gefiederten Blättern und gelben Blüten-
Blüten	trauben. Blaue Früchte
Hamamelis, Zaubernuß, Hamamelidaceaa ○—● Ø ⊥	- Japonica. 30 cm lange, gefiederte, lederartige Blätter,
— japonica. Seltener Zierstrauch mit großen, goldgelben dichtstehenden Blüten mit braunroter Zeichnung,	Malus 7 ierantel Possesso
die den Strauch vollständig überdecken I-III 4	- Eleyi. Der junge Austrieb ist rotpurpurp, die großen
— mollis. Blumen lebhaftgelb u.v.köstl. Duft I-III 4.—	Blüten lebhaftweinrot
Hibiscus, Eibisch, Malvaceae ○ ⊥ VIII-IX — Admiral Dewey. Aufrechtwachsender Strauch und	rot. Zahlreiche karmesin- oder kirschrote Blumen 1 50
malvenartige, weißgefüllte Blüten 1.50	- Niedzweizkyana. Leuchtend braunrote Belaubung
 coelestis. Einfach, blaublühend	Blüten dunkelrosa. Große dunkelrote Früchte 1.50 - Scheideckeri. Zartrosa gefüllte Blüten 1.50
— puniceus plenus. Halbgefüllt, dunkelrosa 1.50	Morus, Maulbeere, Moraceae O
— Rubin. Einfach, dunkelrot	— alba. Weißfrüchtige Art. Lebhaftgrüne Belaubung . 0.70
Hippophae, Sanddorn, Elaeagnaceae ○ ∞ ⊥	Paeonia moutan (arborea), Jap. Baumpaeonia
rhamnoides. Feinblättriger Strauch mit silberglänzen-	Ranunculaceae O \(\preceq\) Blühen 3 Wochen früher als die chines. Pfingstrosen. 150 cm V-VI
der Belaubung und orangefarbenen Beeren im Herbst III-IV 1.—	Gefülltblühende:
Hydrangea, Hortensie, Saxifragaceae O \(\precedet\) VII-IX	- De Bugny, Weiß mit violetten Straifen
- arborescens grandifl. Große, rundliche Belaubung	- Jedine d'Arc. Zartlachs
und reinweiße Blumen in großen Dolden 1.— — macrophylla Domotoii. Siehe Neuheiten 1.50	Normali Liisabelli, Februarosarot
opuloides acuminata. Flache Blütenstände, sterile	— Louise Mouchelet. Silbrigladsrosa
bläuliche Blüten	d'Etienne Méchin Frischross

Paeonia moutan (Fortsetzung) 1 St.	Ribes sanguineum (Fortsetzung) 1 St.
Einfach- u. halbgefüllt blühende Sorten:	— — carneum. Fleischfarbige Blütentrauben 0.75 — — grandiflorum. Großblumige, blutrote Blüten 0.80
— — Dakota, Kirschrosa	Salix, Weide, Salicaceae ○ ≅
— — Kansas. Reinweiß	- caprea. Große, dicke, runde, graue Kätzchen, voll
— New-York, Weiß mit kirschrotem Mittelstern 4.— — Orkus. Schwarzrot 4.—	aufgeblüht goldgelb III-IV 1.—
— Pennsylvania. Ladisrot 4.—	Sambucus, Holunder, Caprifoliaceae O-D-O VI-VII — canadensis maxima. Sehr dekorative Form mit riesig
Philadelphus, Falscher Jasmin, Saxifragaceae O – (1)	großen, breiten, weißen Blütendolden 1.— — nigra. Gemeine, schwarzfrüchtige Art 0.70
— grandiflorus. Große, einfache, reinweiße Blüten,	— — argentea marginata. Weißbuntblättrige Form . 1.—
intensiv duftend	- racemosa. Prachtv. korallenrote Früchte in groß. Zahl 0.75
wohlriechende Blüten	Spiraea, Spierstrauch, Rosaceae O III-V — albiflora. Zierliche, niedr. Art mit weißen Doldenrisp. 0.70
— — Virginal.Außerordentlich große, reinweiße, gefüllte Blüten. Sehr wohlriechend	- arguta. Die zierlichen Zweige sind im zeitigen Frühjahr mit schneeweißen Blüten übedeckt 0.80
— nivalis (coronarius). Bis 6 cm im Durchmesser große, weiße, wohlriechende Blüten 0.70	— japonica macrophylla. Großblättrige, schön rot aus-
- pubescens. Rahmweiße, sehr wohlriechende, glockige	treibende Form mit roten Blüten 0.70 — Menziesii alba Douglasii. Große, kegelförmige Ris-
Blüten	pen, besetzt mit fleischfarbigen Blüten 0.70
messer haltende, geruchlose, weiße Blüten 0.70	— pseudo-Douglasii. Schmallanzettliche Belaubung, Blüten purpurrosa
— Zeyheri. Großblättrige und großblumige, duftende Art. Weiße Blüten	— prunifolia plena. Große, weiße, gefüllte Blüten an
Physocarpus, Blasenspiere, Rosaceae O-O	eleganten Zweigen
intermedius parvifolius. Dichtverzweigter Strauch mit kleinen Blättern und rosa Blüten. VI-VII 0.70	Frühjahr mit weißen Blüten schmücken 0.80 — Vanhouttei. Hübscher Strauch m. schneeweißen Blüt. 0.70
Potentilla. Siehe unter Zwerggehölze	- Veitchii. Sehr große Dolden reinweißer Blumen 0.80
Prunus, Zierpflaume, Rosaceae ○ ⊥ IV-V	Symphoricarpus, Schneebeere, Caprifoliaceae
— japonica alba plena (sinensis alba pl.). Feinzweigiges Sträuchlein mit weißen, gefüllten Blumen . 1.50	O-O-O VI-VII — acutus. Schönbelaubter Strauch mit hellroten Blüten
— rosea plena. Mit rosa gefüllten Blumen 1.50	und äußerst zahlreichen weißen Beeren 0.70 — Giraldii. Zierlicher Wuchs, Austrieb rötlich. Beeren
 Pissardi. Dunkelrote Belaubung und weißer Blütenflor 1.50 Moseri pl. Mit großen, rosagefüllten Blumen 1.50 	klein, dunkelrot
— nigra. Mit schwarzpurpurroter Belaubung und violetten Blüten	— racemosus. Bekannter Strauch mit zierenden weißen Früchten
— Purpusi. Die dunkelroten Blätter sind gelb und	Syringa, Flieder, Oleaceae ○ ⊥ V-VI
rosa marmoriert	- persica. Sparrigwachsender Strauch mit feiner Be-
glänzendunkelgrüne Blätt. u. weiße Traubenblüten 0.70	laubung und lockeren, lilarosa Blütenrispen 1.50 — vulgaris Andenken an L. Späth. Einfach, dunkel-
— triloba plena. Bekanntes, rosa gefülltblühendes Mandelbäumchen Sträucher 1.50	purpur
Halbstämmchen 2.50	— — Charles Joly. Gefüllt, dunkelpurpur 2.50
Prunus serrulata, Japanische Zierkirsche, Rosaceae	— Congo. Einfach, dunkelrot
Büsche 2.—, Halbstämme 4.—, Hochstämme 6.—	— Leon Gambetta. Gefüllt, zarthellblau 2.50 — Mad. Lemoine. Gefüllt, weiß
— Hisakura. Sehr große, rosagefüllte Blüten in zier- lich hängenden Büscheln.	— — Marie Legraye. Einfach, weiß 2.—
 — James H. Veitch. Rosarote starkgefüllte Blumen. — Shidare Sakura. Große, rosagefüllte Blumen, 	— Michel Buchner. Gefüllt, blaßlila 2.50 — Président Grevy. Gefüllt, lilablau 2.50
womit die stark hängenden Zweige völlig über-	Tamarix, Tamariske, Tamaricaceae ○ ⊥ . VI-VII
deckt sind. — — Shirofugen. Zartrosa einfache Blüten.	— gallica indica. Graziose Belaubung u. rosa Blüten . 1.—
— Ukon. Halbgefüllte, große, grünlichweiße Blumen.	— germanica. Blaugrüne Belaubung, blaßrosa Blüten . 1.— — tetrandra. Lebhafthellgrüne Belaubung u. rosa Blüten 1.—
Ptelea, Lederblume, Rutaceae O — trifoliata. Aufrechtwachsend. Strauch m. dreilappischen	Viburnum, Schneeball, Caprifoliaceae ○-① Ø ⊥ V-VI
Blättern VI-VII 0.70	— lantana. Große, graugrüne Belaubung, weiße Blüten- dolden und korallenrote Beeren
Rhus, Perückenstrauch, Anacardiaceae O-® 1 — cotinus. Hübsch belaubter Strauch mit federartigen	- opulus sterile. Allgemein beliebter und bekannter
Fruchtständen im Hochsommer 1.50	Zierstrauch mit weißen, kugeligen Blütendolden 0.80 — rhytidophyllum # 20-30 cm lange, breitlanzettliche
— typhina. Mit 50 cm langen, gesiederten Blättern, die sich im Herbst leuchtend rot färben 1.—	Blätter, oberseits dunkelgrün, unterseits bräunlich-
— — laciniata. Starkgeschlitzte Belaubung 2.50	filzig. Blüten gelblichweiß, Beeren rotbraun bis schwarz
Ribes, Zierjohannisbeere, Saxifragaceae O Ø IV-V — alpinum • Kleiner Strauch mit glänzendgrüner Be-	tomentosum (plicatum). Gelblichgrüne, glänzende
laubung	Belaubung und große, weiße Kugelblüten 1.50 — venosum. Schmaleiförmige, grobgezähnte Blätter.
— floridum. Reichblühend, gelblichweiße Trauben 0.80 — Gordonianum. Lange, orangefarbene Blütentrauben 0.80	Weiße Blütendolden und schwarze Früchte 0.80
sanguineum Blitentrauben blutrot 0.75	— Siehe auch Zwerggehölze.

Koniferen (Nadelhölzer)	Preis per 1 St.
Für hier nicht aufgeführte Sorten u. Größen Preise auf Anfrage.	Allee- und Zierbäume 8-10-12 cm Stammumfang
Preis- klasse 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175	Acer dasycarpum. Silberahorn
1 1.80 2.40 3.— 3.60 4.80 2 2.— 3.— 3.60 4.80 6.—	— platanoides. Spitzahorn
3 2.40 3.60 4.80 6.— 8.—	— Schwedierl. Rotblättriger Ahorn
4 3.60 5.— 6.— 9.— 12.— 5 4.— 6.— 9.— 12.— 14.—	— pseudoplatanus. Bergahorn
6 4.80 7.— 10.— 14.— 16.—	Aesculus hippocastanum. Weißbl. Roßkastanie
8. 8.— 10.— 12.— 15.— 18.—	Allanthus glandulosa. Götterbaum
Abies balsamea. Balsamtanne	Alnus glutinosa. Schwarzerle
— prachyphylla. Nikkotanne . 6-7	Betula alba verrucosa. Weißbirke mit Ballen 4-5-
— concolor. Kaliforn. Weißtanne	— atropurpurea. Blutbirke mit Ballen 6-8.— Castanea vesca. Edelkastanie
- Nordmanniana. Nordmannstanne	Crafaegus monogyna fl. pl. Gefülltblüh, Rotdorn 5-6.
- Velichii. Japanische Weißtanne 5-6	Fagus silvatica purpurea. Blutbuche mit Ballen 8-10 – Fraxinus exelsior. Gemeine Esche
Cedrus aflantica. Atlas-Zeder	Laburnum vulgare. Gemeiner Goldregen 4-5.— Platanus occidentalis. Amerikanische Platane 6-8.— Populus kalannifere Platane
— deodara. Himalaja-Zeder 6-7	Populus balsamifera. Balsampappel
Chamaecyparis, Schein-Zypresse — Lawsoniana. Hellgrün, pyramidal 2-3	— nigra pyramidalis. Pyramidenpappel
— — Alumii. Stahlblaue Nadeln	Quercus palustris. Sumpfeiche 6-8 - pedunculata. Deutsche Eiche 6-8.
— erecta viridis. Frischgrün	—— Tastiqiata. Pyramideneiche mit Ballen 6-8—
— Silver Queen. Silbrigschimmernd	— rubra. Amerikanische Roteiche
Turkdensis, Blaugrun	— Inermis. Rugelakazie
— glauca. Blaugrün, überhängend	Sorbus aucuparia. Gemeine Eberesche 4-5.— — moravica. Süßfrüchtige Eberesche 5-6.—
— aurea. Goldgelbe Varietät	Tilia grandiflora. Großblättrige Linde
— — plumosa. Gedrungene Form	— parvifolia Kleinblättrige Steinlinde
— squarrosa. Silbergrau	— tomentosa. Ungarische Silberlinde
Juniperus, Wacholder — virginiana glauca. Blaugrün	— montana. Bergulme
— Schotti. Frischgrün	Hängebäume
Larix europaea. Gemeine Lärche	Betula pendula Youngi. Hängebirke mit Ballen 8-10-
— leptolepis. Japanische Lärche 2-3	— purpurea pendula. Hängeblutbuche m. Ball. 12-15—
Picea alba. Weißsichte	Fraxinus excelsior pendula. Hängeesche 6–8.– Salix alba vittelina pendula. Hängeweide 5–6.–
— omorica. Schlanke Säulen bildend	Ulmus montana pendula. Hängeulme 6-8
— pungens. Graugrün	Heckengehölze (ab 25 Stück % Preis) 100 St.
- Siehe auch Zwergkoniferen.	Carpinus betulus. Hainbuche . 80–100 cm hoch . 80.— 100–125 cm hoch 100 St. 100.— 125–150 " " . 140.—
Pinus cembra. Zirbelkiefer	Crafaegus oxyacanina. Weikdorn 40-60
- strobus. Weymouthskiefer	Liguster ovalifolium. Immergriin. Ligust 60-80 cm hod. 30
Pseudotsuga Douglasii. Douglasfichte 2-3	80-100 cm hoch 100 Stück 40.— 100-120 " " 50.— vulg. atrovirens. Immergrün . 40-60 cm hoch . 30.—
Taxus, Eibe — baccata. Glänzenddunkelgrüne Nadeln 6-7	50-80 cm hoch 100 Stuck 40.— 80-100 50—
— tastigiata. Siehe Zwergkoniferen.	Taxus baccata 50–60 " 250.— 70–80 cm hoch 100 St. 350.— 90–100 "
Thuja, Lebensbaum — gigantea. Riesen-Lebensbaum	125-150 cm hoch 100 St. 225.— 150-175 " " 180.—
— occidentalis. Abendländ. Lebensbaum 1-2 — Columna. Schlanke Säulen 2-3	Things (10 Phanzen per ltd. Meter) pro lfd. m 1.—
— — Ellwangeriana. Gedrungene Pyramide 2-3	Bux — Büsche 30-40 cm hoch 1.50 40-50 cm hoch 2.—
— Hoveyi. Eirundlicher Wuchs	D 30-60 " " 3 60-70 " " 4
— — lutea. Gelbe Belaubung	- Nugeln 25-30 3 - 35 40 "
Tsuga canadensis. Helmlockstanne	— Bienenkorbf. 30–40 " " 3.— 50–60 " " 5.— Für hier nicht aufgeführte Sorten u. Größen Preis auf Anfrage.
	die Großen Freis auf Anfrage.

Winterharte Schlinggewächse 1St. R.M.	Humulus, Goldhopfen, Moraceae O S.M. — lupulus aureus. Mit großen goldgelben Blättern 1.—
Topf-Schlingpflanzen können das ganze Jahr hindurch von uns bezogen und gepflanzt werden.	Jasminum, Jasmin, Oleaceae O-0
Actinidia, Strahlengriffel, Dilleniaceae O — arguta. Schlingende u. nichtschlingende Triebe, weiße	 Beesianum. Bel. ellipt., Blüt. leucht. blutrot V-VI nudiflorum. Sehr reichblühend, goldgelb. I-III officinale. Weißbl., sehr groß, wohlriech. VII-VIII 1.50
Blüten. Schöne Blattfärbung V-VI 2.— Akebia, Akebie, Lardizabalaceae O—	— stephanense. Schöner, kleinblättriger Schlinger mit rosaroten, wohlriech. Blüt. i.groß. Büsch. VII-VIII 2.—
— quinata. Bis 4 m hoch, dunkelgrüne Blätter. Schöne violette Blütentraube V-VI 2.—	Lonicera, Geißblatt, Caprifoliaceae O- Gedeiht in jedem Boden. Köstlich duftend VI-VIII
Ampelopsis. Siehe Parthenocissus. Aristolochia, Pfeifenstrauch, Aristolochiaceae O-	— alseuosmoides # Lederartige Blätter, Blüten purpur mit gelb
— macrophylla (Sipho). Bildet mit sein. riesigen Blatt- werk einen smaragdgrünen dicht. Vorh. V-VI 2.50	— caprifolium major. Schöne gelbe und rötliche Blüten 2.— — fuchsjoides (Brownii). Fuchsienart. leucht. rote Blüten 2.—
Campsis (Bignonia), Trompetenstrauch, Bignoniaceae O	— Heckrottii. Siehe Neuheiten
— radicans. Trompetenblütige Schlingpflanze m. orange- gelben Blumen VI-VII 2.—	Blüten gelbrot
- grandiflora. Besond. großbl., orangerot VI-VII 2.50	— periclymenum. Blüte gelblich
Celastrus, Baumwürger, Celastraceae O— orbiculata. Stark und hoch schlingend mit rundlichen,	- sinensis # Mit rötlicher Belaubung, hellgelbe Blüten . 2.— - Tellmanniana. Siehe Neuheiten
freudiggrünen Blättern und zierenden Früchten . 1.50 - scandens. Längliche, dunkelgrüne Blätter u. korallenrote Früchte	— tragophylla. Mit schön hellgoldgelben, 6 cm langen, außen leicht gestreiften Blumen. Selten 3.—
Clematis, Waldrebe, Ranunculaceae. Zur Pflanzung	Menispermum, Amerikan. Mondsame, Menispermaceae
hebe man eine 50 cm tiefe Grube aus, in die man zunächst eine Schicht Schlacken, geschlagene Steine	— canadense. Mit lapp.dunkelgr. Blätt. u.grünweiß. Risp. 1.20
oder dergl. bringt. Darauf fülle man gute Komposterde, am besten mit etw. kalkig. Bauschutt VI-IX	Parthenocissus (Ampelopsis), Vitaceae O ® — Engelmannii. Zierlich belaubter Selbstklimmer mit
Großblumige Hybriden: O — Comtess of Lovelace. Blaulila 2.—	schöner roter Herbstfärbung 0.80 — quinquefolia. Gewöhnlicher wilder Wein 0.60
- Henryi, Seidigweiß, starkwachsend 2	— radicantissima (muralis). Starkwachsender selbst- klimmernder wilder Wein, mit braunr. Herbstfärb. 0.80
— Jackmannii superba. Dunkelblau, sehr großblumig . 2.— Lady Betty Balfour. Dunkelblau mit weißer Mitte 2.—	— tricuspidata var. Lowii. Siehe Neuheiten 2.—
— lanuginosa. Lavendelblau, sehr großblumig 2.— Lasurstern. Reintiefblau, Staubfäden weiß 2.—	— Veitchii (Efeublättriger selbstklimmender japan. Wein). Die Blätter liegen fest übereinander, so
— Marcel Moser. Malvenfarb. mit dunkelviolettr. Rande 2.— — Mme. Baron Vaillard. Rosalila	daß die Wände vollständig bedeckt sind. Im Herbst blutrot sich färbend
— Mad. Edouard Andrée. Dunkelrot 2.— — The President. Purpurblau	— purpurea inconstans Dippel. Kleinbl., purpurrot 1.20 — Gloire de Boskoop. Starkwüchs. Art mit prächtig
— Ville de Lyon. Herrlichrot	dunkelpurpurner Belaubung 1.20
— viticella. Abendstern. Samt. weinrot m. cremeweißen Staubfäden	Periploca, Griechische Baumschlinge, Asclepiadaceae O-D
Verschiedene Arten: ○─● — alpina. Bildet nur 1 m lange Ranken u. eignet sich sehr	— graeca. Blätter glänzenddunkelgrün, bis 10 cm lang, braunrote wohlriechende Blüten VII-VIII 3.—
gut zum Überranken von Felsen usw. Sehr schöne violettblaue Blüten IV-V 2.50	Polygonum, Schlingknöterich, Polygonaceae O-D - Auberti. Sehr schnellwachsend und gut belaubt, mit
— montana rubens. Rote Blüten bis zu 8 cm Durch- messer, starkwachsend V-VI 2.—	langen weißen Rispen. Außerordentl. reichblühend, rankt windenartig ohne Nachhife VII-X 1.20
— grandiflora. Große, weiße Blumen . V-VI 2.— — orientalis.Goldgelbe,glänz.wachsart.Blum. VIII-IX 2.—	- baldschuanicum. Aehnlich der vorigen, jedoch mit
— paniculata. Sehr reichbl., weiß, wohlriech. VIII-X 2.— tangutica. Mit gesiedertem Blattwerk und gelben	rosaweißen Blütenrispen VII-IX 2.— — multiflorum. Mit samtart. Bel. u. weiß. Blüt. VIII-IX 1.50
Blumen VIII-IX 2.—	Rubus, Brombeere, Rosaceae O—D — Henryi. Blätter drei- bis fünffach gefingert, oberseits
— vitalba. Hochrankend, grünlichweiß blühend, zottige Samenstände VII-VIII 2.—	dunkelgrün, unterseits weißfilzig. Beeren schwarz 2.
— viticella. Kleinblumig, blaublühend VI-VIII 2.— Glycine. Siehe Wistaria.	 fruticosus laciniatus. Geschlitztblättr. Beeren schwarz 1. Theodor Reimers. Siehe Obst.
Hedera, Efeu, Araliaceae → → # — colchica. Mit riesigem, rundlichem Blattwerk, sehr	Wistaria (Glycine), Traubenwinde, Leguminosae
starkwüchsig	Gehören unstreitig zu unseren schönsten und edelsten Schlinggehölzen. Bei sonnigem Standort
— helix. Kleinblättrige Art	entwickeln sie im Mai ihren duftenden Blütenflor, dem im Nachsommer ein zweiter folgt. V-VI
- digitata sagittata. Besonders kleinblättrige Art, tief eingeschnittene Blätter m. silbrigen Blattnerven 1.50	dibu. Wellbrunena
— hibernica. Großblättrige dunkelgrüne Art 0.80 — marmorata. Weißmarmorierte Belaubung 1.50	— multijuga. Sehr lange hellblaue Blütentrauben . 4.—
— — microphylla alba. Kleine weißbuntbl. Belaubung 1.50	

Rosen

Aus den verschiedenen Klassen führen wir nur die aller	besten, ältes
reren und die bewährtesten neuen Sorten auf, die sich d	urch Schons
heit, dankbares Blühen, Gesundheit und Widerstandsfäl	higkeit aus
zeichnen Beim Pflanzen schneide man die Triebe u	
Länge zurück. Pflanzweite der Buschrosen im Mittel	40 cm.

Sämtliche Preise verstehen sich für Pflanzen I. Wahl. Von sämtlichen Sorten sind Stammrosen lieferbar. Es kosten: Trauerrosen und Niel, 150-180 cm Stammhöhe 3.50 Polyantha-Rosen. Vielblumige Zwergrosen. Aennchen Müller. Leuchtend korallenrosa, mäßig gefüllt . 0.50 Dr. Kater. Tiefsamtigdunkelrot 0.50 Ellen Poulsen. Leuchtend kirschrot, gefüllt 0.60 Else Poulsen. Leuchtend rosa, groß, schalenförmig . . . 0.60 Eva Teschendorff. Reinweiß, in großen Dolden blühend . 0.60 Frau Astrid Späth. Leuchtend korallenrosa 0.70 Frau Marie Bromme. Leuchtend rot 0.60 Gloria Mundi. Feurigorange, sehr große Dolden . . . 0.70 Gruß an Aachen. Goldgelb bis weiß, rötl. schattiert, gefüllt 0.60 Joseph Guy. Leuchtend scharlachrot, sehr gute Sorte . . 0.60 Kirsten Poulsen. Feurigpurpurrot, einfachblüh., großblum. 0.60 Locarno. Zinnoberorangerot mit dunkelrot 0.60 Orléans. Geraniumrot, Mitte weiß, großdoldig . . . 0.50 Rodhätte. Leuchtend rot, halbgefüllt, großdoldig . . . 0.50 Schlingrosen. Reichblühend und Meltaufrei. Alberic Barbier. Milchweiß, Mitte gelb, gefüllt . American Pillar. Reinrosenrot mit weißer Mitte, einfach . 0.75 Dorothy Perkins. Kirschrosa, gefüllt, sehr reichblühend . 0.75 Excelsa. Leuchtend dunkelblutrot, gefüllt, großdoldig . . 0.75 Fragezeichen. Sattrosa, gefüllt, großblumig u. großdoldig 0.75 Fräulein Octavia Hesse. Gelblichweiß, großblumig . . . 0.75 Goldfinsh. Hellgelbe Tausendschön 0.75 Lady Gay. Kirschrosa, großdoldig 0.75 New Dawn. Edelrosenähnlich, zartrosa, langblühend . . 1.— Pauls Scarlet Climber. Feurigscharlachrot, halbgefüllt . 1.— Purpurtraum. Dunkelpurpur, halbgefüllt, großdoldig . . 1.— White Dorothy. Weiß, gefüllt, großdoldig 0.75 Edel-Wildrosen. Einwinterung nicht erforderlich. centifolia muscosa. Moosrose. Kräftig rosa 0.70 Rose des Peintres. Moosrose. Großblumig, rosa . . . 0.70 Giraldii. Rosarot. Große, lange Früchte 1.lutea bicolor. Außen gelb, innen kapuzinerrot. Einfach . 1 .-microphylla. Weiße, einf. Blumen, große stachel. Früchte 1.-Moyesii. Einfach, dunkelrot. Sehr schön 1.20 pimpinellifolia hispida. Rahmweiß mit gelben Staubfäden 0.80 rubiginosa. Schottische Zaunrose. Hellrosa. Gut f. Hecken 0.50 — Anne of Gierstein. Dunkelkarmoisin 0.70 — Lady Penzance. Einfach, kupfriggelb 0.70 Lord Penzance. Rehfarbig mit goldgelben Staubfäden 0.70 rugosa. Einfache, rote Blüten, große Früchte 0.50 Bergers Erfolg. Einfach, leuchtend rot. Reichblühend 0.80 Blanche double de Coubert. Reinweiß, halbgef., duft. 0.70 Carmen. Dunkelblutrot, einfach, reichblühend . . . 0.70 Conrad Ferd. Meyer. Centifolienrosa, gefüllt . . 0.70 Georges Cain. Amarantrot, gefüllt, stark duftend . . 0.70 Kaiserin des Nordens. Violettpurpur, gefüllt, duftend 0.70 Mme. Georges Bruant. Weiß, gefüllt, duftend . . . 0.70 Parfum de l'Hay. Karminkirschrot, gefüllt . . . 0.80 Roseraie de l'Hay. Dunkelrot, gefüllt, duftend . Schneelicht. Reinweiß, einfach, reichblühend 0.70 sericea pteracantha. Reinweiß. Große, breite, rote Stacheln 1.-Webbiana. Einfache rosa Blüten in großen Büscheln . . 0.80 Willmottiae. Weiß. Silbergrau berindet. Zierliche Belaub. 1 .-

Buschrosen

buschrosen	
Eine Auswahl der schönsten und dankbarsten Sort	en
für Gruppen und Schnitt.	1 St.
tur Oruppen and Sammi.	RM
Ambassador. Kräftigorange. Neu	
Amulett. Mittelgroß, leuchtend dunkelrot, gut gefüllt. Neu	0.70
Angéle Pernet. Rötlichorange, chromgelb schattiert	0.50
Barcelona. Außen karminrot, innen samtigdunkelrot. Neu	0.70
Comtesse Vandal. Kupferrot bis rosa. Sehr große Blum. Neu	0.70
Dame Edith Helen Laughtend reinness School of C"114	0.10
Dame Edith Helen. Leuchtend reinrosa. Sehr stark gefüllt	0.50
Eduard Schill, Ziegelbraunrot. Gut gefüllt, wetterfest. Neu	0.70
Etoile de Holland. Große, dunkelrote Blumen. Reichblüh.	0.50
Fascination. Kirschrot, gelb schattiert. Dauerblüher	0.60
Florex. Salmfarbigkorallenrot, karminorange schattiert .	0.60
Fontanelle. Gelb mit dunklerer Mitte. Schön geformt	0.60
Frau Karl Druschki. Reinweiß. Großblumig	0.50
Frau Luise Lindecke. Kirschrot bis dunkelrot	0.60
Gaiety. Zinnoberorange in altrosa übergehend. Reichblüh.	0.60
Geheimrat Duisberg. Reinzitronengelb, groß und edel. Neu	0.70
Golden Emblem. Sonnengelb mit scharlachkarmin Streifen	0.50
Grenoble. Glänzendscharlachrot. Großblumig, gut geformt.	0.50
Neu	0.70
Hadley Rose. Dunkelscharlachrot, schwarz schattiert	0.10
Heinrich Wendland Lought gold-il.	0.50
Heinrich Wendland. Leucht. goldgelb, innen kapuzinerrot	0.70
Hinrich Gaede. Kupferrot m. orangegelb. Dichtgefüllt. Neu	0.70
Hermann Neuhoff. Dunkelrot	0.60
Johanna Hill. Reingelb mit dunkler Mitte	0.60
Johanniszauber. Dunkelsamtrot. Gut gefüllt	0.50
John Henry. Glanzendrosa. Edle Form	0.50
Julien Potin. Chromgelb, gut gefüllt	0.50
Konigin Luise. Reinweiß. Gut gefüllt	0.60
Laurent Carle. Großblumig, glänzenscharlachkarmin	0.50
Lord Charlemont. Leuchtend kirschrot. Gut geformt	0.50
Los Angeles, Glänzendrosigfeuerrot, goldgelb schattiert	0.50
Lilly Jung, Großblumig, tiefgoldgelb	0.60
Mabel Morse, Großblumig, reingelb	0.50
	0.50
Mad. Caroline Testout. Fleischfarbigrosa, gut gefüllt	0.50
Mad Edouard Harriot Knohland it all C.	0.50
Mad. Edouard Herriot. Krabbenrot mit gelbem Grund . Mad. Jules Bouché. Weiß, Mitte hellrosa, gut gefüllt	0.50
Margia Start and W. C	0.50
Marcia Stanhope. Weiß, gute Form	0.50
Maréchal Lyauty. Glänzenddunkelrot, groß, edle Form. Neu	0.70
Mälar Rose. Leuchtend scharlachrot. Gut duftend. Neu	0.70
Margret Mc. Gredy. Orangescharlach, sehr große Blumen	0.60
Mary Hart. Samtigblutrot, elegante Form. Neu	0.70
Max Krause. Rothchorange, gut gefüllt	0.50
Mevrouw G. A. van Rossem. Dunkelorangegelb mit apri-	
kosentarben	0.50
Mrs. Charles Russel. Karminrosarot	0.50
Mrs. Henry Morse. Glanzendrosa mit roter Schattierung	0.50
Mrs. Henry Winnet. Gut gefüllt, leuchtend scharlachrot	0.50
Ophelia. Lachsfleischfarbig mit rosa	0.50
Pink Pearl. Lebhaftrosa bis rot auf gelblichem Grund	0.50
Pius XI. Rahmweiß, großblütig, gut gefüllt	0.50
Portadown. Karmesinrot mit Purpurschein. Prachtvoll	0.50
Président Herbert Hoover Orangeness L. 1 C	0.60
Président Herbert Hoover. Orangerosa bis kupferrot. Neu	0.70
Prinz Felix v. Luxembourg. Samtigpurpur. Großblum. Neu	0.70
Rapture. Korallenfarbig mit rosagelb untermischt	0.60
Rev. Page Roberts. Goldorange, reichblühend	0.50
Roselandia. Großblumig, goldgelb, gut duftend	0.50
Roslyn, Reingoldgelb, Sehr gesund, Neu	070
Schator, Glanzendscharlachrot, gut duttend	050
Souvenir de Claudius Fernet. Goldgelb edle Form	OFO
Douvelli de II.A. verschillen Urangegelb Clivi	0.50
Dunkist. Leunantkupirigorange Nan	0.70
	060
retranden. Orangerosa, benr our, Nen	0 =0
Ville de Paris. Goldgelb, sehr großblumig.	0.70
W. E. Chaplin. Dunkelkarmesinrot, großblumig	0.50
Westfield Star. Atlasweiß his sales C.1. II	0.60
Westfield Star. Atlasweiß bis schwefelgelb Wilhelm Breeder, Bräuplichedragell	0.50
vi inchi Dicedei. Diaumichockergelb, orangeret and 11/	070
Wilhelm Kordes. Kapuzinerrot auf goldgelbem Grund .	0.50

Obst

Fruchtgehölze — Beerenobst — Rhabarber

Unsere sämtlichen Obstgehölze sind vorzüglich bewurzelt und wachsen daher überall leicht an. Zum Versand gelangen nur Pflanzen I. Güteklasse.

Aepfel und Birnen		1 St. RM
Hochstämme, 7-8 cm Umfang		2.20
Halbstämme, 6-7 " "		. 2.—
Büsche 2-3 jährig		. 2.—
" 3-4 "		. 2.50
Pyramiden mit 1 Serie		. 2.50
, 2 ,		. 3.50
Spaliere mit 1 Etage		. 2.50
, , 2 ,		. 3.50
U-Formen 2-3 jährig		. 2.50
" 3-4 "		. 3.—
Schnurbäume, senkr. 2-3 jähr.		. 2.—
, 3-4 ,		. 2.50
, waagr. 2-3 , 1	arm	. 2.—
	"	2.50
, 2-3 , 2	10	2.50
, 3-4 , 2	33	3.—

Aepfel

Im Sommer reifende Sorten: Charlamowsky. Leuchtend rot Weißer Klarapfel. Hellgelb mittelgroß

Im Herbst reifende Sorten: Apfel aus Croncels. Hellgrün, groß Gravensteiner. Gelb, rot gestreift Jakob Lebel, Gelblichgrün

Im Winter reifend:

Gelber Bellefleur. Reingelb, fein Kalvill, Adersleber. Gelbe gerippte Frucht Ontario. Große gerötete Frucht Prinzenapfel. Grüngelb, groß

Renette, Ananas. Goldgelb, mittelgroß

— Baumanns. Dunkelrot, mittelgroß

— Champagner. Wachsgelb, mittelgroß

— Cox Orange. Mittelgroß, vorzüglich

— Cox Orange. Mittelgroß, vorzüglich — Gold- v. Blenheim. Goldgelb mit rot — graue französische. Mittelgroß, grau — Harberts. Hellgelb, rot gestreift

Landsberger. Gelb, leicht gerötet
 von Zuccalmaglio. Hellgelb

Schöner von Boskoop. Goldgelb mit rot Winter-Goldparmäne.Goldgelb,rot gestr. Winter-Rambour. Karmoisinüberzogen

Birnen

Im Sommer reifende Sorten: Bunte Juli. Sehr fein Clapps Liebling. Gelb, sonnenwärts rot Frühe aus Trevoux. Gelb, groß, würzig Williams Christbirne. Hellgelb, groß

Im Herbstreifende Sorten: Alexander Lucas. Gelb, rostig punktiert Boscs Flaschenbirne. Groß, goldart. berost. Gellerts Butterbirne. Grünlichgelb Köstliche v. Charneu. Grünlichgelb, mittel Mollebusch. Gute Tafelsorte Vereins-Dechantsbirne. Hellgelb, rotback. Im Winterreifende Sorten:

Clairgeaus Butterbirne. Feine Frucht Comtesse de Paris. Grünlichgelb, punkt. Josephine v. Mecheln. Mittelgroß, für rauhe Lage

Esperens Bergamotte. Gelblichgrün, süß Madame Verté. Mittelgroß, gelb Präsident Drouard. Groß, gelb, fein punkt.

Kirschen, Pflaumen u. Zwetschen	St.
Hochstämme, 7-8 cm Umfang 2.	20
Halbstämme, 6-7 cm Umfang 2.	
Büsche 2-3 jährig 2.	
Spaliere 1 Etage 2.	
Spaliere 2 Etagen 2.	50
Pfirsiche und Aprikosen	
Hochstämme 4.	
Halbstämme	
Büsche, veredelt 2.	
Spaliere	
Walnüsse und Quitten	
Hochstämme	50
Büsche 2.	

Kirschen Süßkirschen:

Bernhard Nette. Schwarz, festfleischig Dönissens Gelbe. Vorzügl. Einmachfr. Große schwarze Knorpelk. Schwarzbr. Große Prinzessink. Gelb m. rot, herzförm.

Hedelfinger Riesen. Schwarzrot, herzf. Kassins Frühe. Schwarzrot, reichtrag. Rotterts Braune. Gute Frühsorte

Sauerkirschen:

Königin Hortensia. Groß, glänzendrot Große lange Loth. Leuchtend dunkelrot Ludwigs Frühe. Hellrot

Pflaumen

Anna Späth. Groß. rötlichblau, früh Frühe Fruchtbare. Sehr früh, blau Königin Viktoria. Violettrot, sehr groß Ontario. Sehr groß, goldgelb Washington. Groß, gelb, saftreich

Zwetschen

Bühler Frühzw. Dunkelblau, mittelgroß Hauszwetsche. Groß, schwarzblau Ruth Gerstetter. Tief blau, sehr früh Lützelsachsener Frühzw. Blau, mittelgr. Wangenheims Frühzwetsche.

Mittelgroß, schwarzblau

Mirabellen (Preis wie Pflaumen) Flotows frühe Mirabelle. Leuchtend gelb Metzer Mirabelle. Klein, gelb Mirabelle von Nancy. Mittelgroß, gelb

Reineclauden (Preis wie Pflaumen) Große grüne Reineclaude. Sehr süß Von Oullins. Groß, gelb

Pfirsiche

Amsden. Früh, groß, weißlichgelb Eiserner Kanzler. Mittelfrüh, sehr gut Königin der Obstgärten. Sehr großfr. Mayflower. Früh, mittelgroß, gelb mit rot RoteMagdalene.Mittelfr.,gelb m.dunkelr. Proskauer. Spät, braunrot, sehr gut

Aprikosen

Ambrosia. Mittelgroß, dunkelgelb Aprikose von Nancy.Rotgefärbt,mittelfr. Luizets Aprikose. Orange, früh

Quitten

Apfelquitte. Apfelförmig, mittelgroß Riesenquitte von Vranje. Riesenfrüchtige, ungeheuer reichtragend. Birnenquitte. Durchschnittl. 1 kg schwere Früchte. Sehr widerstandsfähig u. frühreifend.

		1 St.
		RM
Himbeeren,	ältere Sorten	0.20
"	neue Sorten .	0.40
Brombeeren		
Johannisbee		
	5-8	Triebe 0.40
" schwarz	u. weißfrüchtig	ge Sort.
		Triebe 0.50
Stachelbeer		
Stachelbeer-	- u. Johanni	sbeer-
	tämme	
Haselnüsse		. 1.20
Erdbeeren		0.05
Rhabarber,	ältere Sorten	0.50
	neue Sorten .	

Himbeeren

Deutschland. Rotfrüchtig, sehr ertragreich. Neu Gelbe Antwerpener. Gelbfrüchtig Lloyd George. Großfr., reichtragend. Neu Preußen. Groß, süß, hellrot. Neu Shaffers Colossal. Dunkelrot

Brombeeren

Wilsons Frühe. Aufrechtwachsend, tiefschwarz Theodor Reimers. Rankend, riesenfrücht.

Johannisbeeren

Fays Fruchtbare. Rot Heros. Großfrüchtige Neuheit, rotfr. Langtraubige Rote Goliath. Schwarzfrüchtig Rote Holländische Rote Kirsch Weiße Holländische

Stachelbeeren

Gelbe Riesen. Große gelbe Beeren Grüne Riesen. Grüne Früchte Gelbe Triumphbeere. Gelbfrüchtig Hönings früheste. Gelb Maiherzog. Rotfrüchtig Rote Triumphbeere. Rotfrüchtig Weiße Triumphbeere. Weißfrüchtig

Haselnüsse

Hallesche Riesennuß, Kugelig-kegelförm. Ludolfs Zellernuß, Groß, oval Webbs Preisnuß, Langoval, groß Weißfrüchtige Lambertnuß, Eiförmig Wunder von Bollweiler, Kegelförmig

Erdbeeren

Deutsch Evern. Bewährte Frühsorte Flandern. Sehr reichtragend Mme. Moutôt. Riesenfrüchtig Oberschlesien. Spät, groß, süß Sieger. Reich- und frühtragend Schwarze Ananas. Dunkelrot, fein Rügen. Monatserdbeere, rankenlos. Sehr reichtragend. Bringt bis in d. Herbst hinein Früchte.

Rhabarber

The Sutton. Blutrot, zuckersüß, reichtr. Neu Dawes Challenge. Aehnlich vorigem Cyclop. Sehr dickstielig Queen Victoria. "Verbesserter", sehr fein Holsteiner Blut. Rotstielig. Neu Loher Blut. Rotfleischige Stiele. Neu

Staudensamen eigener, letzter Ernte

Beschreibung der einzelnen Sorten siehe bei Staudenpflanzen. Jeder Samenbestellung wird auf Wunsch Kulturanweisung beigelegt.

Außer den hier aufgeführten Sämereien, haben wir von fast allen im Katalog verzeichneten Perennen und Farnen kleinere Mengen Samen geerntet. Preis pro 1/2 Gramm PM 0.40.

Jedes auf Seite 5-8 verzeichnete Staudensortiment ist auch als Samensortiment lieferbar. Es kosten 100 g in 34 Sorten RM 25.—. Ab 25 g wird der 100 g-Preis berechnet.

Von Samen, die pro Gramm 40 Pfg. und mehr kosten, wird auch 1/2 Gramm abgegeben.

Bei Abnahme von 5 g u. mehr einer Sorte ermäßigt sich der 1 g-Preis um 10 %, bei Abnahme von 25 g u. mehr einer Sorte um 20 %.

Bei Abnahme von 5 g u. mehr ei	ner Sorte ermäßigt sich der 1 g-Pi	reis um 10 %, bei Abnahme von 2	5 g u. mehr einer Sorte um 20 º/o.
1 Gramm			
RM	011	1 g	1 g RM
Acaena fissistipula violacea 0.50	Aquilegia coerulea hybr.	Astilbe Thunberg. delicata 0.70	Chrysanthemum laug
glaucophylla 0.50	(haylodgensis) 0.40	carnea 060	D 1 0.70
— inermis 0.50	- vulgaris hybr. 000	alamana 0.70	D 4 0.70
microphylla 0.50	—— fl. pl 0.40	- Moerheimii 060	- maximum Fiancee 0.20
novae zealandiae 0.00	mivea gran 0.30	Astrontia conniction 010	— Gruppenstolz 0.20
Acanthus longifolius . 0.10		— major	— H. v. Grüter 0.20
Achillea ageratifolia 0.40		Aubrietia deltoides 0.80	— — Juwel 0.20
— aurea 0.60	Argemone platyceras 0.70	— graeca superba 0.80	— Mayfield Giant 0.30
- mill. Kelwayi 0.60	Armeria hybr Bees Ruby 060	- feinste Mischung 0.80	— Non plus ultra 0.30
Crimson Beauty . 0.60	- formosa enlandana 050	Avena sempervirens 0.40	— — Ophelia 0.30
- macedonica 0.40	— majellensis 0.80		— Neue Spielart. gem. 0.25 — uliginosum 0.50
- pseudopectinata 0.50	— maritima 0.60	Balla lallata	uliginosum 0.50
Aconitum Fischeri var.	alba 0.60	Drunella grandiflora alba 0.40	Chrysopsis vill. Rutteri . 0.50
Wilsonii 0.50		— rosea 0.40 — Webbiana 0.40	Cimicinga cordiiolia
- lycoct. pyrenaicum 0.50			(dahur)
napellus 0.40		Buddleia Veitchiana 0.60	— racemosa 0.80
— album 0.50 — carneum 0.50	Arnica amplexicaulis . 0.60	Buphtalmum salicifolium . 0.30	Clematis integrifolia 0.60
— praecox 0.40	Aruncus silvester 0.50	Calimeris integrifolia 0.30	- recta 0.20
- Stoerkianum 0.40	— sinensis 0.70	Campanula abietina 0.50	
	Asclepias purpurea 0.30		— lanceolata oculata 0.25
Actaea spicata 0.40		— carpathica 0.20	- Golden Queen 030
Adenophora Bulleyana . 0.50	Asphodeline lutea 0.30	— alba grdfl 0.20	- Perrys Var 0.30
— polymorpha 0.30	Asparagus filicinus 1.	— — minor () 3()	060
Aethionema pulchellum . 0.80		- - alba 030	Corydalis cheilanthifolia . 1.50
Ajuga rept. fol. multicolor 0.40	— albus 0.60	Isabell 0.30	— lutea 1.—
Alisma plantago 0.40	- amellus in Farben sort.:	— — Riverslea 0.40	— ochroleuca 1.—
- lancifolium 0.50	a duniciolad . C.4C	— turbinata 0.40	
Allium cyaneum 0.60		— — White Star 0.30 — glomerata acaulis 0.80	Crambe cordifolia 0.30
— flavum 0.60	- Neuheiten Mischung 0.50	glomerata acaulis 0.80	Crucianella stylosa 0.30
— pulchellum 0.40		— — dahurica 0.50 — — superba 0.60	Cyclamen cilicicum 2.—
- speciosum 0.50		— grandis 0.60	
tibeticum 0.50	- himalaicus major . 0.40	— alba 0.60	— europaeum 2.—
Althaea (Malve) ficifolia . 0.10	— linosyris 0.50	— latifolia macrantha 0.20	— neapolitanum 2.—
- rosea fl. pl.	— novae angl. rosa, rot.	alba 0.50	— repandum 2.—
in Farben sortiert 0.15	hell- und dunkelblau . 0.40	— pers. Backhousei 1.20	Cyperus carexioides 0.70
Prachtmischung . 0.15	- novi belgii in Farben	- Telham Beauty 1.20	— longus 0.60
Alyssum argenteum 0.30	sortiert 0.40	— Telham Beauty 1.20 — punctata 0.80	Datisca cannahina 060
- saxatile 0.20		— pusilla 6.—	
—— compactum 0.20	in Frachtmischg. 0.30	—— alba 5.—	Delphinium cultorum
—— citrinum 0.60		— — Seiberti 6.—	in Farben sortiert . 0.40
—— sulphureum 0.60	in Prachtmischg. 0.40 — sibiricus 0.50	- rhomboidalis 0.80	— — feinste Mischung . 0.30 — — Mischung gefüllt-
- serpyllifolium 0.60	— subcoeruleus 0.30	— rotundifolia superba . 1.50	blühender Sorten . 0.40
Anchusa ital. Dropmore . 0.20	- Artemis 0.40	Centaurea montana grdfl. 0.40	— Neuheiten Prachtm. 0.80
Anemone albicyanea 0.50	—— lucidus 0.40	—— alba 0.40	
— baldensis 0.50	Wartburgstern . 0.60	Centranthus ruber 0.20	in Farben sortiert . 0.60
— Halleri 0.70	Astilbe Arendsii Gloria . 0.80	—— albus 0.30	Prachtmischung 0.50
- japonica in Farb. sort. 0.60	Granat 0.90	—— coccineus 0.30	- grandifl. chin. cinerarea 0.20
— Levillei 0.60	Hyacinth 0.80		——————————————————————————————————————
— pulsatilla 0.50	Weiße Gloria 0.80		Dianthus arenarius 0.30
rivularis 0.40	— in Farben sortiert . 0.70	Cerastium Biebersteinii . 0.15	— caesius hybr 0.50
- silvestris 0.50	- Prachtmischung 0.50	— tomentosum 0.50	- compactus 0.50
Anthemis Kelwayi 0.15	- Neuheiten Mischung 1	—— candidissimum 0.40	—— lilacinus 0.50
- tinct. Perrys var 0.30	— japonica. Treibsorten	— — Columnae 0.60	— deltoides 0.30
Anthyllis vuln. rubrifol 0.10		Chelone obliqua 0.40	—— albus
Aquilegia chrysantha 0.30	— Davidii 0.80	—— alba 0.50	— Brillant 0.40

Dianthus delfoil, splend, 0.30 Gratinan dahurica				
Dianthus delfoil, splend, 0.30 Gratinan dahnrica 0.30 Knappii 0.50 Agressa 0.30 Misspons officialis 0.20 Commercialis 0.20 Agressa 0.30 Agressa		1g	1.8	1 g
Granificus 0.50 decumbers 0.50 Hyssopus officinalis 0.20 Neutherton Frachtin, 0.50 macrodemis 0.40 Freyniana 2.5 Humilian in Schweetlicke 0.50 Freyniana 0.40 Freyniana 0.50 Humilian in Schweetlicke 0.50 Freyniana 0.40 Humilian in Schweetlicke 0.50 Freyniana 0.50 Fr	RM	RM	\mathcal{RM}	RM
Granificus 0.50 decumbers 0.50 Hyssopus officinalis 0.20 Neutherton Frachtin, 0.50 macrodemis 0.40 Freyniana 2.5 Humilian in Schweetlicke 0.50 Freyniana 0.40 Freyniana 0.50 Humilian in Schweetlicke 0.50 Freyniana 0.40 Humilian in Schweetlicke 0.50 Freyniana 0.50 Fr	Dianthus deltoid. splend 0.30	Gentiana dahurica 0.30	Hypericum polyphyllum . 0.70	Lupinus polyph. fein. Misch. 0.20
Knappii	- granificus 0.30	— decumbens 0.30	Hyssopus officinalis 0.20	— Neuheiten Prachtm. 0.30
macrodemus 0.46 Fernjana 2 Husulius lupulus aureus 0.50 Lysimathia (Douglatchys v. O.50 plunarius hybr. 0.40 esternis 0.50 plunarius hybr. 0.40 esternis 0.40	- Knappii 0.50	depressa 0.30	— — albus 0.30	Lychnis chalcedonica 0.13
pelmarius hybr. 0.40 — ecoticus 0.20 — plumarius hybr. 0.40 — ecoticus 0.20 — hybr. Beces Pink 1.— — hybr. General 0.20 — glozininellora purpurea 0.20 — glozininellora purpurea 0.20 — dilicense 1.— — plura decentral 1.— — plura decentral 1.— — dilicense 1.— — plura decentral 1.— — pl	— magradamus 0.40	- Freyniana 9-	Humulus lupulus aureus . 0.50	Lysimachia longistachys . 0.40
pulmarius hybr	macrodemus 0.40	V 1: " 050	Theris camp Schneeflades 080	Lythrum Crimson Dwarf 0.30
prinosus	— pelvitormis 0.50	- Resselringii 0.30	Toeris semp. Sameenoke . 0.60	Lythrum Crimson Bwarr c.cc
prinosus	- plumarius hybr 0.40	— lutea 0.40	Incarvillea Delavayi 0.00	Lady Sackville 0.20
Perinosus 0.40	- — scoticus 0.30	- phlogifolia 0.50	— grandiflora 1.—	- salic. roseum superbum 0.20
sanguineus artorulens e. 530 Dictamus fracinella 0.40 Dictamus fracinella 1.60 Dictamus fracinella 0.40 Dictamus fracinel	— pruinosus 0.40	— septemfida 2.—	—— brevipes 1.—	Malva moschata 0.10
Dictamus farzorlans 0.50 Olivitanis articurila 0.50 Dictamus farzorlan 0.50 Dictamus farzicurila 0.50 Dictam	- conquinque 0.40	- la mode chiana 2 -	- hybr Bees Pink 1	Mimulus Fremonti 0.40
Dictamus Fraxinella 0.40		— thianghaniaa 0.50	Inula ensifolia 0.50	- hybr. Burnetti 0.50
Digitalis ambigus ferrugines Q. Ogenamine Endressii Q. Ogenamine Strikum	D' vaginatus attortibens . C.50	thianshamea	- alandulasa 080	- I separd 0.50
Ferruginea	Dictamnus fraxinella 0.40	- tibetica	grandurosa	N C 1
Decanisend flora purpurea 0.20 Chilomes 0.60 Chilomes 0.	Digitalis ambigua 0.20	Geranium Endressii 0.40	macrocephala 0.20	- Netzfalter 0.80
Decanisend flora purpurea 0.20 Chilomes 0.60 Chilomes 0.	— ferruginea 0.20	— macrorrhizum 0.50	Iris Delavayi 0.30	Postillon 0.80
Doronciem Clusii	- gloviniaeflora purpurea 0.20	Geum Borisii 0.60	— germanica hybr 0.30	—— Schmetterling 0.80
- codrifiol (Columnac) 3. − Concinement (sibricum) 0.50 − Scheekekönigin 0.20 − Inletes 0.20 − I	Doronicum Clusii 1.80	- chilgense	- Kaempferi hybr 0.30	Lensdorffii 0.40
Decision Conceine		Mrs Bradshaw 030	- orientalia 020	luteus 0.20
Dracecephal Ruyschianum 0.30	— corditor. (Cordinate) . 5.	' ('1': \) 0.30	Silverial 000	0.30
	— — Mrs. Masson	- coccineum (sibiricum) 0.30	- Schneekonigin 0.20	aipinus
	Dracocephal. Ruyschianum 0.30	mont. Heldreichn magn. 0.50	- pumila hybr. Prachtm. 0,30	Minuartia aizoides 0.50
	— japonicum 0.40	——— splendens 1.—	— sibirica 0.20	— laricifolia 0.50
	Dryas octopetala 1.20	— hybr. Goldball 0.60	— superba 0.20	Miscanthus sinensis zebrin. 0.20
Sündermannii	lanata 1.60	- rivale Leonhards var. 060	—— alba 0.20	- saccharifer (Imperata) 0.20
Chimops bannaticus 0.10	- Siindarmannii 150	Globularia trichosantha 060	- Perrys blue 0.90	Mochringia muscosa 1-
− humilis 0.20 − Wilkommii 0.50 − versicolor 0.20 − Kalmiana 0.30 − níveus 0.10 Gypsophila pacifica 0.50 − vilsonii 0.50 − maguifica 0.30 Ejmus giganteus 0.40 − fl. pl. 0.50 − sobastus 0.60 Morina longifolia 0.70 Ericeurus garas 2. − − feld Orange 1. − hybr. 0.50 − klenium autuman. Chippers − hybr. 0.50 − flyor 0.50 − hybr. 0.50 − flyor	Falinas I and time 0.10	- mulgania (muliasalta) 0.60	- Strandporla	Monarda did Cambr Scarl 040
− niveus	Echinops bannaticus 0.10	vulgaris (nudicaule) . 0.60	Strandperie 0.20	Kalmina 0.30
Elymus giganteus	- humilis 0.20	— Wilkommii 0.50	versicolor 0.20	Kalmiana 0.50
Elymus giganteus	— niveus 0.10	Gypsophila pacifica 0.50	— Wilsonii 0.30	— magnifica 0,30
Elymus giganteus	— ritro 0.10	paniculata 0.20	Jasione humilis 0.80	— violacea superba . 0.30
Eremurus himalaicus 0.50	Elymus giganteus 0.40	- fl. pl 0.50	perennis 0.40	Morina longifolia 0.70
Eremurus himalaicus	Enilobium Hastori 1 -	- rapens Purpusii 050	Kniphofia corallina 0.50	Mulgedium alpinum 0.30
Frica vagans 2.	Ephootum Hectori 1.	Tepens Luipusii	la anno multipales 0.50	Manageria nol
Erica vagans 2.— rubra 2.— rubra 2.— gaillardiachorum 8.80 — hybr. Expref 0.20 — Mopte Expref 0.50 — hybr. Expref 0.20 — Mussinii superba 0.50 — stricta 3.— rubrum superbum 1.— uvaria grandiflora 0.50 — nervosa 0.60 — rubrum superbum 1.— uvaria grandiflora 0.50 — nervosa 0.60 — semiplenus 0.40 — Bigelovii 0.50 — feinate Mischung 0.20 — Youngii 0.50 — semiplenus 0.40 — semiplenus 0.40 — rubrum superbum 1.— eliente Mischung 0.20 — rubrum 1.— eliente Mischung 0.20 — reagante 1.50 — - masiouriensis 0.40 — eliente ribrumide 0.50 — eliente Mischung 0.20 — eliente Mischung 1.0. — eliente Mischung 1.0. — eliente Mischung 0.20 — eliente Mischung 1.0. — eliente Mischung 1.— eliente Mischung 0.20 — eliente Mischung 1.0. — eliente Mischung 1.— eliente Mischung 1.0. — eliente Mischung 1.— eliente Mischung 1.0. — eliente Mischung 1.— eliente Mischung 1.0. — eliente Mischung 1.— eliente Mischung 1.0. — eliente Mischung 1.0. — eliente Mischung 1.— eliente Mischung 1.0. — eliente Mischung 1.0. — eliente Mischung 1.— eliente Mischung 1.0. — eliente Mischung 1.0.	Fremurus himalaicus 0.30	rosea	elegans multicolor 0.50	C C XX 11 0.40
rubra 2 gaillardiaeflorum 0.80 - Hybr. Exprefi 0.20 Nepeta macrantha 0.20 - stricta 3 H. Marschall 1.20 - Solfatere 0.50 - nervosa 0.60 - respeciosus roseus 0.80 - Respeciosus 0.50 - Respeciosus roseus 0.80 - Respeciosus 0.80 - Respeciosus roseus 0.80 - Respeciosus	— robustus	Helenium autumn. Chipper-	- gracilis Goldelse 0.50	Graf Waldersee 0.40
rubra 2 gaillardiaeflorum 0.80 - Hybr. Exprefi 0.20 Nepeta macrantha 0.20 - stricta 3 H. Marschall 1.20 - Solfatere 0.50 - nervosa 0.60 - respeciosus roseus 0.80 - Respeciosus 0.50 - Respeciosus roseus 0.80 - Respeciosus 0.80 - Respeciosus roseus 0.80 - Respeciosus	Erica vagans 2.—	field Orange 1.—	— hybr 0.40	— Perle v. Ronneberg 0.50
Sericita	— — rubra 2.—	— gaillardiaeflorum . 0.80	- hybr. Expreß 0.20	Nepeta macrantha 0.20
Sericita	alba	- Gartensonne 0.80	— Tuckii 0.20	— Mussinii superba 0.50
Erigeron aurantiacus 1,20	- stricts 3-	- H Marschall 190	- Solfatere 0.50	nervosa 0.60
- speciosus roscus 0.80 Bigelovii 0.50 - semiplenus 0.40 - Hoopesii 0.20 Cadyrus latifolius 0.10 glauca (glabra) 0.50 - superbus grdfl 0.30 Helianthemum hybr. i. Sort 0.30 - albus 0.20 - Fraseri 0.40 - albus 0.20 - Fraseri 0.40 - albus 0.20 - Fraseri 0.40 - albus 0.20 - bybr. Fluvel 0.40 - albus 0.50 - Munstead var 0.30 - albus 0.50 - albus 0.50 - maritimum 0.60 - argenteum 0.10 - argenteum 0.10 - foetidus 0.40 - argenteum 0.10 - foetidus 0.40 - macedonica 0.50 - pumblidora 0.50 - major 0.50 - deptidora 0.50 - pumblidora 0.50 - pu	E ' 1 00	11. Platsdian 1.20	Bonatere	Opportunitions major 0.20
	Erigeron aurantiacus 1.20	P' 1 " O 50	G' M' 1	V: 0.30
—— superbus grdfl. 0.30 Helianthemum hybr. i. Sort. 0.30 —— albus	- speciosus roseus 0.80	Bigelovii	- feinste Mischung 0.20	- I oungii 0.50
Erinus alpinus 2.	— — semiplenus 0.40	— Hoopesn 0.20	Lathyrus latitolius 0.10	glauca (glabra) 0.50
Erinus alpinus 2.	— — superbus grdfl 0.30	Helianthemum hybr. i. Sort. 0.30	- albus 0.20	— Fraseri 0.40
—— albus 2.— —— Dr. Hähnle 3.— —— Or. Hähnle 3.— —— olivanus 3.— —— olivanus 3.— —— tomentosus 0.50 —— olivanus 3.— —— tomentosus 0.50 —— olivanus 4.— —— olivanus 4.— —— olivanus 4.— —— olivanus 5.— —— tomentosus 0.50 —— Munstead var. 0.30 —— punita (apusilla) 0.50 —— hybr. Juwel 0.40 —— Violetta 0.40 —— Violetta 0.40 —— warnimum 0.60 —— Oliverianum superbum 0.50 —— blauer Zwerg 0.30 —— rosea 1.— —— rasgenteum 0.30 —— Blauer Zwerg 0.30 —— rosea 1.— —— pradmischung 0.50 —— oliverianum ageratoides 0.30 —— Früseri 0.50 —— pradmischung 0.50 —— pradmischung 0.50 —— pradmischung 0.50 —— hybr. Feuerrispe 1.50 —— hybr. Feuerrispe 1.50 —— myrsinites 0.50 —— pradmischung 0.50 —— pradmischung 0.50 —— pradmischung 0.50 —— pradmischung 0.50 —— hybr. Feuerrispe 1.50 —— hybr. Feuerrispe 1.50 —— hybr. Feuerrispe 1.50 —— hybr. Feuerrispe 1.50 —— ovina 0.20 —— villosum 0.40 —— narbonnense 0.30 —— spirocentra 0.50 —— spirocentra 0.50 —— spirocentra 0.50 —— albispina 0.50 —— padilora 2.—— humifusa 0.40 —— pachyclada 0.50 —— perenne 0.20 —— pachyclada 0.50 —— spirocentra 0.50 —— levis Pithlich 1.—— narbonnense 0.30 —— narbonnense 0.30 —— ovina 0.20 —— ovina 0.2	Erinus alpinus 2	- Prachtmischung 0.20	— vernus 0.40	— linearis 0.50
—— Dr. Hähnle 3.— Helianthus Nuttallii 0.50 —— olivanus 5.— tomentosus 0.50 Eriophyllum caespitosum 0.50 Eryngium alpinum superb 0.50 —— hybr. Juwel 0.40 —— Violetta 0.40 —— Negretianum superbum 0.50 —— Nunstead var. 0.50 —— Leontopodium alpinum 2.—— albispina 0.50 —— Leontopodium alpinum 2.—— Lepadys pinnata 0.40 —— violetta 0.40 —— major 0.20 —— maior 0.50 —— leardys pinnata 0.40 —— major 0.50 —— punninellora 0.50 —— prosinitallepis 0.50 —— prosinitallepis 0.50 —— prosinitallepis 0.50 —— prosinitallepis 0.50 —— praditinium 0.60 —— sinniaellora 0.50 —— prosinitallepis 0.50 —— prosinitallepis 0.50 —— praditinishum 0.50 —— praditi	—— albus 2—	- oelandicum 0.40	Lavandula vera 0.20	— missouriensis 0.40
Company Comp	- Dr. Hähnle 3	Helianthus Nuttallii 050	- Dwarf blue 0.30	— pumila (pusilla) 0.70
Eriophyllum caespitosum 0.50 Heliopsis floribunda comp. 0.30 Lepadys pinnata 0.40		Tremantinus Truttaini 0.50	Manager 1 0.3	Operation company 050
Eryngium alpinum superb 0.50 — laevis Pitcheriana 0.20 — hybr. Juwel 0.40 — scabra gratissima 0.20 — winder 0.50 — orbicularis 0.50 —	— olivanus	tomentosus 0.50	Thunstead var 0.5	Opuntia camandica 0.50
— Violetta 0.40 — major 0.20 — graminifolia 0.60 — — pallida 0.50 — on maritimum 0.60 — zinniaeflora 0.30 — pycnostachya 0.80 — salmonea 0.50 — planum 0.10 — foetidus 0.40 — spicata 0.40 — cymodila 0.50 — planum 0.10 — foetidus 0.40 — rosea 0.50 — planum 0.10 — foetidus 0.40 — rosea 0.50 — humifusa 0.40 — pyccaefolium. Neu 1.— Prachtmischung 0.30 — willogiliora 0.40 — macedonica 0.30 — humifusa (Rafinesquiana) 0.50 — prachtmischung 0.30 — prachtmischung 0.30 — humifusa 0.50 — prachtmischung 0.30 — prachtmischung 0.50 — polyacantha 0.50 — pub. Feuerrispe 1.50 — hybr. Feuerrispe 1.50 — flavum 0.30 — spirocentra 0.50 — pub. flavum 0.30 — spirocentra 0.50 — pub. flavum 0.30 — spirocentra 0.50 — pub. flavum 0.30 — spirocentra 0.50 — punctaria 0.50 — rubrum 0.40 — album 0.20 — sphaeracantha major 0.50 — scoparia (crinum ursi) 0.30 Hosta Fortunei glaucesc 0.40 — Bayern 0.40 — orbicularis. Neu 0.70 — regalis 0.50 — Sieboldii 0.50 — Pachtmischung 0.50 — Pachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — punctaria 0.60 Horminum pyrenaicum 0.80 Lupinus polyph. albus 0.20 — vanthostemma elegans 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Scoparia (crinum ursi) 0.30 Hosta Fortunei glaucesc 0.40 — Bayern 0.40 — orbicularis. Neu 0.70 — Prachtmischung 0.40 — Downers Pink Pearls 0.30 — Prachtmischung 0.40 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.40 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmi	Eriophyllum caespitosum 0.50	Heliopsis floribunda comp. 0.30	Leontopodium alpinum . 2.—	- albispina 0.50
— Violetta 0.40 — major 0.20 — graminifolia 0.60 — — pallida 0.50 — on maritimum 0.60 — zinniaeflora 0.30 — pycnostachya 0.80 — salmonea 0.50 — planum 0.10 — foetidus 0.40 — spicata 0.40 — cymodila 0.50 — planum 0.10 — foetidus 0.40 — rosea 0.50 — planum 0.10 — foetidus 0.40 — rosea 0.50 — humifusa 0.40 — pyccaefolium. Neu 1.— Prachtmischung 0.30 — willogiliora 0.40 — macedonica 0.30 — humifusa (Rafinesquiana) 0.50 — prachtmischung 0.30 — prachtmischung 0.30 — humifusa 0.50 — prachtmischung 0.30 — prachtmischung 0.50 — polyacantha 0.50 — pub. Feuerrispe 1.50 — hybr. Feuerrispe 1.50 — flavum 0.30 — spirocentra 0.50 — pub. flavum 0.30 — spirocentra 0.50 — pub. flavum 0.30 — spirocentra 0.50 — pub. flavum 0.30 — spirocentra 0.50 — punctaria 0.50 — rubrum 0.40 — album 0.20 — sphaeracantha major 0.50 — scoparia (crinum ursi) 0.30 Hosta Fortunei glaucesc 0.40 — Bayern 0.40 — orbicularis. Neu 0.70 — regalis 0.50 — Sieboldii 0.50 — Pachtmischung 0.50 — Pachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — punctaria 0.60 Horminum pyrenaicum 0.80 Lupinus polyph. albus 0.20 — vanthostemma elegans 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Scoparia (crinum ursi) 0.30 Hosta Fortunei glaucesc 0.40 — Bayern 0.40 — orbicularis. Neu 0.70 — Prachtmischung 0.40 — Downers Pink Pearls 0.30 — Prachtmischung 0.40 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.40 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmi	Eryngium alpinum superb. 0.50	— laevis Pitcheriana 0.20	Lepachys pinnata 0.4	0 — major 0.50
— Violetta 0.40 — major 0.20 — graminifolia 0.60 — — pallida 0.50 — on maritimum 0.60 — zinniaeflora 0.30 — pycnostachya 0.80 — salmonea 0.50 — planum 0.10 — foetidus 0.40 — spicata 0.40 — cymodila 0.50 — planum 0.10 — foetidus 0.40 — rosea 0.50 — planum 0.10 — foetidus 0.40 — rosea 0.50 — humifusa 0.40 — pyccaefolium. Neu 1.— Prachtmischung 0.30 — willogiliora 0.40 — macedonica 0.30 — humifusa (Rafinesquiana) 0.50 — prachtmischung 0.30 — prachtmischung 0.30 — humifusa 0.50 — prachtmischung 0.30 — prachtmischung 0.50 — polyacantha 0.50 — pub. Feuerrispe 1.50 — hybr. Feuerrispe 1.50 — flavum 0.30 — spirocentra 0.50 — pub. flavum 0.30 — spirocentra 0.50 — pub. flavum 0.30 — spirocentra 0.50 — pub. flavum 0.30 — spirocentra 0.50 — punctaria 0.50 — rubrum 0.40 — album 0.20 — sphaeracantha major 0.50 — scoparia (crinum ursi) 0.30 Hosta Fortunei glaucesc 0.40 — Bayern 0.40 — orbicularis. Neu 0.70 — regalis 0.50 — Sieboldii 0.50 — Pachtmischung 0.50 — Pachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — punctaria 0.60 Horminum pyrenaicum 0.80 Lupinus polyph. albus 0.20 — vanthostemma elegans 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Scoparia (crinum ursi) 0.30 Hosta Fortunei glaucesc 0.40 — Bayern 0.40 — orbicularis. Neu 0.70 — Prachtmischung 0.40 — Downers Pink Pearls 0.30 — Prachtmischung 0.40 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.40 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmi	- hybr. Juwel 0.40	— scabra gratissima 0.20	Liatris callilepis 0.5	0 — orbicularis 0.50
— Oliverianum superbum 0.50	— Violetta 0.40	0 — major 0.20	graminifolia 0.6	0 — pallida 0.50
— Oliverianum superbum 0.50	- maritimum 0.60	0 - zinniaeflora 0.30	- pycnostachya 0.8	0 salmonea 0.50
— planum	- Olivarianum superbum 0.50	Hallaharus nigar 0.30	= spicata 04	- cymodila 0.50
— Blauer Zwerg	-lanum superbum 0.30	faction of the	Tinonio alcino	- grandiflana Engalar Nav 0.70
— Blauer Zwerg	pianum O.10	Toetidus	Linaria aipina	grandinora Engelm. Neu 0.70
Eupatorium ageratoides 0.30 Heracleum villos. (gigant.) 0.20 Lindelofia longiflora 0.40 — pachyclada 0.50 — Fraseri 0.30 Heuchera sanguine asplend 1.50 Linum austriacum 0.20 — polyacantha 0.50 — polyacantha 0.50 — polyacantha 0.50 — polyacantha 0.50 — albispina 0.50 — spirocentra 0.50 — spirocentra 0.50 — spirocentra 0.50 — perenne 0.30 — spirocentra 0.50 — perenne 0.30 — watsonii 0.50 — perenne 0.30 — rubrum 0.40 — album 0.20 — sphaeracantha major 0.50 — punctaria 0.60 — villosum 0.40 — album 0.20 — sphaeracantha major 0.50 — punctaria 0.60 — villosum 0.40 — album 0.20 — sphaeracantha major 0.50 — punctaria 10.50 — villosum 0.40 — Bayern 0.40 — carmineus 0.50 — wathostemma elegans 0.50 — regalis 0.50 — ovata (coerulea) 0.40 — Bayern 0.40 — orbicularis. Neu 0.70 — rosea 0.50 — regalis 0.50 — ovata (coerulea) 0.40 — Downers Pink Pearls 0.30 — Prachtmischung 0.40 — Pachyclada 0.50 — polyacantha 0.50 — spirocentra 0.50 — spirocentra 0.50 — spirocentra 0.50 — spirocentra 0.50 — perenne 0.20 — rhodantha 0.50 — sphaeracantha major 0.50 — sphaeracantha major 0.50 — suhaensis J.A. Purp. Neu 0.70 — Bayern 0.40 — orbicularis. Neu 0.70 — Pachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.40 — powners Pink Pearls 0.30 — Prachtmischung 0.40 — paever alpinum 1. — nudicaule feinste Misch. 0.30 — Paesigan offic. Hartlandii 0.10 — Degenii 0.40 — Nelly 0.30 — nudicaule feinste Misch. 0.30 — Prinzeß Juliane 0.30 — orientale, hell- u. dklrot 0.30 — orientale, hell- u. dklrot 0.30 — weiß, rosa u. lachs 0.30 — weiß, r	—— argenteum 0.36	Hemerocallis flava 0.40	- rosea	humitusa
Eupatorium ageratoides 0.30 Heracleum villos. (gigant.) 0.20 Lindelofia longiflora 0.40 — pachyclada 0.50 — Fraseri 0.30 Heuchera sanguine asplend 1.50 Linum austriacum 0.20 — polyacantha 0.50 — polyacantha 0.50 — polyacantha 0.50 — polyacantha 0.50 — albispina 0.50 — spirocentra 0.50 — spirocentra 0.50 — spirocentra 0.50 — perenne 0.30 — spirocentra 0.50 — perenne 0.30 — watsonii 0.50 — perenne 0.30 — rubrum 0.40 — album 0.20 — sphaeracantha major 0.50 — punctaria 0.60 — villosum 0.40 — album 0.20 — sphaeracantha major 0.50 — punctaria 0.60 — villosum 0.40 — album 0.20 — sphaeracantha major 0.50 — punctaria 10.50 — villosum 0.40 — Bayern 0.40 — carmineus 0.50 — wathostemma elegans 0.50 — regalis 0.50 — ovata (coerulea) 0.40 — Bayern 0.40 — orbicularis. Neu 0.70 — rosea 0.50 — regalis 0.50 — ovata (coerulea) 0.40 — Downers Pink Pearls 0.30 — Prachtmischung 0.40 — Pachyclada 0.50 — polyacantha 0.50 — spirocentra 0.50 — spirocentra 0.50 — spirocentra 0.50 — spirocentra 0.50 — perenne 0.20 — rhodantha 0.50 — sphaeracantha major 0.50 — sphaeracantha major 0.50 — suhaensis J.A. Purp. Neu 0.70 — Bayern 0.40 — orbicularis. Neu 0.70 — Pachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.40 — powners Pink Pearls 0.30 — Prachtmischung 0.40 — paever alpinum 1. — nudicaule feinste Misch. 0.30 — Paesigan offic. Hartlandii 0.10 — Degenii 0.40 — Nelly 0.30 — nudicaule feinste Misch. 0.30 — Prinzeß Juliane 0.30 — orientale, hell- u. dklrot 0.30 — orientale, hell- u. dklrot 0.30 — weiß, rosa u. lachs 0.30 — weiß, r	— — Blauer Zwerg 0.30	— in Sorten	— cymbalaria compacta . 0.4	(Rahnesquiana) 0.50
Eupatorium ageratoides 0.30 Heracleum villos. (gigant.) 0.20 Lindelofia longiflora 0.40 — pachyclada 0.50 — Fraseri 0.30 Heuchera sanguine asplend 1.50 Linum austriacum 0.20 — polyacantha 0.50 — polyacantha 0.50 — polyacantha 0.50 — polyacantha 0.50 — albispina 0.50 — spirocentra 0.50 — spirocentra 0.50 — spirocentra 0.50 — perenne 0.30 — spirocentra 0.50 — perenne 0.30 — watsonii 0.50 — perenne 0.30 — rubrum 0.40 — album 0.20 — sphaeracantha major 0.50 — punctaria 0.60 — villosum 0.40 — album 0.20 — sphaeracantha major 0.50 — punctaria 0.60 — villosum 0.40 — album 0.20 — sphaeracantha major 0.50 — punctaria 10.50 — villosum 0.40 — Bayern 0.40 — carmineus 0.50 — wathostemma elegans 0.50 — regalis 0.50 — ovata (coerulea) 0.40 — Bayern 0.40 — orbicularis. Neu 0.70 — rosea 0.50 — regalis 0.50 — ovata (coerulea) 0.40 — Downers Pink Pearls 0.30 — Prachtmischung 0.40 — Pachyclada 0.50 — polyacantha 0.50 — spirocentra 0.50 — spirocentra 0.50 — spirocentra 0.50 — spirocentra 0.50 — perenne 0.20 — rhodantha 0.50 — sphaeracantha major 0.50 — sphaeracantha major 0.50 — suhaensis J.A. Purp. Neu 0.70 — Bayern 0.40 — orbicularis. Neu 0.70 — Pachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.50 — Prachtmischung 0.40 — powners Pink Pearls 0.30 — Prachtmischung 0.40 — paever alpinum 1. — nudicaule feinste Misch. 0.30 — Paesigan offic. Hartlandii 0.10 — Degenii 0.40 — Nelly 0.30 — nudicaule feinste Misch. 0.30 — Prinzeß Juliane 0.30 — orientale, hell- u. dklrot 0.30 — orientale, hell- u. dklrot 0.30 — weiß, rosa u. lachs 0.30 — weiß, r	yuccaefolium. Neu 1	- Prachtmischung 0.30	- macedonica 0.3	0 — arcansana 0.50
Fraseri	Eupatorium ageratoides . 0.30	Heracleum villos. (gigant.) 0.20	Lindelofia longiflora 0.4	0 — pachyclada 0.50
Euphorbia epithymoides	— Fraseri 0.30	Heucherasanguineasplend. 1.50	Linum austriacum 0.2	0 — polyacantha 0.50
(polydroma) 1.20	Euphorbia enithymoides	- hybr Fenerispa 150	= capitatum	O = - albispina 0.50
— myrsinites	(polydroma) 1.00) - Friiblicht	= flavum	0 = enirogentra 0.50
Festuca glacialis 0.30 Hieracium aurantiacum 0.30 — perenne	(polychroma) 1.20	D L. 1	1 navum	sphocentia 0.50
- glauca 0.30 - rubrum 0.40 album 0.20 - sphaeracantha major . 0.50 - ovina 0.20 - villosum 0.40 Lobelia coerulea 0.30 - utahensis J.A. Purp. Neu 0.70 - punctaria 0.60 Horminum pyrenaicum 0.80 Lupinus polyph. albus 0.20 - xanthostemma elegans 0.50 - scoparia (crinum ursi) 0.30 Hosta Fortunei glaucesc. 0.40 - Bayern 0.40 - orbicularis. Neu . 0.70 - Roßdorfer hybr 0.20 - ovata (coerulea) 0.40 - carmineus 0.40 - rosea 0.50 - regalis 0.50 - Sieboldii 0.50 - Goldcrest 0.40 - Prachtmischung 0.40 - ana Kolibri 0.60 Hutchinsia Auerswaldii 1 Harkneß hybr 0.20 Papaver alpinum 1 Harkneß hybr	myrsinites 0.50	Prachtmischung 1.—	- narbonnense 0.3	0 watsonii 0.50
- ovina 0.20 - villosum 0.40 Lobelia coerulea 0.30 - utahensis J.A. Purp. Neu 0.70 - punctaria 0.60 Horminum pyrenaicum = 0.80 Lupinus polyph. albus . 0.20 - xanthostemma elegans 0.50 - Bayern 0.40 - orbicularis. Neu 0.70 - Roßdorfer hybr 0.20 - ovata (coerulea) . 0.40 - Downers Pink Pearls 0.30 - Prachtmischung . 0.40 - Ovata (coerulea) . 0.50 - Goldcrest 0.40 - Ovata (sinensis) 0.20 - Goldcrest 0.40 Paeonia albiflora (sinensis) 0.20 - Hutchinsia Auerswaldii Harkneß hybr 0.20 Papaver alpinum Ovata (sinensis) 0.20 - Nelly	Festuca glacialis 0.30	Hieracium aurantiacum . 0.30	— perenne 0.2	- rhodantha 0.50
- punctaria 0.60 Horminum pyrenaicum s 0.80 Lupinus polyph. albus . 0.20 - xanthostemma elegans 0.50 - Scoparia (crinum ursi) 0.30 Hosta Fortunei glaucesc. 0.40 - Bayern 0.40 - orbicularis. Neu 0.70 - Roßdorfer hybr. 0.20 - ovata (coerulea) . 0.40 - Downers Pink Pearls 0.30 - Prachtmischung . 0.40 - Goldcrest 0.40 - Goldcr	— glauca 0.3	0 — rubrum 0.40	— album 0.2	O - sphaeracantha major . 0.50
- scoparia (crinum ursi) 0.30 Hosta Fortunei glaucesc. 0.40	— ovina 0.20	0 — villosum 0.40	Lobelia coerulea 0.3	0 - utahensis J.A. Purp. Neu 0.70
- scoparia (crinum ursi) 0.30 Hosta Fortunei glaucesc. 0.40	— punctaria 0.6	O Horminum pyrenaicum . 0.80	Lupinus polyph. albus . 0.2	0 xanthostemma elegans 0.50
Gaillardia aristata comp. 0.20 — robusta 0.40 — carmineus 0.40 — rosea 0.50 — Roßdorfer hybr 0.20 — ovata (coerulea) 0.40 — Downers Pink Pearls 0.30 — Prachtmischung 0.40 — Goldcrest 0.40 — Ovata (sinensis) 0.20 — nana Kolibri 0.60 — Hutchinsia Auerswaldii — Harkneß hybr 0.20 — Papaver alpinum 1. — Hypericum calycinum . 0.50 — Moerheimii 0.30 — nudicaule feinste Misch. 0.30 Genista tinctoria 0.50 — Fragile 0.70 — Prinzeß Juliane 0.30 — Sunbeam	- scoparia (crinum ursi) 0.3	O Hosta Fortunei glaucesc. 040	- Bayern . 04	0 orbicularis, Neu 0.70
Roßdorfer hybr. 0.20 ovata (coerulea) . 0.40 Downers Pink Pearls 0.30 Prachtmischung . 0.40 Goldcrest . 0.40 Harkneß hybr. 0.20 Hutchinsia Auerswaldii . 1 Harkneß hybr. 0.20 Hypericum calycinum . 0.50 Moerheimii . 0.30 nudicaule feinste Misch. 0.30 Nelly 0.30 roseum hybr. 0.30 Sunbeam 0.30 Sunbeam 0.30 Sunbeam 0.30 Sunbeam 0.30 Sunbeam	Gaillardia aristata sama 0.0	O = = robusts	= carminaus	0 5000
- regalis 0.50 - Sieboldii 0.50 - Goldcrest 0.40 Paeonia albiflora (sinensis) 0.20 - nana Kolibri 0.60 Hutchinsia Auerswaldii 1 Harkneß hybr 0.20 Papaver alpinum 1 Harkneß hybr 0.30 Papaver alpinum 1 Harkneß hybr 0.30 Papaver alpinum 1 Nelly 0.30 Papaver alpinum	D cl c l l	1000sta 0.40	D. D' In 10.7	D 14: 1 0.40
— nana Kolibri 0.60 Hutchinsia Auerswaldii . 1.— — Harkneß hybr 0.20 Papaver alpinum 1.— — Moerheimii 0.30 — nudicaule feinste Misch. 0.30 Galega offic. Hartlandii . 0.10 — Degenii 0.40 — Nelly 0.30 — roseum hybr 0.30 Genista tinctoria 0.50 — fragile 0.70 — Prinzeß Juliane 0.30 — Sunbeam 0.30 — orientale, hell-u.dklrot 0.30 — asclepiadea 0.30 Hypericum olympicum 0.80 — Ruby King 0.30 — weiß, rosa u. lachs . 0.30	Kohdorfer hybr 0.2	ovata (coerulea) 0.40	- Downers Pink Pearls 0.3	Prachtmischung 0.40
Galtonia candicans 0.20 Hypericum calycinum 0.50 — Moerheimii 0.30 — nudicaule feinste Misch. 0.30 Galega offic. Hartlandii . 0.10 — Degenii 0.40 — Nelly 0.30 — roseum hybr 0.30 Genista tinctoria 0.50 — fragile 0.70 — Prinzeß Juliane 0.30 — Sunbeam 0.30 — orientale, hell-u. dklrot 0.30 — asclepiadea 0.30 Hypericum olympicum . 0.80 — Ruby King 0.30 — weiß, rosa u. lachs . 0.30	regalis 0.5	0 — Sieboldii 0.50	- Goldcrest 0.4	O Paeonia albiflora (sinensis) 0.20
Galtonia candicans 0.20 Hypericum calycinum 0.50 — Moerheimii 0.30 — nudicaule feinste Misch. 0.30 Galega offic. Hartlandii . 0.10 — Degenii 0.40 — Nelly 0.30 — roseum hybr 0.30 Genista tinctoria 0.50 — fragile 0.70 — Prinzeß Juliane 0.30 — Sunbeam 0.30 — orientale, hell-u. dklrot 0.30 — asclepiadea 0.30 Hypericum olympicum . 0.80 — Ruby King 0.30 — weiß, rosa u. lachs . 0.30				
Galega offic. Hartlandii . 0.10 — Degenii 0.40 — Nelly 0.30 — roseum hybr 0.30 Genista tinctoria 0.50 — fragile 0.70 — Prinzeß Juliane 0.30 — Sunbeam 0.30 — orientale, hell-u. dklrot 0.30 — asclepiadea 0.30 Hypericum olympicum . 0.80 — Ruby King 0.30 — weiß, rosa u. lachs . 0.30				
Genista tinctoria : 0.50 fragile 0.70 Prinzeß Juliane 0.30 Sunbeam 0.30 Gentiana acaulis 0.50 lysimachioides 0.70 roseus 0.20 orientale, hell-u.dklrot 0.30 asclepiadea 0.30 Hypericum olympicum . 0.80 Ruby King 0.30 weiß, rosa u. lachs . 0.30	Galega offic, Hartlandii 01	O - Degenii 040	- Nelly	0 - roseum hybr 030
Gentiana acaulis 0.50 — lysimachioides 0.70 — roseus 0.20 — orientale, hell-u.dklrot 0.30 — asclepiadea 0.30 Hypericum olympicum . 0.80 — Ruby King 0.30 — weiß, rosa u. lachs . 0.30	Genista tinatoria	O fragile	Prinzeh Inliana	0 - Supheam 0.30
— asclepiadea 0.30 Hypericum olympicum 0.80 — Ruby King 0.30 — weiß, rosa u. lachs . 0.30	C- 4:	0 1 : 1: 1 0.70	Trinzely Junane O.S	O
	Gentiana acaulis 0.5	lysimachioides 0.70	Poseus	orientale, hell-u. dkirot 0.30
Gentiana cruciata 0.30 - pat. var. Henryi 0.70 - Sunshine 0.40 - fl. pl. May Queen . 0.40				
	Gentiana cruciata 0.3	0 - pat. var. Henryi 0.70	01 — Sunshine 0.4	01 — — fl. pl. May Queen . 0.40

1 Gramm	1g l	1g	1 g
P. II	Primula pulverulenta 0.80	1 g RM	1g RM
Papaver orientale Prachtm. 0.20	— pubescens (auricula) . 1.—	— album 0.60	— glaucum 0.30
Paradisea lilastr.giganteum 0.40	- rosea grandifl 1	—— murale 0.80	- minus adiantifolium . 0.40
Pennisetum compressum . 0.30	Pulmonaria rubra 0.40 Pyrethrum corymbos. hybr. 1.—	— ellacombianum 0.60	Thermopsis fabacea 0.40
Pentastemon barbatus	Pyrethrum corymbos. hybr. 1.—	— floriferum . , 0.60	Thymus montanus 0.80
hybr 0.30	- roseum hybr. einfachbl.	— praecox 0.60	- rotundifol. Purpurtepp. 1.—
— coccineus 0.20	in Farben sort. 0.40 —— gefülltbl. in Farb. sortiert 1.—	- hybridum edit 0.80	- serpyllum carneus 0.00
- hybr. Andenk. an Hahn 0.40	sortiert 1.—	- kamtschaticum 0.70	Tiarella americana 0.50
— — Andenk. an Purpus 0.60	Prachtmischung 0.30	— — fol. var 0.70	Tradescantia virginiana . 0.40
— — Gärtneri 0.50	Ranunculus gramineus . 0.40 Rheum emodii 0.20	— Laggeri 0.60	Trollius hybr. Earliest of All 0.80
— laevigata digitalis 0.20	Rheum emodii 0.20	- Middendorffianum 0.70	— Feuertroll 1.—
— Menziesii Scouleri 0.00	— palmatum tanguticum 0.20 — (Rhabarb.) The Sutton 0.20	— diffusum 0.70	— Gonath
—— pygmaeus 0.30	Rodgersia aesculifolia 2.— — sambucifolia 2.— — tabularis 2.— Rudbeckia flava 0.20	—— virescens 0.60	—— Schwefelglanz 1.—
Phlox paniculata (dec.)	- sambucifolia 2	— rupestre 0.60	— japonicus fl. pl 1.—
in weiß, rosa, rot,	— tabularis 2.—	— saxangulare 0.60	— Ledebouri 0.80
dunkelrot, lila, blau,	Rudbeckia flava 0.20	— spurium 0.50	Golden Queen . !-
violett, sortiert 0.40	— purpurea 0.40 — — atropurpurea 0.60	—— album 0.60	— pumilus yunnanensis . 1.—
Niedera gamischt 040	Ideal 1	Sempery arachn tomentos 3.	Tunica saxifraga 0.20
—— feinste Prachtmisch. 0.30	— Leuchtstern 1.— — nitida Herbstsonne . 0.60 — speciosa (Neumannii) 0.40	— tectorum robustum 3.—	— robusta fl. pl 0.40
- Neuh. Prachtmisch. 0.40	- nitida Herbstsonne . 0.60	— feinste Mischung 2.—	Typha angustifolia 0.90
— maculata Alpha 0.40	- speciosa (Neumannii) 0.40	Senecio clivorum 0.20	— latifolia 0.50
- Schneelawine 040	Sagina embulata 3-	()rangekonig	- Laxmannii
- suffr. Snowdon 0.50	Sagittaria sagittifolia . 0.60 Salvia Jurisicii 0.60	— Othello 0.50	Veratrum pigrum
Bunyardii 0.20	— nemorosa 0.80	— Veithianus 0.40	Verbascum phoeniceum . 0.20
Physostegia virginiana . 0.30	— pratensis rosea 0.40	- Wilsonianus 0.40	- vernale Mrs. Willmott 0.30
—— alba 0.40	—— superba 0.30	- Neue Spielarten gem 0.30	Veronica Allionii 0.70
Platycodon grdfl Mariesii 0.30	Santoline pinnata	Seseli caespitosum 0.50	— fruticulosa 0.50
album 0.30	Saponaria ocymoides 0.30	Sesleria coerulea 0.40	gentianoides 0.00
Polamerica and law	Satureia montana 0.30	Sidalcea hybr. Crims. King 0.30	- incapa 0.40
Primadonna 0.20	Saxifraga aizoon	— Mrs. Lindbergh . 0.40	— incana 0.40 — latifolia Königsblau . 0.50
Richardsonii 0.20	—— lutea 0.80	— — Rosy Gem 0.30	- Shirley blue 0.50
— — album	— minor 0.80	Scarlet Beauty 0.30	- longifolia 0.20
—— pallidum 0.30	— robusta 1.—	— feinste Mischung . 0.30	— orientalis 0.50 — repens 0.40
—— superbum 0.30	— caespitosa lutescens . 0.80 — villosa 0.80	Silene alpestris 0.40	— repens
album and 0.50	- villosa 0.00	— Schafta 0.40	— spicata aipina 0.40 — teucrium 0.50
—— superbum 0.40	Purpurmantel . 1.—	saxifraga 0.40	- waldsteinia 0.40
Potentilla ambigua 0.50	——— rosea 1.—	Silphium perfoliatum 0.20	— waldsteinia 0.40 — Prachtmischung 0.30
- argentea calabra 0.30	Schneeteppich . 0.70	Sisyrinchium anceps 0.40	Viola cornuta alba 0.80
- atrosanguinea 0.30	— — Schwefelblüte . 0.70	— convolutum 0.60	—— Alpha 0.60
— Hopwardiana 0.30	— groenlandica 0.80	Solidago aspera	- Gustav Wermig . 0.80
- hybr Landseer 0.30	— lingulata (Portae) 1.—	- hybr. Frühgold 0.20	—— Hansa 0.80
—— fl. pl. gefülltbl. gem. 0.40	Rhei superba 1	— Goldschleier 0.40	— Lemon Queen 0.80 — Spaßvogel. Neu 1.—
einfachbl. gemischt 0.30	— tellimoides 1.—	— — Goldstrahl 0.30	— Spaßvogel. Neu 1.—
nep. Miss Willmott 0.30	— moosartige gemischt . 0.70	- Goldelte 0.40	1 — W. H. Woodgate . U.80
- Roxana 0.50	polsterbild gemischt . 0.80	— Golden Wings 0.50	— gracilis Lord Nelson . 0.80 — — lutea 1.—
Poterium obtusum	— Prachtmisch, aller Art. 0.70	- Sonnenschein 0.40	Strolch 1
Primula acaulis Mischung 1.—	Scabiosa australis 0.20	— Spätgold 0.40	— odorata grandiflora . 0.20
- Beesiana 1	— caucasica alba 0.60	— nemoralis 0.40	— papiloniacea 0.50
— Bulleesiana 0.80	- Amethyst 0.60	— Shortii 0.20	Viscaria alpina 1.20
Bulleyana 1.—	— Diamant 0.60	Prachtmisch nied Sort 0.40	— viscosa alba grdfl 0.30
——————————————————————————————————————	— Miss Willmott 0.60	— Prachtmisch. hoh. Sort. 0.30	Freilandfarne (Reine Sporen)
— — delicata 3.—	— — perfecta 0.60	Stachys lanata 0.20	Athyrium filix femina crist. 0.90
—— cachmeriana 4.—	— Prachtkerl 0.80	grandifl. robusta 0.40	Dryopteris dilatata 1.—
——— Rubin 6.—	- Schöne von Eisenach 0.60	Statice auriculaefolium . 0.50	— filix mas Pindari 1.—
elatior aurea grdfl 1.—	- Prachtmischung . 0.50	globulariaetolium 0.50	— spinulosa 0.80 Matteucia struthiopteris . 1.—
— Weißer Schwan	lucida 0.60	— latifolia	Onoclea sensibilis 1.—
- florindae 0.50	Scutellaria alpina 0.60	Stipa gigantea 0.40	Osmunda cinnamomea 2.—
- japonica hybr. Misch 0.50	— canescens 0.60	— pennata 0.40	Claytoniana 2.
— — alba 0.50	Scirpus Tabernaemont.	Teucrium chamaedrys 0.40	— regalis 2.—
— atrosanguinea C.60	zebrinus 0.50	I halictrum aquilegitolium 0.30	Phyllitis scolopendrium . 0.90 — undulatum 1.—
— officinalis 0.50	— aizoon	—— lilacinum 0.30	Polystichum lobatum 1.—

Pflanzen-Zusammenstellungen für verschiedene Zwecke.

Wir verweisen auch auf die Sortimente Seite 5-8, sowie auf die Verwendungs- und Standortzeichen bei allen Pflanzengattungen.

Die besten und farbenkräftigsten Stauden für den Liebhabergarten.

Achillea filip. Parkers var., Anemone japonica i.S., Aquilegia i.S., Artemisia vulg. alba, Aster amellus i.S., Aster novi-belgii i.S., Aster novae angliae i.S., Aster subcoeruleus i.S., Aster dumosus i.S., Astilben i.S., Campanula carpathica i.S., Campanula grandis, Campanula latifolia macrantha, Centaurea dealbata, Centranthus i.S., Chrysanthemum leucanthemum, Chrysanthemum maximum, Chrysanthemum indicum, Chrysanthemum uliginosum, Cimicifuga i.S., Coreopsis verticillata, Delphinium cultorum i.S., Dicentra spectabilis, Doronicum i.S., Erigeron i.S., Euphorbia epythimoides, Geum i.S., Gypsophila paniculata fl.pl., Helenium i.S., Heliopsis i.S., Hemerocallis i.S., Heuchera i.S., Iberis semp. Schneeflocke, Iris interregna, Iris germanica i.S., Liatris i.S., Lupinus polyphyllus i.S., Lychnis chalcedonica, Paeonia albiflora (sinensis) i.S., Monarda i.S., Papaver orientale i.S., Pemtastemon i.S., Phlox Arendsii i.S., Phlox paniculata i.S., Physostegia i.S., Platycodon i.S., Potentilla hybr. i.S., Rudbeckia speciosa, Rudbeckia purpurea, Rudbeckia nitida Herbstsonne, Salvia nemorosa, Sedum fabaria i.S., Senecio i.S., Stachys grdfl. superba, Thalictrum aquilegifolium i.S., Trollius i.S., Verbascum i.S., Viscaria viscosa i.S.

Schwachwachsende Stauden und Gehölze für das Klein-Alpinum.

Stauden: Acantholimon i. S., Allium cyaneum, Allium yunnanensis, Androsace i. S., Anemone albicyanea, Anemone pulsatilla i. S., Asperula hirta, Asperula nitida, Adonis i. S., Aubrietia graeca grdfl., Aubrietia tauricola, Bellium minutum, Campanula garganica, Cotyledon i. S., Cyclamen i. S., Draba i. S. außer D. repens, Dianthus suavis, Dianthus Musalae, Dianthus caesius compactus, Douglasia Vitaliana, Dryas tenella, Erinus i. S., Euphorbia capitulata, Gentiana acaulis, Globularia nana, Hepatica i. S., Houstonia i. S., Hypericum coris, Iberis saxatilis, Iris cristata, Lewisia cotyledon, Linaria alpina, Linaria hepaticaefolia, Mauerfarne, Mentha Requienii, Oenothera pusilla, Papaver alpinum, Potentilla Tonguei, Primula auricula, Primula pruhoniciana Blaukissen und Schneekissen, Primula farinosa, Ramondia i. S., Raoulia australis, Saxifraga (polsterbildende) i. S., Sedum album micranthum, Sempervivum i. S., Silene acaulis i. S., Soldanella i. S., Statice incana pygmaea, Synthyris reniformis.

Gehölze: Calluna vulgaris Foxii, Cotoneaster microphylla glacialis, Daphne cneorum, Evonymus kewensis, Hedera helix

conglomerata, Polygala chamaebuxus, Rhododendron racemosum, Salix reticulata.

Wintergrüne Stauden für Steingarten und Trockenmauern.

Acaena Buchananii, Acaena glauca, Achillea macedonica, Arabis i.S., Armeria i.S., Asperula nitida, Aubrietia i.S., Calluna i.S., Cotula squalida, Dianthus i.S., Draba i.S., Erica i.S., Hutchinsia i.S., Hypericum polyphyllum, Iberis i.S., Paronychia i.S., Sagina subulata, Santoline chamaecyparissus, Saxifraga in moosartigen, polsterbildenden und rosettenbildenden Sorten, Sedum mit einigen Ausnahmen, Sempervivum i.S., Thymus i.S., Veronica armena, Veronica filiformis, Veronica repens.

Farne mit den Zeichen # \(\triangle \), Gräser mit den Zeichen # \(\triangle \).

Pflanzen, die im Heidegarten verwendet werden können.

Stauden: Erica und Calluna in allen Sorten müssen natürlich vorherrschen. Anaphalis margeritacea, Antennaria dioica, Antennaria tomentosa, Anthemis Biebersteini, Argemone platyceras, Aster amellus i. S., Campanula rotundifolia, Cerastium tomentosum, Ceratostigma plumbaginoides, Dianthus deltoides in Sorten, Dianthus suavis, Dianthus Knappi, Dianthus vaginatus atrorubens, Dianthus neglectus, Dianthus caesius i. S., Epilobium angustifolium, Epilobium Hectori, Festuca i. S., Geranium i. S., Hieracium i. S., Helianthemum i. S., Hypericum polyphyllum, Lavandula i. S., Matricaria caucasica, Nepeta Mussinii, Paronychia i. S., Statice i. S., Thymus i. S., Tunica i. S., Verbascum i. S., Veronica i. S.

Gehölze: Arctostaphylos i. S., Berberis stenophylla, Betula alba verrucosa (Birke), Bruckenthalia spiculifolia, Cytisus i. S., Elaeagnus angustifolius, Empetrum nigrum, Genista i. S., Leiophyllum buxifolium, Muehlenbeckia axillaris, Perowskia atriplicifolia, Polygala chamaebuxus, Potentilla i. S., Pyracantha coccinea, Rosa Giraldii, Rosa microphylla, Rosa pimpinellifolia hispida,

Ulex europaeus, Vaccinium i. S., Juniperus (Wacholder) i. S.

Pflanzen für trockene Böschungen.

Stauden: Achillea i. S., Alyssum i. S., Anaphalis margeritacea, Arabis albida i. S., Aubrietia i. S., Carlina acaulis, Cerastium i. S., Dianthus neglectus, Dianthus deltoides i. S., Eryngium i. S., Euphorbia epithymoides, Euphorbia myrsinites, Gypsophila i. S., Helianthemum i. S., Hieracium i. S., Iberis i. S., Iris pumila i. S., Lavandula i. S., Matricaria caucasica, Nepeta i. S., Oenothera i. S., Opuntia i. S., Potentilla verna, Potentilla reptans, Potentilla chrysocraspeda aurea, Saponaria ocymoides, Sedum i. S., Sempervivum i. S., Statice i. S., Thymus i. S., Tunica i. S., Veronica teucrium prostrata, Veronica incana, Veronica orientalis, Veronica spicata alpina.

Gehölze: Berberis i. S., Cotoneaster i. S., Cytisus i. S., Juniperus i. S., Lonicera Alberti, Potentilla i. S., Pyracantha coccinea,

Spiraea pumila, Spiraea arguta.

Pflanzen für Sandböden.

Stauden: Antennaria tomentosa, Anthemis i. S., Armeria maritima i. S., Avena sempervirens, Campanula rotundifolia, Cerastium i. S., Crambe cordifolia, Dianthus deltoides i. S., Dianthus caesius i. S., Elymus glaucus, Eryngium i. S., Festuca i. S., Gypsophila i. S., Helianthus i. S., Hieracium i. S., Nepeta Mussinii superba, Oenothera missouriensis, Opuntia i. S., Paronychia i. S., Santolina chamaecyparissus, Sedum i. S., Sempervivum i. S., Solidago virgaurea praecox, Statice i. S., Thymus serpyllum i. S., Verbascum i. S., Yucca filamentosa.

Gehölze: Acer ginnala, Acer campestre, Cytisus scoparia i. S., Cytisus praecox, Genista germanica, Hippophae rhamnoides, Tamarix tetrandra, Viburnum lantana. - Juniperus chin. Pfitzeriana, Junip. communis hibernica, Junip. sabina tamariscifol., Pinus mugh.

Blütenstauden zur Umpflanzung von Wasserbecken (normaler Gartenboden).

Anchusa myosotidislora, Asphodeline lutea, Bergenia i. S., Eryngium yuccaefolium, Geum i. S., Helianthus salicifolius, Hemerocallis i. S., Hosta i. S., Iris in allen mittelhohen Sorten, Kniphosia i. S., Lythrum i. S., Physostegia i. S., Ranunculus gramineus, Sisyrinchium striatum, Symphytum grandislorum, Thalictrum i. S., Tradescantia i. S., Trollius i. S.

Stauden für Blumenwiesen, die den üblichen Gras-Schnitt im Juli mitvertragen.

Achillea filip. Parkers var., Achillea millefol. Kelwayi, Anchusa myosotidiflora, Aquilegia vulgaris hybr., Astrantia major, Brunella Webbiana, Buphtalmum speciosissimum, Campanula rotundifolia, Campanula carpathica i. S., Cardamine pratensis fl. pl., Centaurea montana i. S., Centranthus ruber i. S., Chrysanthemum leucanthemum i. S., Chrysanthemum maximum i. S., Coreopsis verticillata, Colchicum i. S., Crepis aurea, Delphinium grandiflorum chinense i. S., Dianthus vaginatus atrorubens, Doronicum i. S., Dracocephalum Ruyschianum, Erigeron speciosus i. S., Filipendula hexapetala fl. pl., Geranium i. S., Geum i. S., Helenium Hoopesii, Hieracium aurantiacum, Inula grandiflora, Linum perenne, Linum flavum, Lythrum salicaria i. S., Malva moschata, Nepeta i. S., Paradisea liliastrum giganteum, Polygonum bistorta, Potentilla alba, Potentilla chrysocraspeda aurea, Pulmonaria i. S., Salvia pratensis i. S., Saponaria officinalis fl. pl., Stachys grandiflora i. S., Thalictrum aquilegifolium i. S., Thalictrum minus adiantifolium, Trollius i. S., Veronica teucrium prostrata i. S., Viscaria viscosa i. S., Verbascum i. S.

Was past zusammen? Eine Zusammenstellung wirkungsvoller Gruppierungen

I. Niedere Stauden:

Acaena Buchananii zu Allium, Campanula pusilla

novaezealandiae zu Lin. flav., Alyss. saxat.comp. Geum coccin.

Achillea ageratifolia zu Veronica spic. Perkeo

aurea zu Campan. glomerata sup. u. C. carpathica

Adonis alle Arten zu Anemone pulsatilla, Anemone montana, Anemone silvestris

Alyssum saxatile fl. pl. zu Iris pum. Darmstadt, Iris pum. atroviol. saxatile citrinum zu Polemonium reptans u. P. rept. superba

Anemone nemorosa zu Primel und Farne pulsatilla zu Adonis in Sorten, Festuca glauca

Anthemis Biebersteinii zu Campanula pusilla und Campanula carpathica Veronica teucrium prostrata

Arabis albida und albida fl. pl. zu Iris pum. cyanea und Phlox subulata Wilsoni

Rosabella zu Phlox subul. Maischnee u. Iris pumila Schneek. Armeria maritima zu Eryng. maritimum, Statice incana pygmaea Aster alpinus weiß zu Veronica teucrium prostrata blau

blau zu Veronica teucrium prostrata weiß

Aubrietia blau zu Iris pumila gelb u. Phlox subulata Moerheimi - lila zu Alyssum saxatile citrinum u. Phlox subulata Maischnee rosa zu Phlox subulata nivalis und Iris pumila Die Braut

- rot zu Iberis sempervirens Schneeflocke und Phlox nivalis weiß zu Iris pumila blau und Phlox subulata Sprite

Campanula carpathica blau zu Asclep. tuberosa u. Anth. Bieberst. weiß zu Linum perenne und Nepeta Mussinii

pusilla blau zu Corydalis lutea, Hieracium intybaceum

weiß zu Hieracium rubrum und Erinus alpinus

Corydalis lutea zu Coreopsis rosea nana, Polemonium reptans, Viola papil. purpurea

Dianthus spiculifolius zu Aster alpin. blau u. Campan. turbinata caesius splend. zu Armeria marit. alba u. Phlox sub. Maischnee

Epimedium alle Sorten zu Farne und Primel Euphorbia myrsinites zu Festuca und Opuntien

Gentiana lagodechiana zu Helianthemum gelb und bronzefarben Geranium Endressii zu Eryngium blau u. Gypsophila rp. Purpusi platypetalum zu Genista praccox, Iris interregna weiß

Geum mont, aurantiacum zu Campanula pus. blau, Aubrietia blau Gypsophilarep. fl.pl. Rosenschl. zu Delph. grdfl, chin. Tom Thumb monstrosa zu Heuch. Feuerrispe, Veron. latifol. Königsbl.

Helianthemum rot und rosa zu Potentilla fruticosa Beesii

weiß zu Scutellaria baicalensis, Lithospermum fruticosum gelb zu Veronica armena, Linum perenne

Helleborus niger zu Farne, Vinca, alpine Rhododendron

hybridus zu Pulmonaria und Primel in Sorten Hepatica triloba zu Primula acaulis und Primula officinalis Hieracium rubrum zu Helianthemum gelb, Veronica blau

gelb zu Dianthus deltoides, Linum narbonnense Iberis zu Aubrietia blau, Geum rot und Geum gelb

Iris pumila blau zu Iberis Schneeflocke, Alyssum saxatile fl. pl.

gelb zu Aubrietia blau, Phlox subulata Wilsonii weiß zu Phlox divaricata canad., Phlox sub. Moerheimii Linum flavum zu Campanula carpathica blau, Nepeta Mussinii

Nepeta Mussinii zu Potentilla frutic. Purdomii Oenothera missouriensis zu Veronica incana

linearis zu Lavandula, Campanula carpathica

Opuntia zu Euphorb.myrsinites, Yuccain Sort., Sed. u. Semperv. Pentastemon pygmaeus zu Festuca glauca und Inula ensifolia Phlox subulata blau zu Aubrietia weiß, Genista praecox

- rot und rosa zu Iberis und Arabis weiß

weiß zu Iris pumila blau und lila

Primula in Sorten zu Epimedium, Omphalodes, Mertensia, Farne (Etagenprimel)zu Carexjap., Aquileg., Heuch., Geum u. Farne (jap. Primel) zu Farne, Epimed., Mertens., Heuch. u. Tiarella

- (Kugelprimel) zu Caltha palustris, Omphalodes u. Myosotis

(Teppichprimel) zu Vinca minor, Viola cornuta u. V. odorata, Carex plantaginea

Pulmonaria zu Farne, Carex, Daphne, Anchusa myosotidiflora Ramondia zu immergr. Zwergfarne, Synthyris renif., Selaginella Saxifraga (polsterb.) zu Primula pruhonic., Pr. Juliae, Hepatica (rosettenb.) zu Sempervivum, Sedum, Campanula Porten-

schlagiana und C. Poscharskyana, C. garganica (verschiedenblättr.) zu Etagenprimel, Omphalodes, Mertensia

Sedum (moosart.) zu Campanula carp., C. pusilla, C. garganica, C. Portenschlag., Oenothera pusilla, Veronica teucr. prostr.

(buschige) zu Campanula pusilla, C. garganica, Cerastium Columnae, Hieracium rubrum, Platycodon grdfl. Mariesii Soldanella zu Ramondia, Globularia

Thymus (teppichbildende) zu Campanula pusilla, C. garganica, Paronychia, Matricaria caucasica, Sedum i. S.

(aufr.) zu Ajuga i. S., alp. Nelken, Hutchinsia, Inula ensifolia Tunica zu Gypsophila fl. pl. Rosenschleier, Inula ensifolia, Festuca glauca und F. glacialis

Veronica (teppichbildende) zu Geum triflorum u. G. bulgaricum, Potentilla chrysocraspeda aurea, Minuartia, Gypsophila rep.

(aufrechte) zu Geum Borisii u. G. montanum aurantiacum, Heuchera tiarelloides, Anthemis Bieberst.

Viola gracilis Juwel v. Eisenach und Lord Nelson zu Arabis procurrens, Arabis albida (gefüllt und einfach)

Viola cornuta zu Corydalis lutea und C. cheilanthifolia

odorata zu Primula acaulis und Pr. officinalis, Omphalodes und Vinca minor in Farben

II. Mittelhohe Stauden:

Achillea filip. Parkers var. zu Lychnis chalcedonica, Salvia nemoros, Helenium Crimson Beauty

millefol. Kelwayi zu Malva moschata

ptarmica fl. pl. zu Delphinium grandifl. chinense cinerarea, Pentastemon barbatus, Dracocephalum Ruyschianum

Aconitum napell. zu Coreopsis verticillata, Cimicifuga, Monarda Fischeri var. Wilsonii zu Anemone jap., Herbstast., Cimicifuga Anchusa myosotidifl. zu Caltha pal.fl.pl., Trollius, Aquilegia u. Iris Anemone japonica zu Cimicifuga, Monarda, Gräser und Farne Aquilegia zu Gräser, Farne, Trollius, Iris germanica

Asphodeline lutea zu Yucca filament., Opunt., Perowskia, Gräser Aster amell. zu Avena semperv., Artemisia stell., Rudbeckia spec. Astilbe Arendsii zu Hosta, Monarda, Cimicifuga, Campanula

latifol. macrantha, Campanula persicifolia

Astilbe simplic. zu Campanula carpath., mittelh. Gräser u. Farne Caltha palustr. zu Anchusa myosotidifl., Cardamine pratens.fl.pl. Campanula glomerata superba zu Achillea tomentosa, Oenothera glauca, Oenothera speciosa

latifolia macrantha zu Farne, Digitalis, Gräser

persicifolia zu Astilbe simplicifolia, Lysimachia clethroides, Paradisea liliastrum giganteum

Chrysanthemum maximum zu Delphinium, Papaver orientale,

Lychnis chalcedonica, Phlox paniculata rot Cimicifuga zu Aconitum, Hosta Fortunei, Gräser, Farne Coreopsis verticillata zu Heuchera, Delphinium, Campanula Doronicum z. Anchusa myosotidifl., Omphalodes, orangef. Trollius Euphorbia epithymoides zu Aubrietien, Anchusa myosotidiflora,

Dicentra spectabilis

Eryngium zu Gräser, Asphodeline, Opuntien

Geum, rotblühende zu Iris pumila gelb, Caltha palustris fl. pl.,

Alyssum saxatile fl. pl., Alyssum sax. citrinum

gelbbl.zuAubrietia, Campanula carp., Viola grac. Lord Nelson Hemerocallis zu Astilben, Iris orientalis i. S, Iris sibirica i. S., Tradescantia i. S.

Heuchera zu Mertensia, Gypsoph.rep.monstr., Veron. Shirley blue Inula zu Scutellaria canescens, Scut. baicalensis, Eryngium blau Iris orient. u. sibir. zu Hemerocallis, Lythrum, Lysimachia clethr. Liatris zu Scabiosa caucasica und Gräser

Linum perenne zu Potentilla insignis, Campanula carpathica

alba, Hieracium gelb Lythrum zu Astilben, Tradescantia, Filipendula hexapetala fl. pl. Monarda zu Achillea filip. Parkers var., Salvia nemorosa,

Anemone japonica hupehensis Oenothera glauca u. frutic. Youngii zu Campanula persicifolia, Delphin. grandifl. chin. cinerarea, Geum Borisii, G. coccineum

Papaver orient.rot zu Lilium weiß, Anchusa ital. Dropm., Lupinus Pentastemon barbatus zu Achillea ptarm. fl. pl. u. blaugr. Gräsern Rodgersia zu Aconitum, Astilbe, Hosta und Farne

Scabiosa cauc.zu Aster ptarm. major, Santoline tom., Avena semp.

Thalictrum zu Astilbe Arendsii, Cimicifuga

Tradescantia zu Hemerocallis, Iris oriental., Iris sibir., Gräser Trollius zu Anch. myosotidifl., Scirpus Tabernaem. zebr., Gräser Verbascum zu Delphinium, Campanula latif. macr., Salvia nem.

Deutsche Pflanzennamen

Die Buchstaben hinter dem botanischen Namen besagen, unter welcher Abteilung Sie die Sorte im Katalog verzeichnet finden.

Es bedeuten:

N = Niedere Stauden, H = Hohe Stauden, F = Farne, Zg = Ziergräser, S = Sumpfstauden, Bz = Blumenzwiebeln, Hk = Heidekräuter.

Hk = Heidekräuter.				
Adlerfarn: Pteridium F I	Buschmalve: Lavatera . Hi	Frühlingsschelle: Synthyris . N	Herbstaster: Asternovi-belgii H	
Al · · · · Alania NII	Ruschmohn Romneva H	Fuchsbohne: Thermopsis H	Herbstaster: Ast. vovae-angl. H	
Ährenheide: Bruckenthalia Hk	Buschwindroschen: Anemone N	Fuchsschwanzgras: Alopecur. Lg	Helbstzeitiose. Colditedin	
Affodill: Asphodelus H	Ruttorbluma (altha)	Fruhlingswaldwicke: Lathyr. 111	Herkulesstadde. Heracicam 11	
Akelei: Aquilegia Nu.H	Clairtenhalmont, Actaon H	Fünffaden: Pentastemon Nu. H	Herzblume: Dicentra . Nu.H	
Alant: Inula Nu.H	Christrose: Helleborus N	Funkie: Hosta H	Herzlilie: Hosta H	
Alpenanemone: Anemone . N	Chrysantheme: Chrysanthem. H	Fußblatt: Podophyllum H	Herzsteinbrech: Bergenia . N	
Alpenaster: Aster alp N	Dachwurz: Sempervivum . N	Gänsekresse: Arabis N	Hexenkraut: Circaea N	
Alpenblumenlauch: Allium . N	Dickblatt: Sedum N	Gamander: Teucrium N	Himmelsschlüssel: Primula . N	
		Gartenmohn: Papaver H Gauklerblume: Mimulus N	Hirschaungenfarn: Phyllitis F	
		Gedenkemein: Omphalodes . N	Hirse: Panicum Zg	
	Dost: Eupatorium H	Geißbart: Aruncus H	Hornklee: Lotus N	
	Dotterblume: Caltha II	Geißraute: Galega H	Hornkraut: Cerastium N	
Al 1 C L Alilles NI	Drochanmanl Harminum N	Gelbweiderich: Lysimachia . II	Hornvellmen: viola corn 19	
Al . Alderille ale N	Draimasterblume: Tradescant.H	Gemskresse: Hutchinsia N	Hundszahn: Erythronium Bz	
Al The Cyclemen N	Drillingenflanze: Trillium . N	Gemswurz: Doronicum H	Hungerblumchen: Draba N	
Al Landluma Chrysont N	Fherwurz Carlina N.	Geranium: Pelargonium N	Igelpolster: Acanthonmon . IN	
A 1 / TELL HI	Edoldistal Eryngium Nu H	Germer: Veratrum H	Indianernessel: Monarda . 11	
4 1 M N	Edelgarhe: Advilles Nu. H	Giersch: Aegopodium	Inkalilie: Alstroemeria 11	
A (-1 A H)	Edelrante Artemisia Nu. H	Gipskraut: Gypsophila N	Immergrun: Vinca	
1 1 D 1 1 - N	Edelweiß: Leontopodium . N	Gliedkraut: Sideritis N	Japansegge: Carex Jap Zg	
Bachspiere: Filipendula H	Ehrenpreis: Veronica . Nu.H	Glockenblume: Campan. N u. H Glücksklee: Trifolium N	Fackellilie: Kniphofia H	
	Eisenhut: Aconitum H	Gnadenkraut: Gratiola N	Prachtschwertl::lrisKaempf.H	
Bärenwurz: Meum H	Eisenkraut: Vernonia II	Götterprimel: Dodecatheon N	"Winteraster: Chrysanthem. H	
Bärwinde: Calystegia H	Elfanbluma: Enimedium N	Goldähre: Orontium S	Johanniskraut: Hypericum . N	
D II 1 1 Dlaterandon HI	Engian : (rentiana NII. H	Coldaster: Chrysopsis	Junkernne. Hsphodenne 11	
D 1 A America 7 cm	Etagenblume Monarda H	Goldbaldrian: Patrinia N	Kaiserkrone: Fritillaria . Dz	
Bandgras: Phalaris Zg	Etagenerika · Physostegia . H	Goldbandlilie: Lilium aurat. Bz	Kaktee: Opuntia	
Bartfaden: Pentastemon N u. H	Eulaliengras: Miscanthus Zg	Golderdbeere: Waldsteinia N	Kaliforn. Malve: Sidalcea . If	
Baummohn: Romneya H	Ewigleben: Sempervivum . N	Goldkörben: Chrysogonum N	Kaliforn. Mohn: Romneya . H	
Becherfarn: Matteucia F		Goldmilz: Chrysosplenium . N	Kalmus: Acorus S	
Becherglocke: Adenoph. Nu.H		Goldmünzkraut: Lysimachia N	Kapuzinerkresse: Trapaeol. H	
			Kardendistel: Morina H	
			Katzenminze: Nepeta N	
Bergaster: Aster alpinus . N	Federmohn: Macleaya H		Katzenpfötchen: Antennaria N	
Bergkamille: Anthemis N	Faigenkaktus: Opuntia	Goldtröpfchen: Chiastophyll. N	Kaukasusvergißmeinnicht:	
D Cl . L Friday N H	Fainstrohl Erigeron NIL	I (Traslilie: Paradisea	Anchusa myosotium 11	
D 1 '1 / F ' N H	Falls and de l'accompachia	Itraspelke Armeria	Mermesbeere. Inviolacea . 11	
D' Lalara Mananda H	Halconneller hanthus	Itreisenkraut: Senecio 11	Meditzeler. Filtinaria mer. Dz	
D. C.	Felgennelleg: Tunica	Harriech, Veilchen: Viola grac, iv	Marinettemoni. Mundo	
D' 1'1' C' min drium N " H	Fatthlatt. Sedum	Tunsel: Ajuga	Miedkraut: Crucianena	
D: 1 C1 M:4-11- N	Fatthanna: Sadum	I (fundelrebe: (flechoma	Mieerarn: Marsina	
Dittallas Manyonthas S	Fettkreuzkraut ()thonopsis N	Tundermann: Glechoma	Mieopatranader: Eremulus . 11	
Bitterwurz: Lewisia N	Feuerlilie: Lilium croceum B	Haargras: Stipa Zg	Königsfarn: Osmunda regal. F	
Blasenfarn: Cystopteris F	Feuerbusch: Dictamnus I	SHafer-Reis: Zizania Zo	Königsfarn: Osmunda regal. F Königskerze: Verbascum . H	
Di i Al ' ' N	Findanmagas Cotula	Habnentuk: Kanunculus IV u. II	Konigsiille: Lillum regale Dz	
Blaukissen: Aubrietia N	Fiederpoleter: Cotula	Hainkraut: Minuartia N	Nokardenblume: Galliardia 11	
DI "1 C 1 N	Filalegout, Phlomie	Hainlattich: Aposeris IN	Rolloriolume: Zausdinella . 1	
Dlanduchlhafan, Avana Zor	Fingerbut Digitalis I	Hainsimse: Luzula Lg	Kompaßpflanze: Silphium . II	
D1 /11 for Ambanatharum Za	Fingerkraut Potentilla Nu. I	Hakenlilie: Crinum 11	Mopf blume: Cephalalla 11	
Bleiwurz: Ceratostigma N u. H	Flammenblume Phlox	Hartheu: Hypericum N	Norea-Margerite: Chrys. Rol. 11	
Blumenbinse: Butomus S	Fliegendes Herz: Dicentra . I	I Haselwurz: Asarum	Mornolume: Centaurea 11 u. 11	
Blumanlauch: Allium N	Flockenblume: Centaurea . I	Hauhechel: Ononis N	Kornblumenaster: Stokesia . H	
Blutwurz: Sanguinaria N	Frauenflachs: Linaria	Hauslauch: Sempervivum . N	Kresse: Arabis N	
Bohnenkraut: Satureia N		Heidekraut: Frice	Kreuzkraut: Senecio . Nu. H Krötenlilie: Tricyrtis H	
Brandkraut: Phlomis H	Frauennerz: Dicentra I	N Heidekraut: Calluna HI	Kronenwicke: Coronilla N	
Braunelle: Brunella N	Francochuh: Cypningdium	N Heidelb. Schloßkr.: Lin. cymb. N	Krugglocke: Edraianthus . N	
Brannanda Lighar Tudan dala H	Freiland-Amaryllis Cripum I	Heilglöckchen: Cortusa N	Kugelblume: Globularia N	
Basashlatt. Galar N	Glovinie Incary, Nu. I	Heiligenblume: Santolina . I	Rugeldistel: Echinops 11	
Pinhalaladra, Edminthus N	Froschbif. Hydrocharis	S Helmkraut: Scutellaria 1	Kuhschelle: Anemone puls Iv	
Bunte Margerite: Pyrethrum H	Froschlöffel: Alisma	S Herbstanemone: Anem. jap. H	Kuhtritt: Wulfenia N	

Kunigundankraut: Eupator H	Pfingstveilden: Viola panil N	Seeheide: Frankenia N	Trönendes Herr. Digentes H
Labkraut: Galium N		Seekanne: Limnanthemum . S	
Lampenputzergras: Penniset.Zg	Pinnau: Crepis N		Traubenhyazinthe: Muscari Bz
Lampionpflanze: Physalis . H	Plattährengras: Uniola . Zg		Trauerglocke: Uvularia N
Lavendel: Lavandula H	Porzellanbl.: Saxifraga umbr. N	Seidenpflanze: Asclepias . H	Tripmadam: Sedum reflexum N
Leberbalsam: Erinus N		Seifenkraut: Saponaria Nu. H	Troddelblume: Soldanella . N
Leberblümchen: Hepatica . N			Trollblume: Trollius . Nu.H
Leimkraut: Silene N	Prachtscharte: Liatris H	Siegwurz: Gladiole Bz	Tüpfelfarn: Polypodium F
Lein: Linum Nu.H		Silberdistel: Carlina N	Türkenbund: Lilium martag. Bz
Leinkraut: Linaria Nu.H	Prachtwicke: Lathyrus H		Türkenmohn: Papaver H
Lerchensporn: Corydalis N		Silberwegerich: Plantago . N	Ungarwurz: Waldsteinia . N
Lichtnelke: Lychnis H		Silberwurz: Dryas N	Veilchen: Viola odorata N
Lilienschweif: Eremurus H	Prunelle: Brunella N	Skabiose: Scabiosa H	Venusfarn: Adiantum pedat. F
Löwenmaul: Antirrhinum . N		Sockelblume: Epimedium . N	Vergißmeinnicht: Myosotis . N
Lotwurz: Onosma N	Purpurglöckch.: Heuchera Hu. N		Wachsglocke: Kirengeshoma H
Lungenkraut: Pulmonaria . N		Sommerhyazinthe: Galtonia Bz	Waldlilie: Trillium N
Lungenwurz: Mertensia N u. H	Ranunkel: Ranunculus N, Hu.S		Waldmeister: Asperula N
Lupine: Lupinus H	Raketenblume: Kniphofia . H		Waldschmiele: Aira Zg
Madonnenlilie: Lilium cand. Bz		Sonnenbraut: Helenium H	Waldspiere: Aruncus silvest. H
	Raute: Ruta Nu. H		Waldwicke: Lathyrus N
		Sonnenmoos: Sedum N	Warzenschlund: Mazus N
		Sonnenröschen: Helianthem. N	Wasserähre: Aponogeton . S
		Sperrkraut: Polemonium N u. H	Wasseraloe: Stratiodes S
Majoran: Origanum N Malerblume: Gaillardia H		Spierstaude: Filipendula . H Spitzhütchen: Tiarella N	Wasserhahnenfuß: Ranuncul. S
	Riesenschachtelhalm: Equiset. S		Wasserliesch: Butomus S
	Riesenschleierkraut: Crambe H		Wasserprimel: Anemopsis . S Wassertanne: Hippuris S
Mannsschild: Androsace N	Riesenskabiose: Cephalaria H		Weidenröschen: Epilob. Nu. H
	Riesenwaldmstr.: Crucianell. N		Weiderich: Lythrum H
	Rippenfarn: Blechnum F		Weißbecher: Nierembergia. N
Margerite, weiße: Chrysanth.	Rittersporn: Delphinium H		Wetterdistel: Carlina N
	Rohrkolben: Typha S		Wicke: Lathyrus H
" bunte: Pyrethrum . H	Rosmarin: Rosmarinus H	Steinkraut: Alyssum N	Wiesenknopf: Poterium H
Marienglockenbl.: Platycod. H	Salbei: Salvia H	Steinkresse: Aethionema N	Wiesenraute: Thalictrum . H
Mastkraut: Sagina N	Salomonssiegel: Polygonatum H	Steinnelke: Tunica N	Wiesenschaumkraut: Cardam.H
Mauerfarn: Asplenium F	Sandglöckchen: Jasione N	Steinrich: Alyssum N	Wilder Indigi: Baptisia H
Mauerpfeffer: Sedum acre . N	Sandmiere: Arenaria N	Steinrose: Sempervivum N	Windhalm: Agrostis Zg
Mauerraute: Paronychia N	Sauerklee: Oxalis N	Steinsame: Lithospermum . N	Winterakonit: Eranthis N
	Schafgarbe: Achillea . Nu. H		Winteraster: Chrysant. ind. H
	Schachbrettbl.: Fritill. mel. Bz		Wintergrün: Pirola N
	Schaftdolde: Hacquetia N		Winterheliotrop: Petasites . N
		Sternlilie: Lilium concol Bz	
		Sternmoos: Sagina N	
Mooskraut: Selaginella N	Schaumblute: Itarella N	Stielblütengras: Miscanthus Zg	Wolfsmilch: Euphorbia Nu.H
		Stockmalve: Althaea H	
Moskitogras: Bouteloua. Zg	Schaindatten: Engineer N	Storchschnabel: Geranium . N	Wohlverleih: Arnica . Nu. H
Mummel: Nuphar S	Scheindotter: Erysimum N	Stranddistel: Eryng. maritim. N	Wollgras: Eriophorum . Zg
Mutterkraut: Matricaria . N	Scheinkelle: I veichitum S	Strandflieder: Statice . N u.H Strandhafer: Elymus Zg	Wind and and Change Cha
Nachtkerze: Oenothera Nu H	Scheinmahn: Mecononsis H	Strauchmalve: Lavatera H	Wijstenfeinstrohl, Bakis N
Nachtviole: Hesperis H	Scheinspiere: Gillenia H	Straußmohn: Macleaya H	Wijstengoldastan, Enjanhall N
Narzisse: Narcissus Bz	Scheinziest: Stachys H	Streifenfarn: Athyrium F	Wundklee: Anthyllis N
Nelke: Dianthus N	Schildblatt: Peltiphyllum . H	Strohblume: Helychrisum . N	Wurmfarn: Dryonteris E
Nelkenwurz: Geum Nu. H	Schildblume: Chelone H	Strohblume: Anaphalis N	Ysander: Pachysandra N
Nieswurz: Helleborus N	Schildkraut: Scutellaria N	Sturmhut: Aconitum H	Ysop: Hyssopus H
Ochsenauge: Buphtalmum . H	Schlangenbart: Ophiopogon S	Sumpfanemone: Anemopsis . S	Zaunlilie: Paradisea H
Ochsenzunge: Anchusa H	Schlangenkraut: Cimicifuga H	Sumpfdotterblume: Caltha . N	Zäpfchenkraut: Uvularia . N
		Sumpfeibisch: Hibiscus S	Zierrhabarber: Rheum H
Pampasgras: Cortaderia Zg	Schleifenblume: Iberis N	Sumpfkalla: Calla S	Zierspargel: Asparagus H
Pantoffelblume: Calceolaria N	Schlüsselblume: Primula N	Sumpfrose: Limnanthemum . S	
Pappelmalve: Malva H	Schmucklauch: Allium N	Täschelkraut: Thlaspi N	Zitronenmelisse: Melissa H
Paradieshhe: Paradisea . H	Schneeglockchen: Galanthus Bz	Tagblume: Commelina N	Zwergalant: Inula N
Pechnelke: Viscaria H	Schneeheide: Erica carnea Hk	Taglilie: Hemerocallis H	Zwergbaldrian: Valeriana . N
Parlson On I Sphodel. H	Schneekissen: Iberis N	Tannenwedel: Hippuris S	Zwergbellis: Bellis N
Perlmuttergläded Mantan N	Schällkrautmahn, Stale L. H.	Tausendkorn: Herniaria N	Zwergdistel: Cirsium N
Perlafotchen: Anachalia	Schriftfarn: Ceterach F	Teppichhartriegel: Cornus . N	Zwerggiokenblume: Camp. N
Pestwurz Petasites	Schüsselfarn: Dennstaedtia F		Zwerghahnenfuß: Ranuncul. N Zwergmargerite: Anacyclus N
Pfablrohr: Arundo Za	Schwarzköpfchen: Lepachys H		Zwergminze: Mentha N
Pfefferminge: Mentha H	Schwadengras Glyceria Zo	Teppichschaumkraut: Cardam.N	Zwergphlov Phlov
Pfeilaron: Peltandra	Schwalbenwurz: Asclenias H	Teufelskralle: Phyteuma N	Zwergsdwertlilie: Iris pum N
Pfeilkraut: Sagittaria S	Schwertlilie: Iris H	Thymian: Thymus N	Zwergspiere: Astilbe crispa N
Pfingstrose: Paeonia H	Schwingel: Festuca Ze	Tigerlilie: Lilium tigr Bz	Zypergras: Cyperus Zg
			0.1

Inhaltsverzeichnis

(Nomenklatur nach Dr. Zander)

Seite	Seite	Seite	Seite
Abies	Arundinella 74	Chrysaboltonia 10	Elaeagnus 90
Acaena	Arundo 74	Chrysanthemum 11, 26, 53, 54	Elsholtzia 83
Acantholimon 17	Asarum 24	Chrysogonum 26	Elymus
Acanthus 17, 48	Asclepias 49	Chrysopogon 15	Empetrum 80
Acer 82, 89, 92	Asparagus	Chrysopsis 26	Ephedra
Achillea 9, 17, 48	Asperula 24,73	Chrysosplenium 26 Cimicifuga 11,54	Epinobium 28, 36 Epimedium 28
Aconitum	Asphodeline 9, 49 Asphodelus 50	Circaea 26	Equisetum
Actaea 48	Asplenium	Cirsium 26	Eranthis 28
Actinidia 93	Aster 9, 10, 24, 50, 51	Clematis 54, 93	Eremurus
Adenophora 17, 48	Astilbe 10, 24, 51, 52	Clethra 80	Erianthus 74
Adiantum 78	Astragalus 24	Colchicum	Erica 15, 79, 80
Adonis	Astrantia 24, 52	Colutea 89	Erigeron 11, 28, 56
Aegopodium 48	Athyrium 78	Commelina	Erinus 28
Aesculus 92	Aubrietia 10, 24	Convallaria 26	Eriogonum 28
Aethionema 17	Avena 74	Convolvulus 16	Eriophorum 74
Agrostis 74	Azalea 15, 80	Coreopsis 11, 26, 54	Eriophyllum 28
Ailanthus 92	Azorella 24	Cornus	Erodium 28
Aira	Bahia	Coronilla 26, 89	Eryngium 11, 28, 56
Ajuga 17, 20	Baptisia	Cortaderia	Erysimum 28
Akebia	Beerenobst	Cortusa	Erythronium
Alisma	Berberis 82, 83, 89	Corylus	Eupatorium
Allium 9, 20, 73	Bergenia 24, 25	Cotoneaster 16, 83, 89	Euphorbia 28, 56
Alnus	Betula 83, 92	Cotula	Evonymus 16, 83, 90
Alopecurus 74	Blechnum	Cotyledon 26	Exochorda 90
Alstroemeria 48	Bouteloua 74	Crambe 54	Fagus 92
Althaea 48	Bruckenthalia 79	Crataegus 89, 92	Festuca 74
Alyssum 20	Brunella 25	Crepis 26	Filipendula 56
Amelanchier 89	Buddleia 16, 89	Crinum 54	Fontanesia 90
Amorpha 89	Buphtalmum 52	Crucianella 11, 26	Forsythia 90
Amsonia	Butomus	Cryptogramma 78	Frankenia
Amygdalus 82	Buxus	Cryptomeria 87	Fraxinus
Anacyclus 20 Anaphalis 20, 48	Calceolaria	Cyclamen	Fritillaria
Anchusa	Calla	Cydonia 89	Gaillardia 11, 29, 56
Andromeda 80	Callianthemum 25	Cyperus	Galanthus
Andropogon	Calluna 15,79	Cypripedium 27	Galax 29
Androsace 20	Caltha	Cystopteris 78	Galega 56
Anemone 9, 20, 21, 49	Calycanthus 89	Cytisus 16,83	-Galium 29
Anemopsis 75	Calystegia 52	Daboecia 80	Galtonia
Antennaria 21	Campanula 10, 25, 52	Dahlie (Mignon) 78	Gaultheria 80
Anthemis 9, 21, 49	Campsis	Daphne 80	Genista 86
Anthyllis 21	Caragana	Datisca 54	Gentiana 29, 56
Antirrhinum	Cardamine 25, 52	Decaisnea 89	Geranium
Aponogeton	Carex	Delphinium . 11, 27, 54, 55 Dennstaedtia 78	Geum 11, 29, 56, 58 Gillenia 58
Aquilegia 9, 21, 49	Carpinus	Desmodium 89	Gladiolus
Arabis 9, 21	Caryopteris 83	Deutzia 89, 90	Glechoma 29
Aralia 49, 89	Cassiope 80	Dianthus 11, 27	Globularia 29
Arctostaphylos 80	Castanea 92	Dicentra 27, 55	Glyceria 74
Arenaria 21	Ceanothus 89	Dictamnus 55	Gratiola 29
Argemone 49	Cedrus 92	Diervilla 90	Gunnera 58
Aristolochia 93	Celastrus 93	Digitalis 55	Gypsophila . 12, 29, 30, 58
Armeria 21	Centaurea . 10, 25, 26, 52	Dodecatheon 27	Haberlea 30
Arnebia	Centranthus	Doronicum	Hacquetia 30
Arnica 9, 21, 49	Cephalaria	Douglasia	Hamamelis 90
Aronia	Cerastium	Draba	Hedera 86, 93
Artemisia 24, 49, 73	Ceratostigma 26, 53 Ceterach 78	Dracocephalum 28, 55	Helenium 12, 58 Helianthella 58
Arum	Chamaecyparis . 16, 87, 92	Dryas 28 Dryopteris 78	Helianthemum 12, 30
Aruncus	Chelone 53	Echinops 56	Helianthus
Arundinaria 74	Chiastophyllum 26	Edraianthus 28	Helychrisum 30

Seite	Seite	l Seite	l Seite
Heliopsis 58, 59	Maianthemum 32	Philadelphus 86, 91	
Helleborus 12, 30	Malus 90		Sempervivum 14, 44
Heloniopsis 30	Malva	Phlomis 67	Senecio 14, 16, 44, 71
Hemerocallis 12, 59		Phlox 13, 35, 38, 68, 69	Seseli 44
	Marrubium	Phyllitis 13, 79	Sesleria
Hepatica	Marsilia	Phyllodoce 16,82	Shortia 44
Heracleum 59	Matricaria 32	Physalis 69	Sidalcea 71
Herniaria 30	Matteucia	Physocarpus 91	Sideritis 44
Hesperis 59	Mazus	Physostegia 13, 69	Silene 44, 45
Heuchera 30, 59	Meconopsis 66	Phyteuma 38	Silphium 72
Hibiscus 75, 90	Melica 74	Phytolacca 69	Sisyrinchium 45,72
Hieracium 30	Melissa 66, 73	Picea 87, 92	Soldanella 45
Hippophae 90	Menispermum 93	Pinus 87, 92	Solidago 14, 45, 72
Hippuris 75	Mentha 32, 66, 73	Pirola	Sorbus 92
Homogyne	Menyanthes	Plantago	Spiraea 86, 87, 91
Horminum 30	Mertensia 32, 66	Platanus 92	Sporobolus 75
Hosta 59	Meum 66	Platycodon 69	Stachys
Houstonia 30	Micromeria 32	Podophyllum 69	Statice 45, 72
Humulus 93	Mimulus 13, 32, 66	Polemonium 38, 69	Stenanthium
Hutchinsia 30	Minuartia 32	Polygala 86	Stipa
Hydrangea 16,90	Miscanthus 74,75	Polygonatum 69	Stokesia
Hydrocharis 75	Mitchella 32	Polygonum 38, 69, 93	Stratiodes
Hypericum . 12, 30, 31, 86	Mitella 32	Polypodium 79	Stylophorum
Hypsella 12	Moehringia 32	Polystichum 13, 79	Stylophorum
Hyssopus 59,73	Molinia	Pontederia 13, 76	Symphiandra 45
Iberis	Moltkia		Symphoricarpus 91
Ilex 80	Monarda	Populus	Symphytum 45
Incarvillea 12, 31, 59	Monbretia		Synthyris 45
Inula	Morina	Poterium	Syringa 91
Iris 12, 31, 62, 63		Primula 14, 38, 39	Tamarix 91
	Morus	Prunus 82, 91	Tanacetum 45
Jasione	Muehlenbeckia 86	Pseudotsuga 92	Taxus 87, 92
Jasminum	Mulgedium 66	Ptelea 91	Teucrium 45, 87
Juniperus 16, 87, 92	Muscari	Pteridium 79	Thalictrum 72
Kalmia 80	Myosotis 13, 34	Pterocephalus 39	Themeda 75
Kerria 90	Myrica 86	Pulmonaria 39	Thermopsis 72
Kirengeshoma 12	Narcissus 77	Pyracantha 16,86	Thlaspi 45
Kniphofia 12, 63, 65	Nepeta 13, 34	Pyrethrum 13, 14, 39, 41, 70	Thuya 87, 92
Kolkwitzia 16	Nierembergia 34	Quercus 92	Thymus 14, 45, 73
Laburnum 90, 92	Nuphar 76	Ramondia 41	Tiarella 45
Lamium 31	Nymphaea 76	Ranunculus . 14, 41, 70, 76	Tilia 92
Larix 92	Obstbäume etc 95	Raoulia 41	Trachelium 45
Lathyrus	Oenothera 13, 34, 66	Rheum 70	Trachystemon 72
Lavandula 12, 65, 73	Omphalodes 34	Rhododendron 16,82	Tradescantia 72
Lavatera 65	Onoclea 79	Rhus 91	Tricyrtis
Ledum 80	Ononis	Ribes 16, 86, 91	Trifolium 46
Leiophyllum 80	Onosma 34	Robinia 92	Trillium 46
Leontopodium 31, 32	Ophiopogon 76	Rodgersia 70	Trollius
Lepachys 65	Opuntia 15, 34	Romneya 70	Trapaeolum
Leucoium	Origanum 35,73	Rosen	Trapaeoium
Leucothoe 80	Orontium	Roscoea	Tsuga
Lewisia 32	Osmunda	Rosmarinus 70,73	Tunica 14, 46
Liatris 65	Othonopsis		Tussilago 46
Ligustrum 16, 86, 90, 92	Oxalis	Rubus	Typha
Lilium	Oxytropis		Ulex
Limnanthemum	Dodragandas 25	Ruscus	Ulmus 92
Linaria	Pachysandra 35 Paeonia albifl 13, 66, 67	Ruta 41, 71, 73	Uniola
Lindelofia 65		Sagina 41	Uvularia 46
Linum 12, 32, 65	Paeonia moutan 90, 91	Sagittaria 14,76	Vaccinium 82
	Panicum	Salix 16, 86, 91, 92	Valeriana 46,73
Lithospermum 32	Papaver 13, 35, 67	Salvia 71,73	Veratrum
Lobelia 65	Paradisea 67	Sambucus 91	Verbascum 14,73
Lonicera 16, 86, 90, 93	Paronychia 35	Sanguinaria 41	Vernonia 73
Lotus	Parthenocissus 16, 93	Sanguisorba	Veronica 14, 46, 73
Lupinus 12, 65	Patrinia	Santolina 41	Viburnum 87, 91
Luzula	Pelargonium 13	Saponaria 41,71	Vicia 47
Lychnis 65	Peltandra 76	Satureia 41	Vinca 14, 15, 47
Lydsilene 65	Pelthiphyllum 67	Saururus 76	Viola 15, 47
Lyonia 80	Pennisetum 15,75	Saxifraga . 14, 41, 42, 43, 71	Viscaria 15, 47, 73
Lysichitum 75	Pentastemon 13, 35, 67	Scabiosa 14, 43, 71	Waldsteinia 47
Lysimachia 12, 32, 65	Periploca 93	Schivereckia 43	Wistaria 93
Lythrum 65	Pernettya 82	Scirpus	Wulfenia 47
Macleaya 13, 66	Perowskia 16, 86	Scutellaria 43,71	Yucca 15,73
Magnolia 80, 82	Petasites	Sedum 14, 43, 44, 71, 73	Zauschneria 15, 47
Mahonia 90	Phalaris 75	Selaginella 44	Zizania

Richtlinien und Ratschläge für den Bezug

Erzielung einer dauernden Kundschaft durch Anpassung an die Wünsche und Bedürfnisse der Gartenliebhaber – inner-halb der naturbegrenzten Möglichkeit – ist Zweck und Ziel unserer Geschäftsführung. Wir wollen Niemand etwas aufdrängen und beraten Gartenliebhaber gerne, nicht oberslächlich und nicht eigennützig. Um Mikersolge zu vermeiden ist es angebracht, uns über Eigenart des Bodens, Sonnen- oder Schattenlage zu unterrichten, und uns Ersatz zu überlassen, wenn wir diese oder jene Art und Sorte nicht für geeignet halten.

Verkaufs- und Versandbedingungen

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber stillschweigend als bindend anerkannt. Mit dem Erscheinen des neuen Kataloges verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung

Mit wenigen Ausnahmen sind die Preise dieses Kataloges die vom Reichsnährstand festgesetzten Richtpreise. Sie verstehen sich in Reichsmark, ab unserer Gärtnerei. Bei persönlichem Aussuchen in unseren Kulturen sind die Katalogpreise nicht maßgebend.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10%, bei Abnahme

von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20 %, bei Abnahme von 250 Stück und mehr einer Sorte um 25 %. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Rossdorf-Darmstadt. An unbekannte Besteller liefern wir nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages. Langjährigen Kunden wird auf Wunsch Ziel gewährt. Nach dem Ausland kann nur gegen Voreinsendung des Betrages geliefert werden.

Abzüge an den Rechnungsbeträgen erkennen wir ohne unser vorheriges Einverständnis auf keinen Fall an.

Muster

Muster zeigen nur die Durchschnittsbeschaffenheit und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen. Kleine Abweichungen nach oben oder unten sind nicht zu umgehen.

Lieferung

Die Erledigung der Aufträge erfolgt zu geeigneter Pflanzzeit in der Reihenfolge ihres Eingangs. Kleinere Aufträge unter fünf Mark werden nicht bestätigt. Da es vorkommt, daß Pflanzen infolge ungünstiger Witterung teilweise versandunfähig werden und die verfügbaren Vorräte während der Versandzeit nicht genau bestimmt werden können, übernehmen wir für die vollständige Ausführung eines Auftrages, auch wenn er bestätigt ist, keine Gewähr.

Sortenersatz

Ersatz in gleichwertigen, ähnlichen Sorten behalten wir uns vor, falls dies vom Auftraggeber nicht ausdrücklich verbeten wird.

Versand und Verpackung

Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, soweit zulässig per Eilgut zum Frachtgutsatz, oder nach unserem Ermessen, wenn der Besteller nicht ausdrücklich anders verfügt. Für Schäden, die auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht verantwortlich. Die Verpackung wird sorgfältig und sachgemäß ausgeführt. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Fracht, Rollgeld und Zollspesen gehen zu Lasten des Empfängers.

Gewährleistung

Es werden nur gesunde, lebensfähige Pflanzen und keimfähige Samen geliefert. Für das Anwachsen der Pflanzen oder Keimen der Samen kann als Naturprodukt natürlich keine Gewähr übernommen werden; ausgenommen, wenn wir die Pflege der Pflanzen übernommen haben. Für Sortenechtheit bei Pflanzen wird garantiert, jedoch nur bis zum Rechnungswert gehaftet.

Beschwerden

Beschwerden werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erhoben werden, sorgfältigst geprüft und in zuvorkommender Weise erledigt. Beim Fehlen von Pflanzen bitten wir dringend, das Packmaterial wiederholt auf das genaueste durchzusehen, da es häufig vorkam, daß sich die Pflanzen doch noch fanden. Die Mängel gebe man genau an, sowohl der Art, wie der Stückzahl nach. Allgemein gehaltene Beschwerden erschweren ersahrungsgemäß sehr eine Nachprüfung. Es ist nicht gestattet, einen Rechnungs-posten teilweise zur Verfügung zu stellen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir um recht deutliche und genaue Angabe der Adresse und der nächsten Post- und Bahnstation.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Digital version sponsored by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.